


Zásobníkové automaty a bezkontextové jazyky



Zásobníkové automaty a bezkontextové jazyky

Motivace 1: Jaká je třída jazyků rozpoznávaných zásobníkovými automaty?

Motivace 2: Je dána bezkontextová gramatika \mathcal{G} a slovo w .
Jak zjistit, zda se slovo w dá vygenerovat v gramatice \mathcal{G} ?

Problém syntaktické analýzy pro bezkontextové gramatiky:
pro danou bezkontextovou gramatiku \mathcal{G} a slovo w rozhodnout,
zda $w \in L(\mathcal{G})$.

Ekvivalence bezkontextových gramatik a zásobníkových automatů

Věta 3.51. Ke každému PDA \mathcal{M} lze sestavit CFG \mathcal{G} takovou, že $L_e(\mathcal{M}) = L(\mathcal{G})$.

Důkaz. Vynechán. □

Věta 3.47. Ke každé CFG \mathcal{G} lze sestavit PDA \mathcal{M} takový, že $L(\mathcal{G}) = L_e(\mathcal{M})$.

Důkaz. Uvedeme za chvíli. □

Důsledek 3.52. Třída jazyků rozpoznávaných zásobníkovými automaty je právě třída bezkontextových jazyků.

Intuice převodu PDA na CFG

1. $|Q| = 1$

Intuice převodu PDA na CFG

2. $|Q| \geq 2$

Intuice převodu CFG na PDA

Konstrukce PDA řeší problém syntaktické analýzy.
(Platí pro dané \mathcal{G} a w : $w \in L(\mathcal{G})$?)

$w \in L(\mathcal{G}) \iff$ v \mathcal{G} existuje derivační strom s výsledkem w

Intuice převodu CFG na PDA

aneb O nedeterministické syntaktické analýze

PDA se bude snažit budovat derivační strom pro w .

shora dolů

zdola nahoru

Intuice pro analýzu shora dolů

Budování derivačního stromu simuluje levé derivace, tj. vždy rozvíjíme nejlevější neterminál.

Nedeterministická syntaktická analýza shora dolů

Věta 3.47. Ke každé CFG \mathcal{G} lze sestavit PDA \mathcal{M} takový, že $L(\mathcal{G}) = L_e(\mathcal{M})$.

Důkaz. K dané gramatice \mathcal{G} konstruujeme PDA \mathcal{M} , který simuluje levé derivace v \mathcal{G} .

- V levé derivaci je v jednom kroku odvození nahrazen (nejlevější) neterminál A pravou stranou $X_1 \dots X_n$ nějakého A -pravidla.
- V \mathcal{M} této situaci odpovídá náhrada A na vrcholu zásobníku řetězem $X_1 \dots X_n$.

$\mathcal{M} = (\{q\}, \Sigma, N \cup \Sigma, \delta, q, S, \emptyset)$, kde δ je definována:

- $\delta(q, \varepsilon, A)$ obsahuje (q, α) právě když $A \rightarrow \alpha \in P$
- $\delta(q, a, a) = \{(q, \varepsilon)\}$ pro všechna $a \in \Sigma$

$S \rightarrow aAB$

$A \rightarrow Aa \mid \varepsilon$

$B \rightarrow SaA \mid b$

$\delta(q, \varepsilon, S) = \{(q, aAB)\}$

$\delta(q, \varepsilon, A) = \{(q, Aa), (q, \varepsilon)\}$

$\delta(q, \varepsilon, B) = \{(q, SaA), (q, b)\}$

$\delta(q, a, a) = \delta(q, b, b) = \{(q, \varepsilon)\}$

$S \Rightarrow aAB$

$\Rightarrow aB$

$\Rightarrow aSaA$

$\Rightarrow aaABaA$

$\Rightarrow aaBaA$

$\Rightarrow aabaA$

$\Rightarrow aaba$

Korektnost

$$A \Rightarrow^* w \iff (q, w, A) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon)$$

(\implies) Indukcí vzhledem k délce odvození m .

■ $m = 1$: zřejmé.

■ $m > 1$: necht' tvrzení platí pro všechna $m' < m$.

$A \Rightarrow X_1 X_2 \dots X_k \Rightarrow^* x_1 x_2 \dots x_k = w$, kde $X_i \xRightarrow{m_i} x_i$, $0 \leq m_i < m$
z definice δ plyne $(q, w, A) \vdash (q, w, X_1 X_2 \dots X_k)$.

Je-li $X_i \in N$, pak dle indukčního předpokladu máme
 $(q, x_i, X_i) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon)$.

Je-li $X_i \in \Sigma$, pak $X_i = x_i$ a z definice δ plyne $(q, x_i, x_i) \vdash (q, \varepsilon, \varepsilon)$.

Kompozicí dostáváme $(q, w, A) \vdash^+ (q, \varepsilon, \varepsilon)$.

(\Leftarrow) Předpokládejme $(q, w, A) \stackrel{n}{\vdash} (q, \varepsilon, \varepsilon)$ a ukažme $A \Rightarrow^+ w$.
Indukcí vzhledem k délce výpočtu n .

■ $n = 1$: zřejmé.

■ $n > 1$: necht' tvrzení platí pro všechna $n' < n$.

$(q, w, A) \vdash (q, w, X_1 X_2 \dots X_k)$, tj. $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_k \in P$

w můžeme napsat jako $w = x_1 x_2 \dots x_k$ takové, že

■ je-li $X_i \in N$, pak $(q, x_i, X_i) \stackrel{n_i}{\vdash} (q, \varepsilon, \varepsilon)$, kde $n_i < n$.

Dle IP $X_i \Rightarrow^+ x_i$.

■ je-li $X_i \in \Sigma$, pak $X_i \stackrel{0}{\Rightarrow} x_i$.

Vhodnou kompozicí obdržíme

$A \Rightarrow X_1 X_2 \dots X_k \Rightarrow^* x_1 X_2 \dots X_k \Rightarrow^* x_1 \dots x_k = w$

což je levá derivace slova w v gramatice \mathcal{G} . □

Intuice pro analýzu zdola nahoru

Intuice pro analýzu zdola nahoru

$S \rightarrow XY$

$X \rightarrow ab$

$Y \rightarrow c$

Nedeterministická syntaktická analýza zdola nahoru

Věta 3.55. Necht' \mathcal{G} je libovolná CFG, pak lze zkonstruovat rozšířený PDA \mathcal{R} takový, že $L(\mathcal{G}) = L(\mathcal{R})$.

Důkaz. Vrchol zásobníku píšeme vpravo.

Konstruujeme rozšířený PDA \mathcal{R} , který simuluje pravou derivaci v \mathcal{G} v obráceném pořadí.

PDA \mathcal{R} má kroky dvojího typu:

- 1 může kdykoli načíst do zásobníku symbol ze vstupu
- 2 (**redukce**) je-li na vrcholu zásobníku řetězec tvořící pravou stranu nějakého pravidla v \mathcal{G} , může ho nahradit odpovídajícím levostranným neterminálem (a ze vstupu nic nečte)

Nechť $\mathcal{G} = (N, \Sigma, P, S)$.

Položme $\mathcal{R} = (\{q, r\}, \Sigma, N \cup \Sigma \cup \{\perp\}, \delta, q, \perp, \{r\})$, kde \perp je nově přidaný symbol a kde δ je definována takto:

- 1 $\delta(q, a, \varepsilon) = \{(q, a)\}$ pro všechna $a \in \Sigma$
- 2 je-li $A \rightarrow \alpha$ pravidlo v P , pak $\delta(q, \varepsilon, \alpha)$ obsahuje (q, A)
- 3 $\delta(q, \varepsilon, \perp S) = \{(r, \varepsilon)\}$

	krok výpočtu	odpovídající pravidlo z \mathcal{G}
$(q, i + i * i, \perp)$	$\vdash^i (q, +i * i, \perp i)$	$F \rightarrow i$
	$\vdash^\varepsilon (q, +i * i, \perp F)$	$T \rightarrow F$
	$\vdash^\varepsilon (q, +i * i, \perp T)$	$E \rightarrow T$
	$\vdash^\varepsilon (q, +i * i, \perp E)$	
	$\vdash^\dagger (q, i * i, \perp E+)$	
	$\vdash^i (q, *i, \perp E + i)$	$F \rightarrow i$
	$\vdash^\varepsilon (q, *i, \perp E + F)$	$T \rightarrow F$
	$\vdash^\varepsilon (q, *i, \perp E + T)$	
	$\vdash^* (q, i, \perp E + T^*)$	
	$\vdash^i (q, \varepsilon, \perp E + T * i)$	$F \rightarrow i$
	$\vdash^\varepsilon (q, \varepsilon, \perp E + T * F)$	$T \rightarrow T * F$
	$\vdash^\varepsilon (q, \varepsilon, \perp E + T)$	$E \rightarrow E + T$
	$\vdash^\varepsilon (q, \varepsilon, \perp E)$	
	$\vdash^\varepsilon (r, \varepsilon, \varepsilon)$	

Korektnost

$$S \Rightarrow^* \alpha A y \xRightarrow{n} xy \iff (q, xy, \perp) \vdash^* (q, y, \perp \alpha A),$$

kde $S \Rightarrow^* \alpha A y \xRightarrow{n} xy$ je pravá derivace a A je nejpravější neterminál.

(\implies) indukcí k délce odvození

(\impliedby) indukcí k délce výpočtu

Pro $A = S$ a $\alpha, y = \varepsilon$ dostáváme:

$$S \Rightarrow^* x \iff (q, x, \perp) \vdash^* (q, \varepsilon, \perp S) \left[\vdash (r, \varepsilon) \right]$$

“Výstupem” je pravá derivace v obráceném pořadí. □

Efektivnost syntaktické analýzy

Nedeterministický PDA \implies nedeterministický algoritmus
 \implies exponenciální deterministický algoritmus

Řešení:

- deterministický algoritmus složitosti $\mathcal{O}(n^3)$, kde $n = |w|$
(algoritmus Cocke - Younger - Kasami)
- deterministické zásobníkové automaty
a deterministické bezkontextové jazyky
- lineární algoritmy pro speciální třídy deterministických
bezkontextových jazyků