




Praktikum ze speciální patologie



PATOLOGIE TRÁVÍCÍ TRUBICE




Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.







DUTINA ÚSTNÍ

Rozštěpové vady rtu a patra



- ✖ incidence 1 : 950 narozených
- ✖ rozštěp laterální – izolovaný či kompletní
 - ⇒ *cheiloschisis (horní ret) – úplný/neúplný*
 - ⇒ *gnathoschisis (čelist)*
 - ⇒ *palatoschisis (tvrdé patro)*
 - ⇒ *uranoschisis (měkké patro)*
 - ⇒ *staphyloschisis (uvula)*
- ✖ rozštěp mediální, šikmý, příčný (vzácné)

Cheilognathopalatoschisis




kopie

Slinné žlázy




- ✖ 3 páry velkých žlaz, množství malých
- ✖ serózní / mucinózní
- ✖ sekreční jednotky → dukty
- ✖ dvouvrstevné řazení buněk – zevně myoepitelie
- ✖ tumory nejčastěji v parotis, u dospělých větš. epitelové



Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

Salivary Glands




Pleiomorfní adenom slinné žlázy (myxochondroepiteliom)




- ✗ benigní epitelový tumor
- ✗ většinou gl. parotis
- ✗ max. výskytu ve 4. dekádě, ženy
- ✗ typicky pomalý růst
- ✗ opouzdřený, často protuberance
- ✗ časté recidivy po resekci
- ✗ vzácně malignizuje (4%)

Pleiomorfní adenom slinné žlázy




- ✖ mikro:



- ⇒ *epitelová ložiska, pruhy a dukty v myxoidním až chondroidním stromatu*
- ⇒ *žlazové bb. a myoepitelie*
- ⇒ *často protuberance přes pouzdro*



Pleiomorfní adenom



Pleiomorfoní adenom




1 myxoidní stroma
2 epitelové pruhy a ložiska

Tonsillitis chronica



- ✖ Kombinace chronických změn s akutními exacerbacemi
- ✖ makro:
 - ⇒ čepy - polotuhé páchnoucí odlitky krypt žlutavé barvy vznikající retencí zánětlivého exsudátu a deskvamovaných epitelů



Tonsillitis chronica


- ✖ Komplikace:

- ⇒ *Flegmonózní angína (v hloubi lakuň dochází k nekróze, ulceraci a průniku patogenů do intersticia)*
- ⇒ *Flegmonózní periamygdalitida (infekce v řídkém retrotonsilárním stromatu)*
- ⇒ *Absces*

- ✖ Histologicky:


- ⇒ *Reaktivní hyperplázie lymfatické tkáně, lož. fibrotizace, lakuny vyplněné neutrofily, buněčným detritem a koloniemi bakterií*

Patrová mandle – chronický hnisavý zánět




- 1 Dlaždicový epitel lakuny
- 2 Detritus s neutrofily
- 3 Germinální centra
- 4 Ulcerace

Jícnové varixy





- ✖ v dolní třetině jícnu
- ✖ následek portální hypertenze
- ✖ anastomózy mezi portálním řečištěm a vena cava superior
- ✖ komplikace - *masivní krvácení do jícnu*

Jícnové varixy - endoskopický nález



kopie

Jícnové varixy makro





Refluxní ezofagitida




- ✖ chemicky indukovaný zánět při GER
- ✖ makro:
 - ⇒ *překrvení sliznice distálního jícnu, eroze, jizvení, stenózy*
- ✖ mikro:
 - ⇒ *reaktivní změny dl. epitelu: rozšíření bazální vrstvy → 20% tloušťky, prodloužení stromálních papil, zánět. infiltrát s eosinofily*
- ✖ dd reaktivní změny/Ca
- ✖ komplikace: Barrettův jícen!

Refluxní ezofagitida



Pravidelný epitel jícnu




Refluxní esophagitis: zesílení bazální vrstvy ($>20\%$), prodloužení stromálních papil (do povrchové 1/3)

Barrettův jícen



- ✖ komplikace refluxní ezofagitidy
- ✖ prekanceróza adenokarcinomu!
- ✖ náhrada dlaždicového epitelu specializovaným cylindrickým (= intestinální metaplázie) → riziko dysplázie
- ✖ → adenokarcinom (tzv. Barrettův karcinom!)

Barrettův jícn



1 pravidelná sliznice jícnu

2 metaplázie

3 gastroesophageální junkce

Kopie

4 kardie

Dlaždicobuněčný karcinom jícnu




- ✖ nejčastěji ve střední třetině jícnu
- ✖ muži, po 50. roce
- ✖ RF:
 - ⇒ *karcinogeny ve stravě (aflatoxiny), kouření, alkohol, chronický zánět*
- ✖ Příznaky:
 - ⇒ *dysfagie, úbytek váhy, kachexie*

Dlaždicobuněčný karcinom jícnu





- ✖ makro
 - ⇒ *exofytický, plochý, cirkulární*
- ✖ prognóza špatná
 - ⇒ *SCC v jícnu má tendenci šířit se lymfatickými cévami v submukóze → zakládá satelitní ložiska vzdálená od primárního tumoru*

Dlaždicobuněčný karcinom jícnu







1 jícen
2 kardie
3 fundus
4 tělo
5 antrum
6 pylorus
7 tumor





ŽALUDEK







Gastritidy

✗ Podle průběhu:

⇒ **akutní**

příčiny: sůl, koření, alkohol, kys.acetylsalicylová, stres, infekce


- **makro:**

překrvená, edematózní sliznice s erozemi

- **mikro:**

*hyperémie, edém, smíšená zánětlivá infiltrace v oblasti foveol,
eroze*

Gastritidy



⇒ **chronické**
nejčastější původce *Helicobacter pylori*

- **mikro hodnotíme:**

- » zánětlivá infiltrace *lamina propria mucosae* –
lymfoplazmocytární (gradus chronicity) + příměs neutrofilů
(gradus aktivity)
- » *přítomnost HP (+/-) a kvantitativní zhodnocení*
- » *přítomnost atrofie, intestinální metaplázie (kompletní, nekompletní) a event. dysplázie*

Klinicko-patologická klasifikace chronických gastritid




- 1) Chronická neutrofická gastritida (superficiální)
=dříve B
- 2) Chronická gastritida atrofická
 - I. Autoimunní chronická atrofická (dříve A)
 - II. Chr. multifokální atrofická
- 3) Zvlášně formy (reaktivní – chemická, radiační, eosinofilní, granulomatové)

Klinicko-patologická klasifikace chronických gastritid



- ✖ **Chronická neutrofická gastritida (superficiální) = dříve B**
 - ⇒ *Helicobacter pylori*
 - *makro*: antrum a korporální sliznice
 - *mikro*: povrchový nebo hluboký zánět, s projevy aktivity, tvorba lymfatických foliklů v zóně žlazek, finálně atrofie sliznice
 - **vyšší riziko vzniku NHL**




✗ **Chronická gastritida atrofická**

1/ Autoimunní chronická atrofická

= dříve A

⇒ *autoimunitní, tvorba pl proti parietálním bb. a vnitřnímu faktoru, součást perniciózní anémie*

- **makro:** sliznice **těla** a fundu
- **mikro:** chronická neaktivní gastritis (těžká atrofie s intestinální či pseudopylorickou metaplázií)
- **vyšší riziko vzniku adenokarcinomu!**



- ✖ **Chronická gastritida atrofická**

2/ Chr. multifokální atrofická


- ⇒ *Helicobacterová*
- ⇒ *Zánět méně (tělo + antrum)*
- ⇒ *Reaktivní změny epitelu, eroze*
- ⇒ *Nepravidelná distribuce ložisek atrofie*

Žaludeční eroze




- ✖ definice:
 - ⇒ *nepřesahuje přes m. mucosae, drobné povrchové defekty do 3 mm*
- ✖ příčiny:
 - ⇒ *nesteroidní antiflogistika, alkohol, zvracení, stres, popálení, infekce*
- ✖ nejčastější lokalizace:
 - ⇒ *antrum a tělo*
- ✖ porucha mikrocirkulace s rupturou kapilár
- ✖ hojení ad integrum - dny

Žaludeční ulcer



- ✗ definice: *průnik přes m. mucosae*
- ✗ příčiny:
 - ⇒ celk.: genetické, věk, pohlaví, stres, alkohol, kouření
 - ⇒ lok.: hypersekrece žaludečních štáv, HP, NSAID
- ✗ nejčastější lokalizace
 - ⇒ *pylorus, malá křivina, bulbus duodena, (Meck. divertikl)*

Žaludeční ulcer



Akutní vřed:

- ostře ohraničený defekt 4 - 25mm

Chronický vřed:

- ⇒ *defekt s navalitými okraji, k nimž se radiálně sbíhají řasy*
- ⇒ *spodina- leukocytární a fibrinózní exudát, buněčný detritus a fibrinoidní nekróza, granulační tkáň, vazivo*
- ⇒ *komplikace- krvácení, penetrace, perforace, jizvení, maligní zvrat*

Chronický peptický vřed žaludku




Kopie




Chronický peptický vřed žaludku

- spodina ulcerace



- 1** povrch ulcerace – buněčný detritus
- 2** kapiláry s úzkým lumen (komprese kapilár zmnoženým vazivem)
- 3** zánětlivě infiltrovaná granulační tkáň se zmnožením vaziva
- 4** fibrinoidní dystrofie vaziva

Významné tumory žaludku



- ✖ EPITELOVÉ
 - ⇒ *karcinom*
- ✖ NEEPITELOVÉ
 - ⇒ *gastrointestinální stromální tumory, tzv. GISTy*
 - ⇒ *maligní lymfomy (NHL: MALT, DLBCL)*


Karcinom žaludku



- ✖ častý maligní tumor
- ✖ lokalizace hl. antrum a pylorus, velká křivina
- ✖ RF:
 - ⇒ *chronická gastritis- HP, atrofická s inkomplet. int. metaplázií, intraepiteliální neoplázie sliznice*
- ✖ projevy:
 - ⇒ *zvracení, úbytek váhy, anorexie, zvracení, anemie*

*Metastázy lymfaticky do LU (Virchowova uzlina) hematogenně játra,
u žen v menarche Krukenbergův karcinom ovária*

Karcinom žaludku





Klasifikace karcinomu žaludku dle:

- ✖ makroskopického vzhledu:
 - ⇒ *polypózní*
 - ⇒ *miskovitý*
 - ⇒ *difuzní*
- ✖ hloubky invaze
 - ⇒ *časný: sliznice a submukóza, neprorůstá do muscularis propria*
 - ⇒ *pokročilý: do m. propria*
- ✖ histologického typu


Adenokarcinom žaludku

- exofytický růst tumoru





Adenokarcinom žaludku

- difúzní typ





Krukenbergův tumor



kopie


Krukenberg tumor




Gastrointestinální stromální tumory



- ✖ výchozí buňky:
 - ⇒ *pacemakery GIT (Cajalovy bb) ovlivňují peristaltiku*
- ✖ pozitivita CD 34 a CD 117 (c-kit)
- ✖ lokalizace všude v GIT- hl. žaludek a tenké střevo
- ✖ varianta z bb. protáhlých a epitheloidních
- ✖ predikce biologického chování:
 - ⇒ *mitózy, velikost, lokalizace*



STŘEVO



Normální sliznice tenkého střeva

- ✖ poměr výšky klků a krypt 3:1 – 5:1
- ✖ normální počet intraepiteliálních lymfocytů (IEL): 40 IEL/ 100 enterocytů

přítomnost kartáčového lemu (PAS+, alkalická fosfatáza +)

diferencované enterocyty

MAS (*malabsorpční syndrom*)



- ✖ soubor příznaků vzniklých při poruchách trávení, zvl. v oblasti tenkého střeva
- ✖ příznaky:
 - ⇒ *nechutenství, průjem, slabost, úbytek váhy, poruchy růstu; ekzémy, neurol. a psych. poruchy, krvácivost*
- ✖ dělení MAS:
 - ⇒ *primární - porucha enterocytů- vroz., získ.*
 - ⇒ *sekundární - mimo enterocyty*

MAS primární



- ✖ Deficity enzymů kartáčového lemu (př.: laktózová intolerance – deficit laktázy)
- ✖ Celiakální sprue (glutenová enteropatie, nesnášenlivost lepku, glutenu resp. jeho frakce gliadinu)

Celiakální sprue



- ✖ prevalence až 1:200
- ✖ asociace s dermatitis herpetiformis Duhring
- ✖ protilátky EMA, ARA, TG (protilátky proti gliadinu nespecifické)
- ✖ častější výskyt HLA II. třídy (vlivy genetické, imunitní, zevní faktory)

Celiakální sprue



- ✗ nutná bezlepková dieta
- ✗ komplikace:
 - ⇒ *maligní lymfomy a karcinomy tenkého střeva*
- ✗ klinika:
 - ⇒ *většinou začíná v dětství*
- ✗ příznaky:
 - ⇒ *viz MAS obecně*
- ✗ endoskopie:
 - ⇒ *ztráta příčných řas, zvýraznění cév*

Celiakální sprue



- ✗ mikro: nejvíce postižena prox. oblast tenkého střeva
- ✗ základní znaky:
 - ⇒ zvýšení počtu *intraepitel. T lymfocytů*
 - ⇒ zánět v *LP mucosae (pl, eo, gr, T ly)*
 - ⇒ *atrofie klků*
 - ⇒ *reaktivní hyperplázie krypt*

IBD



- ✖ idiopatické střevní záněty neznámé etiologie u osob s genetickou dispozicí
- ✖ etiologicky:
 - ⇒ *odlišná / nepřiměřená imunitní reakce na exogenní noxu*
→ *zvýšená propustnost stěny střeva* → *akcelerace zánětu*
- ✖ **Crohnova nemoc**
- ✖ **Ulcerózní kolitida**
- ✖ **Indeterminovaná kolitida (10-15%)**

IBD




- ✗ **histologické společné znaky IBD zánětů:**
 - 1) narušení architektoniky krypt
 - 2) atrofie krypt
 - 3) hustý zánětlivý infiltrát proprie s bazální plazmocytózou
 - 4) vzdálená metaplázie Panethových buněk

Crohnova choroba




- ✖ Klinicky:
 - ⇒ *opakováne průjmy, bolesti břicha, teplota, náhlý nástup, trvání dny až týdny, v 50% spontánní remise*
 - ⇒ *častá koincidence s Al onemocněními:*
 - iriditida, ankylozující spondylitis, erythema nodosum, PSC
- ✖ Makro:
 - ⇒ *terminální ileum, ale i kdekoliv jinde v trávící trubici*
 - ⇒ *segmentální postižení:*
 - zúžení a ztluštění - ostře ohraničené úseky, hluboké fisury

Crohnova choroba



✗ Histologicky:


- ⇒ *zánětlivá infiltrace transmurální*
- ⇒ *tvorba lymfatických foliklů*
- ⇒ *granulomy (ne vždy) v submukóze, subseróze a regionálních LU*
- ⇒ *fissury a ulcerace*
- ⇒ *fibrotizace*



✗ Komplikace:

- ⇒ *zúžení průsvitu s poruchou pasáže*
- ⇒ *perforace, peritonitida, píštěle*
- ⇒ *krvácení*
- ⇒ *systémová AA amyloidóza*
- ⇒ *karcinom*

Morbus Crohn



kopie

Ulcerózní kolitida



✗Klinika:

- ⇒ *hlenovité průjmy s příměsí krve, kolikovité bolesti v hypogastriu*
- ⇒ *začíná v rektu, šíří se na celé tlusté střevo*
- ⇒ *etiology nejasná, autoimunitní onemocnění*

✗Makro:

- ⇒ *hyperémie, edém, ploché mapovité vředy, v okolí regenerace sliznice a hyperplázie s tvorbou pseudopolypů*

Ulcerózní kolitida



✗ Mikro:

- ⇒ *nespecifický zánětlivý infiltrát pouze ve sliznici a submukóze*
- ⇒ *kryptitida, kryptové abscesy*
- ⇒ *zánět nemá granulomatový charakter*
- ⇒ *není fibróza*

Ulcerózní kolitida



✗ Mikroskopické fáze zánětu

⇒ *1. aktivní*

- překrvení a smíšená zánětlivá infiltrace, tvorba kryptových abscesů

⇒ *2. ústup zánětu*

- úbytek polynukleárů a vymizení kryptových abscesů

⇒ *3. remise*


- zánětlivé změny pouze v **rektu**

✗ Komplikace:


⇒ *toxická dilatace, krvácení, perforace, peritonitis, karcinom*

Ulcerózní kolitida

- makroskopicky



Zvláštní formy kolitid



- ✗ pseudomembranózní
- ✗ ischemická
 - ⇒ **důsledek krátkodobě snížené perfúze (šok, operace)**
- ✗ mikroskopická (kolagenní, lymfocytární)
 - ⇒ **klinika: chronicky vodnaté průjmy, kolonoskopie bpn, asociace a autoimunitními chorobami**
- ✗ infekční
- ✗ postradiační
- ✗ a další

Pseudomembranózní kolitida



✗ etiologie (podrobněji viz. přednáška)

- ⇒ *infekce- bakteriální*
- ⇒ *širokospetrá ATB*
- ⇒ *urémie*


✗ makro:

- ⇒ *šedivé pablány na vrcholcích slizničních řas, vředy*

✗ mikro:


- ⇒ *fibrinová pablána s granulocyty, bakteriemi, makrofágy, zakotvená v nekrotické sliznici*

Pseudomembranózní kolitida



✗ endoskopický nález kopie

Ileus- střevní neprůchodnost



- ✗ mechanický
 - a) strangulační
 - b) obturační
 - ⇒ *adheze*
 - ⇒ *hernie*
 - ⇒ *volvulus*
 - ⇒ *invaginace*
 - ⇒ *tumory*
 - ⇒ *obstrukce*
 - ⇒ *vrozené atrezie*
 - ⇒ *mekónium u mukoviscidózy*


- ✗ dynamický
 - ⇒ *paralytický-toxoinf.,*
otravy, léky, při
peritonitidě, po operačně
 - ⇒ *vaskulární-paralýza při*
hemorh. infarzaci
 - ⇒ *myopatie a neuropatie*
 - ⇒ *Hirschprungova choroba*




Ileus

- ✖ průběh: NPB, závisí na lokalitě/ etáži poruchy, kompletnost uzávěru
- ✖ střevo nad uzávěrem:
zánět → sepse a peritonitis → nekróza stěny → perforace

Ileus z obstrukce žlučovým kamenem




Hemoragická infarzace střeva




kopie

- ✖ důsledek ischemie střeva (okluzivní x neokluzivní)
- ✖ klinika: NPB

Hemoragická infarzace střeva



1 Kompletní transmurální hemorafická nekróza
celé šíře stěny střeva



Polypy intestinální sliznice



✗ Nenádorové polypy

⇒ **hyperplastický polyp** (do 5 mm) minimální maligní potenciál, ale řazen mezi serrated léze (viz dále)

⇒ **juvenilní polyp hamartogenní; děti, rektum; soliterně i souč. syndromu AD (! vzniku adenomů a Ca)**


⇒ **Peutz- Jeghersův hamartogenní; soliterní bez M potenciálu, i jako součást P-J syndromu - ! vzniku Ca pankreatu, plic, prsu, ovária**

Polypy intestinální sliznice



✗ Nádorové adenomatózní polypy sporadické

- ⇒ *tubulární adenom* (menší, kulovitý, stopkatý)
- ⇒ *vilózní adenom* (plochý sesilní, často HG dysplázie a vysoké riziko Ca)
- ⇒ *tubulovilózní adenom*



✗ Familiární syndromy

1/ Syndrom hereditární familiární polypózy

⇒ adenomatózní familiární polypóza (FAP)


(AD)- mutace APC supresor. genu

⇒ Gardnerův syndrom:

varianta FAP+ osteomy, lipomy a fibromy

⇒ syndrom Peutzův - Jeghersův :

(AD) hnědé pigmentace na kůži + hamartogenní polypy ve střevě





2/ Lynchův syndrom

(hereditární nepolypózní kolorektální karcinom, AD)


mutace mismatch genů; susp. mnohočetné tu u mladších 50-60let.

*Riziko * i jiných Ca (endometrium, pánev, tenké střevo, pankreas...)*

Adenomové polypy




Polypóza tlustého střeva




kopie

Vilózní adenom




kopie

Kolorektální karcinom



- ✖ V ČR velmi vysoká incidence
- ✖ 60 - 70 % v rektu a sigmatu (50% všech je v dosahu vyšetření per rectum)
- ✖ RF:
 - ⇒ zvýšený příjem: energet., cukrů, červeného masa
 - ⇒ snížený příjem: vláknina, vitamíny A,C,E
- ✖ predisponující faktory:
 - ⇒ polypóza
 - ⇒ ulcerózní kolitida

Kolorektální karcinom




✗ Makro:

- ⇒ ***exofytické, polypózní***
 - prox. kolon- dlouho němé
- ⇒ ***endofytické, ulcerace s navalitými okraji***
 - dist. kolon- brzy stenóza
- ⇒ ***anulární***
 - růst po obvodu
- ⇒ ***infiltrující***
 - nejméně časté, typu linitis plastica


Adenokarcinom tlustého střeva




Komplikace kolorektálního karcinomu



- ✗ stenóza
- ✗ obstrukční ileus
- ✗ krvácení
- ✗ perforace
- ✗ penetrace
- ✗ sterkorální peritonitida



Appendix - norma



kopie

Appendix - periappendicitida



kopie


SPECIMEN SP 4778-78

DATE 11/1/78



Apendicitida

- ✖ Příčiny: ? koprostáza>ischemie stěny>průnik bakterií do stěny= zánět katarální, flegmonózní
- ✖ Při trombóze cév mezenteriola>ischemická nekróza stěny>průnik bakt. sekundárně= zánět gangrenózní
- ✖ Komplikace:
 - ⇒ *peritonitis*
 - ⇒ *periappendikální absces*
 - ⇒ *portální pyemie*
 - ⇒ *srůsty*



DĚKUJI ZA POZORNOST