



# Fyziologie zátěže - horko, chlad



# Termoregulace

- ▶ člověk – teplokrevný
- ▶ teplota jádra u člověka bez horečky stabilní ( $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ )
- ▶ nemění se ani v závislosti na teplotě okolí (12-54 °C)
- ▶ teplota kůže se mění (nutné pro termoregulaci)



- ▶ není u každého stejná
- ▶ měřeno v ústech: 36-37.5°C
- ▶ za průměr se považuje 36.6 - 37°C, o 0.6°C více ( rektálně – v konečníku)
- ▶ Teplota vyšší:

37 – 37,9°C – subfebrilní teplota ( zvýšená)

38°C a více – febrilní teplota ( horečka)

nad 39°C – poruchy tělesných funkcí

nad 41°C snese jen krátkou dobu

- ▶ extrémní teplo (fyzická námaha) : 40°C, extrémní zima pod 35.5°C
- ▶ Ideální teplota okolí v klidu: 28°C ( teplota kůže 33°C, kůží – průtok 5% minutového výdeje

# Produkce tepla

= vedlejší produkt metabolismu:

- ▶ bazální metabolismus
- ▶ svalová aktivita (včetně třesu)

Intenzivní pohyb – svaly produkce 15 – 20x více tepla než BM

Až 80% energie uvolněné při svalové činnosti je ve formě tepla

# Ztráta tepla

- ▶ teplo vzniká v orgánech (svaly, játra), proniká do kůže a z ní se ztrácí
- ▶ ztrátu tepla proto určuje:
  - ▶ rychlosť vedení tepla z hloubky do kůže
  - ▶ rychlosť ztráty tepla z kůže
- ▶ tepelný izolátor

# Tepelný izolátor

- ▶ kůže, podkoží a **podkožní tuk** izolují (na 1/3), srovnatelné s oblečením
- ▶ zabraňuje oboustranným ztrátám tepla za cenu velkých výkyvů teploty kůže
- ▶ izolátor „porušují“ krevní cévy – nosiče tepla ( kožní cirkulace )
  - do cév nemusí téci nic nebo až 30% srdečního výdeje – obrovská schopnost regulace
  - 8 násobné zvýšení tepelné vodivosti při plné vazodilataci (sympatikus, hypothalamus)

# Ztráta tepla:

## 1. záření (radiace):

nahý člověk při pokojové teplotě ztrácí 60% tepla radiací



## 2. vedení (kondukce):

- předávání tepla kontaktem s pevnými předměty (minimum), do vzduchu ale kolem 15 %
- vítr: vzduch proudí pryč dříve a je nahrazen studeným(ztráty tepla podstatně větší)


## 3. odpařování (evaporace):

- pocení

- *perspiratio insensibilis* (i plíce): 450-600 ml denně (*nelze nijak regulovat*)



# Ztráty tepla nahého člověka



# Evaporace (odpařování)

## ► Pocení


Člověk až 10- 12 l /24 hod

- *perspiratio insensibilis* (i plíce): 450-600 ml denně (12-16 kcal za hodinu, až 384 kcal denně)  
nelze nijak regulovat

Regulace hypertermie ( přehřívání) – slouží evaporace

# Pocení a jeho regulace

- ▶ Termoreceptory : **hypothalamus**, v kůži
- ▶ Centrum termoregulace : **hypothalamus** (tepelná nebo elektrická stimulace) – autonomní dráhy do míchy – **sympatikus** do kůže
- ▶ **cholinergní inervace**, ale adrenalin a noradrenalin kupodivu potní žlázy stimuluji také (význam při cvičení)




# Hypotalamické centrum

- ▶ v přední hypotalamicko-preoptické oblasti množství termosenzitivních neuronů (2/3 reagují akčními potenciály na teplo, 1/3 na chlad)
- ▶ zahřátí této oblasti: okamžité pocení, masivní rozšíření kožních cév, inhibice (tlumení) tvorby tepla



# Detekce na periferii

- ▶ Povrchové termoreceptory: tepelné a chladové (10x víc) receptory v kůži, při ochlazení okamžitý reflex:
  - ▶ třes, inhibice pocení, kožní vazokonstrikce
- ▶ Hloubkové termoreceptory: v mísce, břišních orgánech a kolem velkých žil: registrace teploty jádra




hlavním úkolem je prevence **hypotermie** (snížení teploty)

# Horko



Teplota okolí je vysoká


1. **Vazodilatace kožních cév:** 8x zvýšení přísunu tepla do kůže, téměř na celém těle
2. **Pocení:** nastupuje při  $37^{\circ}\text{C}$ , velmi efektivní
3. **Pokles v produkci tepla:** silná inhibice třesu a chemické termogeneze ( zadní část hypotalamu)



Termoregulační odpověď je individuální (schopnost odvádět teplo, tělesná zdatnost)

# Tepelné vyčerpání

- ▶ Překročení termoregulační kapacity( i u fyziologické aklimatizace na teplo)
- ▶ Náhlé zatížení teplem + intenzivního sportovního výkonu přetížení oběhového systému



( akutní snížení minutového výdeje, hypotenze – snížení TK)

# Venkovní teplota ve vztahu k cvičení

°C	Sportovní aktivity
méně než 25°C	Bez omezení
25 - 27	Delší přestávky ve stínu Pít každých 15 min Sledovat varovné známky tepelné zátěže
27 - 29	Jako výše + Ukončit cvičení neaklimatizovaných osob Omezit trvání cvičení, prodloužit přestávky Nepovolit běhy na dlouhé tratě
nad 29	Ukončit všechny sportovní činnosti


# Termoregulační selhání

- ▶ Vzniká víc tepla, než se tělo dokáže zbavit
  - ▶ hodně tepla z venku
  - ▶ velká vlastní tvorba tepla
- ▶ Často fatální nebo dlouhodobé neurologické následky
- ▶ Hypotenze (z dehydratace) -> omdlévání
- ▶ Tachykardie, zrychlené dýchání (pokus o kompenzaci hypotenze)
- ▶ Kůže nejdřív červená (vazodilatace), později bledá (vazokonstrikce pro kompenzaci hypotenze)
- ▶ Hypoperfuze trávicího traktu + jeho teplem zvýšený metabolismus -> ischemické poškození bariérové funkce -> endotoxemie -> cytokiny, aktivace koagulace, další zhoršení termoregulace

# Varovné signály přehřátí



# Horečka



- ▶ teplota zvýšená nad normu
- ▶ infekce, mozkové nádory, další příčiny

= pyrogeny

- ▶ proteiny, rozpadové produkty proteolýzy, lipopolysacharidy
- ▶ bakteriální toxiny, produkty rozpadu tkání

Působení :

- ▶ některé **přímo** v hypotalamu ( nádor, mechanická stimulace)
- ▶ **Nepřímo** v hypotalamu : po fagocytóze produkuje leukocyty **interleukin** – endogenní pyrogen ( v hypotalamu do 10 min zvýší teplotu, stačí několik ng )

# Úžeh, úpal

- ▶ člověk vydrží několik hodin 55 °C na suchém vzduchu, 34 °C při 100% vlhkosti
- ▶ stoupne-li teplota těla nad 40°C – úžeh:

Projevy :zvracení , zmatenosť, delirium, ztráta vědomí, oběhový šok

- ▶ několik minut extrémní teploty může být fatální:  
poškození mozku
  - ▶ poškození jater a ledvin může způsobit smrt i po několika dnech po úžehu
- ▶ lokální chlazení možná lepší než celkové  
(vyvolává třes- zvýšení teploty)


# Adaptace na horko

## Během 1-3 týdnů

- ▶ snížení rektální teploty (za 14 dní) o 18-40%
  - ▶ ↑ kardiovaskulární výkonnost (zvýšení SV, snížení TF)
  - ▶ ↓ ztráty NaCl potem a močí ( $\uparrow$  aldosteron)
  - ▶ ↑ objem plazmy
  - ▶ ↑ maximální schopnost pocení (2x)
  - ▶ Je méně využíván glykogen, více tuk

Adaptovaní se začínají potít na nižší úrovni tělesné teploty


Už trénink v normální teplotě vede ke zvýšení odolnosti proti horku. Ale pobyt v horku bez zátěže podobnou adaptaci nevyvolá



# Průběh adaptace

2.- 6.den	pokles TF, zvyšuje se objem plazmy
4.-10.den	pokles rektální teploty pokles Na a Cl v potu a moči
8.-14.den	zvyšuje se rychlosť pocení

za 2.-3.týdny se adaptace na teplo ztrácí



# Trénink a aklimatizace na horko vyvolá souhrnné změny

- ▶ Zvýšení aerobní zdatnosti + větší oběhová rezerva
- ▶ Snížené energetické nároky na cvičení stejné intenzity, snížený metabolismus glykogenu o 50 – 60% (více využívány tuky)
- ▶ Zvýšené pocení a menší ztráty iontů
- ▶ Snížení TF (pokles tonu sympatiku)
- ▶ Lepší individuální tolerance zátěže

Kritéria tolerance cvičení v horku:

1. Teplota nepřekročí  $39,2^{\circ}\text{C}$
2. SF se udrží na 95% SFmax po dobu 3 min
3. Adaptovaný je schopen dokončit závod


# Chlad



Teplota okolí je nízká

# Reakce na chlad

- ▶ Chlad jako stresor-vyplavení katecholamínů (reakce TK,TF),
- ▶ Centralizace oběhu ,aktivace osy hypotalamus-nadledvinka,
- ▶ aktivace thyreoidních hormonů jako součást metabolické reakce.



Hypoglykémie a nevyspání zvyšuje rychlosť podchlazení.  
Rýchlejší nástup svalové únavy s možností úrazu úponů

# Mechanizmy udržení teploty jádra


- ▶ ↑ svalový tonus (↑ tepelné produkce)
- ▶ Vazokonstrikce kožních cév: stimulace sympatického centra v zadním hypothalamu, také téměř všude
- ▶ Piloerekce: sympathikus na *musculi arrectores*, u člověka malý význam, „izolační vrstva vzduchu“

## Zvýšená termogeneze-

Třesová – klíčový (motorické centrum v hypothalamu)

- současné záškuby antagonistických svalů
- ↑ tvorbu tepla 2-3x
- při adaptaci se více třesou svaly uvnitř těla - efektivnější ohřívání jádra

## Netřesová termogeneze (hnědý tuk)



Větší výdej tepla při svalové práci-nevýhoda v extrémním chladu

# Hypothalamus a třes

- ▶ v dorzomediální části zadního hypotalamu  
**primární motorické centrum třesu**
- ▶ normálně inhibováno termickým centrem z předního hypotalamu
- ▶ při chladu aktivováno periferními senzory
- ▶ impulsy nemají rytmus, pouze zvyšují tonus – když přesáhne kritickou hranici – třes
- ▶ až 5x vyšší produkce tepla než v klidu

# Extrémní chlad

- ▶ výrazný stresor – vyplavení katecholaminů
- ▶ 20-30 minut v ledové vodě fatální (zástava srdce), teplota těla 25 °C
- ▶ pokles pod 34°C nebezpečný – nízká tvorba chemického tepla, spavost, kóma (není třes)
- ▶ arteficiální hypotermie: srdeční operace (32°C): buňky vydrží bez kyslíku i 1 hod

Voda je vyšší chladový stresor než vzduch ( tepelná vodivost 26x vyšší)

# Ochrana proti tepelným ztrátám

- ▶ Omezení tepelného výdeje - vazokonstrikce kůže a neaktivních svalů
- ▶ Chování a oděv - schoulení x tělesná aktivita, přiměřený oděv
- ▶ Rozdíly v povrchu těla - děti relativně větší povrch – větší ztráty
- ▶ Termogeneze - třesová (včetně svalové aktivity)  
netřesová (vliv katecholamínů a hnědé tukové tkáně) třes tu nastupuje později
- ▶ Adaptace, otužování - prodloužení nástupu tepelných ztrát

# Zdravotní rizika PA v chladu

- ▶ Hypotermie-hovoříme o ní pokud klesne teplota pod 35°C

Podle závažnosti ji dělíme na:

- mírná(rektální teplota - 32°C)
- střední(rektální teplota- 30°C)
- těžká(rektální teplota- 28°C)

Příznaky:  
vliv na vodivý systém srdce – prodloužení PQ intervalu, komorové extrasystoly, tachykardie i fibrilace komor, pokles TK, mělké dýchání, poruchy mentálních funkcí

- ▶ Diving reflex-náhlé ponoření obličeje nebo těla do chladné vody,apnoe a vagový mechanismus poruchy srdečního rytmu s možnou zástavou srdce.
- ▶ Pozátěžový bronchospasmus-vdechováním chladného vzduchu.
- ▶ Další příznaky : časté křeče kosterních svalů, při pohybu v chladu hrozí ruptury

# Adaptace na chlad

- ▶ Genetická- australští domorodci, eskymáci, sibiřané
- ▶ Aklimatizace-získaná positivní reakce na komplex podmínek
- ▶ Aklimace-získaná reakce posit. na jednu složku
- ▶ Habituace(přivykání)-zmenšená reakce na chlad
- ▶ Typy:
  - metabolická - zvýšená tvorba tepla
  - izolační – tuková vrstva, vazokonstrikce
  - hypotermická – tělesná teplota klesá, organismus se adaptuje na nižší teplotu

Poznámka:

- děti mají v chladu větší tepelné ztráty
- senioři mají zhoršenou vazokonstrikci kůže a omezené vnímání chladu a tepla-hrozí rovněž větší tepelné ztráty

# Otužování

= činnost , jejímž výsledkem je schopnost organismu správně a pohotově reagovat na klimatické výkyvy zevního prostředí

- ▶ Význam jako prevence nemoci z nachlazení a zvýšení adaptace na chlad-výhody pro kvalitu života
- ▶ Běžné otužování - chladnější místnosti, přiměřený oděv, sprchování a mytí studenou vodou, saunování
- ▶ Sportovní otužování - plavání v ledové vodě



# Extremní výkony v chladu

- ▶ Přežití horolezce bez kyslíku 2 dny ve výšce 8.000m při teplotě v noci až -25°C s příznaky obou forem AHN jen s omrzlinami po jeho snesení a ošetření
- ▶ Ledový muž - Rusko/Sibiř/ uběhl maraton v teplotě - 16°C za 5 a půl hodiny jen v trenkách s čelenkou a nazouvacími trepkami. To vše bez omrzlin a viditelné újmě na zdraví.
- ▶ Tentýž muž podplaval 50m pod ledem ve vodě +4°C jen v plavkách (pod dohledem potápěčů s lékařským zázemím)

