
A wooden table with a blue sneaker, a blue shoelace, and a glass bowl of raspberries and blueberries.

Sportovní výživa

- Nutriční strategie -
- Metody podpory výkonnosti sportovce -
- Adaptace na specifické podmínky či navyšování energetických zásob -
- Podpora tréninkové adaptace



Význam výživy v lidském zdraví a výkonnosti

Nutriční strategie jsou specializovaná dietní opatření s cílem podpořit sportovcovu výkonnost pro **závodní zatížení** (nejedná se o tréninkovou podporu) **vytrvalostního typu**.

Nutriční strategie

Úvod

- ▶ Jednotlivé nutriční strategie **slouží k:**
 - ▶ Navýšení glykogenových zásob.
 - ▶ Adaptaci lipidového metabolismu.
 - ▶ Podpoře tréninkové adaptace.
 - ▶ Adaptaci na snížené energetické zásoby, práci s únavou či dehydratací.
- ▶ Nutriční strategie jsou již velmi **pokročilými metodami v podpoře závodní vytrvalostní výkonnosti.**
- ▶ Jejich zařazování nemá příliš velký smysl u hobby sportovců bez ambicí na závodění.
- ▶ Zároveň se jedná o metody vyžadující pečlivé plánování a zařazení do ročního tréninkového cyklu - **periodizace výživy.**





Nutriční strategie

Přehled metod

- ▶ V rámci naší výuky se seznámíme s následujícími strategiemi:
 1. Train low
 - ▶ Vícefázový trénink
 - ▶ Trénink na lačno
 - ▶ Sleep low
 2. Nízkosacharidová dieta
 3. Sacharidová superkompenzační dieta
 4. Jednodenní hypersacharidová dieta

Train low

Princip

- ▶ *Principem je absolvování tréninku, který je zahájen nebo dokončen se suboptimálními hladinami svalového glykogenu a příjem sacharidů během zátěže je minimální.*
- ▶ Dochází k příznivým adaptacím zejména v oblasti **metabolismu sacharidů a tuků** a výsledkem je **zvýšení aerobní kapacity svalové buňky** a lepší podmínky pro výkon.
- ▶ Přes silný adaptační účinek je nutné zvážit **zdravotní rizika** (přechodné oslabení obranyschopnosti) **a limity tréninku** (vyšší subjektivní vnímání zátěže, únava) a přesně jej plánovat.
- ▶ V rámci této strategie záměrně **manipulujeme s dostupností sacharidů**, respektive jejich načasováním. Celkový příjem v rámci jednoho dne zůstává stejný (nejedná se nízkosacharidovou dietu)!

Train low

Aplikace - Vícefázový trénink

- ▶ Nejčastěji se využívá vícefázového tréninku, při kterém je první tréninkové jednotky „využito“ k **vyčerpání glykogenu** (vysoká intenzita či objem bez průběžného doplňování energie).
- ▶ Po tréninku je příjem sacharidů minimální s cílem udržet minimální úroveň svalového glykogenu pro druhý trénink, který **stimuluje organismus k adaptaci** na „zhoršené“ podmínky.
 - ▶ Zvýšená tvorba svalového glykogenu.
 - ▶ Adaptace oxidativního energetického metabolismu buněk - aktivita a tvorba oxidativních enzymů.

Train low

Aplikace - Vícefázový trénink



Mouth-rinse



Mouth-rinse
Kofein



9:00



10:30



13:00



15:00



18:00



21:00

Vyčerpání glykogenu

Podpora adaptačních procesů

celkový denní příjem sacharidů
zůstává stejný. Například 8 g S/kg.
Manipuluje se pouze s časem
podání.


Train low

Aplikace - Trénink na lačno

- ▶ **Trénink při redukovaných zásobách jaterního glykogenu** a bez příjmu sacharidů (ranní trénink nalačno).
 - ▶ Je možné buďto vynechat ve snídani sacharidy nebo trénink absolvovat bez snídaně.
 - ▶ Individuální reakce sportovce - někomu nemusí vyhovovat.
- ▶ Svalový glykogen je obvykle na dostatečné úrovni pokrývající energetické potřeby svalu a dovolující relativně vysokou intenzitu zátěže.

Train low

Aplikace - Trénink na lačno



Vyčerpání glykogenu

Podpora adaptačních procesů

Train low

Aplikace - Sleep low

- ▶ Modifikace tréninku nalačno - podvečerní intenzivní trénink k vyčerpání hladin glykogenu, bez následného příjmu sacharidů a ranní trénink nalačno.
- ▶ Ranní trénink je realizován při redukováných hladinách jaterního i svalového glykogenu a bez příjmu sacharidů.
- ▶ Nutnou podmínkou adaptačního efektu je **interakce 2 tréninků ve dvou dnech**.

Train low

Aplikace - Sleep low



Mouth-rinse



Mouth-rinse
Kofein



16:00



17:00



19:00



07:00



08:00



10:00

Vyčerpání glykogenu

Podpora adaptačních procesů

Train low

Shrnutí

- ▶ V případě všech uvedených strategií **neměníme poměr sacharidů a bílkovin z celkového denního energetického příjmu** a **nejvýznamnější změnou je pouze záměrná redistribuce přijímaných sacharidů v průběhu tréninkového dne či vícedenních tréninkových bloků** v závislosti na tréninkových cílech, intenzitě tréninků, fázi tréninkového cyklu.
- ▶ Principem je absolvování tréninku, který je zahájen nebo dokončen se **suboptimálními hladinami svalového glykogenu a příjem sacharidů během zátěže je minimální**.
- ▶ Dochází k příznivým adaptacím zejména v oblasti **metabolismu sacharidů a tuků** a výsledkem je **zvýšení aerobní kapacity svalové buňky** a lepší podmínky pro výkon.

...dná se o vysoce efektivní metodu hojně používanou elitními trvalostními sportovci. Její uplatnění u sportovců s ambicemi závodit se po jejich ozkoušení velmi doporučuje.


Train low

Shrnutí

- ▶ Tréninky při snížené sacharidové dostupnosti bývají náročné a jsou často spojovány se **silnými pocity únavy**.
- ▶ Je proto potřeba hlídat pitný režim, který může být kvůli nechutenství opomíjen.
- ▶ Pomoci potlačit únavu může např. metoda **mouth-rinse** či **kofeinová suplementace**.

mouth-rinse je detailněji popsáno v prezentaci Tekutiny a pitný režim.

o kofeinu více příští týden.



ketogenní diety jsou v dnešní době
velice populárním komerčním
prostředkem k hubnutí. Je ale
důležité si uvědomit, že tyto diety
jsou z velké části spojeny zejména
s vysokou kalorickou restrikcí
(někdy i pod hranici bazální
energetické potřeby)! Jejich
původním účelem byla léčba
epilepsie u dětí v nemocničním
prostředí. Nikoli tedy metoda
hubnutí v běžném
pracovním/sportovním procesu!

Nízkosacharidová dieta

Princip

- ▶ *Principem je vícedenní úprava poměru přijímaných živin ve prospěch tuků a na úkor sacharidů. Celkový denní energetický příjem je tak převážně tvořen potravinami bohatými na lipidy.*
- ▶ „Low carbohydrate-High fat diet“ (LCHF) mohou být **ketogenní a neketogenní**, respektive se záměrnou restrikcí S do takové míry, kdy se v těle začínají kumulovat ketolátky.
- ▶ Standardní délka trvání neketogenní nutriční přípravy postačuje okolo **pěti dnů**. Touto metodou se budeme více zabývat dále.
- ▶ U ketogenní diety je adaptace na zvýšené hladiny ketolátek popisována až po několika týdnech. Touto metodou se pro naše potřeby zabývat nebudeme.

Nízkosacharidová dieta - „neketogenní“

Aplikace

- ▶ Méně než 150 g/den, respektive $\leq 2,5$ g S/kg (v následujícím příkladu budeme počítat s množstvím 1,9 g S/kg pro 80 kg muže = ~150 g S/den):



200 g
8 g S



2 ks
26 g S



2 ks
10 g S



50 g
35 g S



2 ks
44 g S

- ▶ Zbytek energie musí pocházet z potravin obsahujících pouze tuky a bílkoviny.

Pro splnění
zdepsaných
poručení a množství
složek ve stravě je
potřeba dobře
plánovat kontrolovat
příjem pomocí
nutričních software.

Nízkosacharidová dieta - „neketogenní“

Shrnutí

- ▶ Nízkosacharidová strava může pomoci vytrvalostním sportovcům v přípravě na snížené množství glykogenu v pracujících svalech během dlouhotrvajících výkonů (několik hodin), kde není možné adekvátně doplnit sacharidy během zatížení (běh, plavání atp.) a intenzita nepřesahuje 75 % VO_{2max} , respektive anaerobní práh.
- ▶ Jedná se zpravidla o pěti denní přípravu, která může těmto ultradistančním sportovcům pomoci se připravit na energeticky náročné závody.
- ▶ **Je opět důležité dodržovat pitný režim (↑ lipolýza = ↑ hydrolýza)**

Strava je v rámci této přípravy velmi častá. Ne všichni sportovci ji dobře snášejí, a proto je velmi často adekvátně tolerována zejména okolními sportovci...



Sacharidová superkompenzační dieta (SSD)

Princip

- ▶ Principem SSD je navýšit glykogenové zásoby ve svalech nad jejich běžné množství (superkompenzace) a pomoci tak sportovci v energetickém zásobení na závod.
- ▶ Týdenní výživově-tréninkový režim s **třídenní depleční fází** 7.-5. den před vytrvalostním závodem (vyčerpání glykogenu redukcí příjmu S a zvýšením objemu zatížení).
- ▶ Navazuje **saturační fáze** 4.-2. den před závodem (hypersacharidová strava a minimální tréninkové zatížení).
- ▶ Den před závodem smíši


Příjem S je u SSD a hypersacharidové diety velmi vysoký. Splnit předepsaná doporučení může být pro některé sportovce obzvláště náročné (zažívací obtíže, křeče, průjem atp.) → „Training the gut“. Je potřeba pravidelně zkoušet a začínat spíše s menšími dávkami.



Sacharidová superkompenzační dieta (SSD)

Aplikace

U těchto tréninků je opravdu potřeba tzv. „přitlačit na pilu“ a vyčerpat svalový glykogen do svého maxima...



Význam zde mají doplňky stravy, díky své vstřebatelnosti a zájmemu poměru jednotlivých sacharidů.



Sacharidová superkompenzační dieta (SSD)

Shrnutí

- ▶ Výsledkem SSD je **superkompenzace glykogenu (navýšení zásob)**. Zasahuje do závěrečné fáze přípravy sportovce na závod (je však nutné kompletně přizpůsobit jednotýdenní mikrocyklus).
- ▶ Týdenní výživově-tréninkový režim slouží ke stimulaci organismu navýšit zásoby tělesného glykogenu, který je klíčový pro udržení intenzity vytrvalostních výkonů při požadovaném objemu trvání.
- ▶ Jedná se o metodu, která může velmi dobře podpořit vytrvalost ve vysoké intenzitě a kratším objemu (do 60-120 min).
 - ▶ Maraton/půlmaraton
 - ▶ Triatlon
 - ▶ Cyklokros, MTB
 - ▶ Atp.



*kékolí navyšování příjmu S nad
andartní úroveň je potřeba velmi
atrně zkoušet. Jednoznačně není
bré tuto přípravu zařadit poprvé
před důležitým závodem...*

Hypersacharidová dieta

Princip

- ▶ *Principem hypersacharidové diety je maximálně navýšit příjem sacharidů v rámci krátkého období před závodem (1-2 dny) s cílem stejně jako u SSD optimalizovat (navýšit) zásoby svalového glykogenu.*
- ▶ Zvýšení příjmu S na 10-12 g/kg v období 36-48 h před závodním vytrvalostním zatí




Hypersacharidová dieta

Aplikace

Den	Příjem S
2.	8-10 g/kg/den
1.	10-12 g/kg/den
Závod	

Hmotnost	Příjem S	Celkem S
80 kg	8 g/kg/den	640 g
	10 g/kg/den	800 g
	12 g/kg/den	960 g

...a jednotlivých příkladech otravin můžete vidět, že dávky S jsou opravdu vysoké...
 Význam zde mají **doplňky stravy**, díky své vstřebatelnosti a vzájemnému poměru jednotlivých sacharidů.



Hypersacharidová dieta

Srovnání příjmu sacharidů - běžná strava

4 g S/kg

	Bílkoviny	Sacharidy	Z toho cukry	Tuky	Z toho nasyc.	Transm.	Monone.	Polyne.	Cholesterol	Vláknina	Sůl	Vápník
Snídaně:	18,1 g	76,9 g	33,3 g	14,6 g	5,2 g		4 g	4,7 g	14 mg	9,8 g	0,0 g	345 mg
Dopolední svačina:	9 g	85,3 g	50,7 g	11,8 g	0,3 g		0,0 g	0,3 g		9,9 g	0,6 g	41,8 mg
Oběd:	59,4 g	32,8 g		18,5 g						5,9 g	3,3 g	
Odpolední svačina:	14,4 g	61,5 g	30,5 g	10,9 g	6 g		1,2 g	1,1 g	20 mg	4,5 g	0,3 g	276 mg
Večeře:	26,3 g	34,2 g	5,1 g	26,9 g	6,9 g		9 g	4,2 g	688,5 mg	7,1 g	1,1 g	82,5 mg
Druhá večeře:	27,4 g	38,2 g	5,2 g	13,7 g	10,3 g		0,5 g	0,5 g		5,8 g	1,4 g	33 mg
CELKEM:	154 g	329 g	125 g	96 g	29 g		15 g	11 g	723 mg	43 g	7 g	778 mg

%DDD	191 %	168 %		219 %						153 %		
%DDD (po zohlednění aktivit) [?]	93 %	81 %		106 %						153 %		

Hypersacharidová dieta

Srovnání příjmu sacharidů - vysoký příjem S

12 g S/kg

Training the gut...

	Bílkoviny	Sacharidy	Z toho cukry	Tuky	Z toho nasyc.	Transm.	Monone.	Polyne.		
Snídaně:	18,3 g	135,2 g	91,6 g	15,2 g	5,2 g		4 g	4,7 g		
Dopolední svačina:	8,9 g	185,3 g	121,3 g	12,3 g	0,2 g		0,1 g	0,4 g		
Oběd:	1 g	144,4 g	65,8 g	39,9 g						
Odpolední svačina:	10,5 g	109,2 g	99,3 g	8,3 g	5,6 g		0,0 g	0,1 g		
Večeře:	19,1 g	142,7 g	137,5 g	1,2 g	0,4 g		0,0 g	0,1 g		
Druhá večeře:	86,5 g	225,4 g	16,9 g	91,1 g	4,9 g			24,7 g		
CELKEM:	144 g	942 g	532 g	168 g	16 g		4 g	5 g		
							63 mg	41 g	2 g	924 mg

%DDD	178 %	481 %		382 %					145 %		
%DDD (po zohlednění aktivit) [?]	131 %	352 %		280 %					145 %		



Hypersacharidová dieta

Shrnutí

- ▶ Výsledkem SSD i hypersacharidové diety je **superkompenzace glykogenu (navýšení zásob)**.
- ▶ 1-2 denní nutriční příprava bohatá na sacharidy vyžaduje určitý trénink trávicího traktu a správné načasování.
- ▶ Opět se jedná o metodu, která může velmi dobře podpořit vytrvalost ve vysoké intenzitě a kratším objemu (do 60-120 min).
 - ▶ Maraton/půlmaraton
 - ▶ Triatlon
 - ▶ Cyklokros, MTB
 - ▶ Atp.



Plánovat, trénovat a připravovat trávicí trakt. Cílem je vyhnout se:



Zajímavost - Yannis Kouros

Příjem S ultradistančního běžce

- ▶ r. 1982 vytvořil osobní rekord v maratonu 2 hodiny 25 minut.
- ▶ r. 1984 vyhrál šestidenní závod v New Yorku, když urazil 1022,8 km, čímž překonal rekord platný od roku 1888.
- ▶ Čtyřnásobný vítěz Spartathlonu (1983, 1984, 1986 a 1990) a držitelem traťového rekordu časem 20 hodin 25 minut (jak vzpomíná, ve Spartě tehdy očekávali první závodníky okolo desáté hodiny dopoledne; Kouros dorazil už v pět a musel rozhodčí vzbudit, aby zaznamenali jeho výkon).
- ▶ Pětkrát vyhrál 875 km dlouhý závod Sydney–Melbourne (1985, 1987, 1988, 1989, 1990).
 - ▶ **13400 kcal/den, 98 % sacharidů z CEP.**
- ▶ r. 1988 se stal mistrem světa v závodě na tisíc mil.
- ▶ r. 2002 vyhrál 197 km dlouhý závod Békéscsaba–Arad–Békéscsaba.
- ▶ Je držitelem světového rekordu ve dvacetičtyřhodinovém běhu (303,5 km) a v běhu na 1000 km (5 dní 16 hodin 17 minut).

Nutriční podpora vytrvalostních výkonů

- ▶ *V rámci dnešních výzkumů obecně platí, že medaile nevyhrává příjem bílkovin ani tuků, **nýbrž adekvátní příjem sacharidů před a během závodu.***
- ▶ Velký význam nutričních strategií, výživy bezprostředně před zatížením a příjem S během zatížení.

