

Pasivní pohyby – zásady, způsob provádění, pasivní pohyby HKK a DKK

Definice

- pohyb celého těla nebo jeho segmentu, který je vykonáván působením zevní síly – rukou fyzioterapeuta, pomocí přístroje, gravitací, využitím pomůcek (teraband, elasticický tah), tedy bez účasti svalové činnosti pacienta, pohyb má probíhat jen ve fyziologickém rozsahu
- skutečně pasivní pohyb - pouze u pacienta v bezvědomí, všude jinde je vyžadován určitý způsob spolupráce (např. relaxovat svalstvo a tím umožnit pohyb v plném rozsahu)

Význam pasivního pohybu

- udržení nebo zvětšení kloubní pohyblivosti
- zlepšení trofiky kloubu
- udržování normální délky vláken měkkých tkání (svalů, vaziva), které mají tendenci ke zkracování
- stimulace propriocepce (svalové, šlachové, kloubní receptory)
- stimulace pohybového systému

Možné typy pasivního pohybu:

- **pohyb v představě** (uvědomení si pohybu) – aktivuje činnost CNS i bez motorické odpovědi (např. cvičení v představě při sádrové fixaci, periferních parézách apod.)
- **intermitentní (přerušovaný) pasivní pohyb** – opakovaný pas. pohyb, který slouží k udržení kloubní pohyblivosti, brání vzniku srůstů a kontraktur
- **polohování** (stálý, permanentní pas. pohyb) – působení zevní síly malé intenzity ale po dlouhou dobu, snahou je docílit rozsah pohybu, který je měkkými tkáněmi omezen

Zásady

- **správný úchop končetiny** – úchop má být měkký ale pevný, daný segment by se neměl držet přímo za svaly, je nutné šetřit klouby – správně podepřít, nedovolit patologické úchytky (ve smyslu osy pohybu)
- **správná fixace** – nemá dojít k náhradním pohybům mimo procvičovaný kloub, fixace se nesmí dít přes dva klouby, má být bezbolestná
- **pohyb provádět pomalu** – obzvlášť na jeho konci, i zpětný pohyb je pomalý, ne trhavé pohyby, nepružit (při násilném provádění existuje nebezpečí vzniku mikrotraumat)
- **respektovat pocit bolesti** a neprekračovat tuto hranici, bolest funguje jako reflexní obranná reakce
- **pohyb provádět se současnou mírnou trakcí segmentu** – všude tam, kde to lze provedení pasivního pohybu provází **klidné dýchání a relaxace** pacienta

Počet opakování a délka provádění pasivního pohybu:

- 5-7x za účelem udržení volnosti kloubu (preventivní pohyby u imobilizovaných pacientů)
- 10-15x při uvolňování pohybu v kloubu (při omezeném rozsahu pohybu, kontraktury)
- pasivní pohyb provádět ideálně 2-3x denně

Příklady využití pasivního pohybu:

- pasivní cvičení u imobilních pacientů (v akutním stavu na JIP, ARO, dále při omezené pohyblivosti pro sníženou svalovou sílu nebo pro bolest)
- v neurologii – stav po CMP, periferní parézy
- stav, kdy pacient nesmí cvičit aktivně
- mobilizace, vyšetření kloubní vůle
- manuální uvolňovací techniky (protahování, PIR)
- nacvičování nové pohybové činnosti, úprava vadných pohybových stereotypů

Rozsah pohybu v kloubu

- *pasivní rozsah* – lze v daném kloubu dosáhnout působením zevní síly (při relaxaci svalů)
- *aktivní rozsah* – lze dosáhnout aktivitou vlastních svalů v okolí daného kloubu
- *fyziologický rozsah* – je dosti variabilní (viz. níž) a je limitován anatomickými strukturami (které nejsou patologicky změněny)
- *patologický rozsah* - může být zmenšený (pohybové omezení) nebo zvětšený (hypermobilita) oproti normě

Normální rozsah pohybu v kloubu je dán:

- tvarem skeletu (poměr velikosti hlavice a jamky kloubní, kontaktem kostěných segmentů, kostních výběžků v blízkosti kloubu)
- poddajností (napětím a rozložením) měkkých tkání v okolí kloubu (kůže, podkoží, sval)
- volnosti kloubního pouzdra a ligament
- při aktivním pohybu schopnosti kontrakce svalových vláken
- věkem (s přibývajícím věkem se snižuje elasticita vazivového aparátu)
- pohlavím (u mužů zpravidla menší rozsah kl. pohyblivosti než u žen)
- zaměstnáním

Význam změněného rozsahu pohybu v kloubu (zvětšený/zmenšený):

- změna biomechaniky kloubu – ovlivnění rozložení tlaků, irritace přetěžovaných částí kloubu a vznik předpokladu pro degenerativní kloubní procesy
- snížení pohyblivosti vede ke kompenzační hypermobilitě v sousedních kloubech
- negativní vliv na pohybové vzory daného segmentu a organismu jako celku
- změněné proprioceptivní informace z periferie s následnou poruchou řízení pohybu

Omezený rozsah pohybu

Příčiny omezení rozsahu pohybu:

1. *inkongruence kloubních ploch*
 - poúrazové stavy, degenerativní změny (artróza, RA), vrozené vady skeletu a kloubů
2. *nedostatečnost kloubního pouzdra*
 - srůsty (pozánětlivé, poúrazové, pooperační, svraštění kl. pouzdra při dlouhodobém znehybnění)
3. *porucha nitrokloubních elementů* (vazů, menisků, disků, meniskoidů)
 - organické – úrazové, zánětlivé, srůsty
 - funkční – kloubní blokády
4. *porucha svalů a fascií*
 - zkrácená délka svalu
 - porucha posunlivosti a protažitelnosti fascií proti sobě
5. *porucha v pohyblivosti kůže a podkoží*
 - organická - svrašťující se jizvy po úrazech, popáleninách, operacích
 - funkční bariéry v kůži a podkoží
6. *bolest*
 - signalizuje možné poškození či již proběhlou lézi tkáně
 - omezení pohybu postižené oblasti je hlavní ochranný biologický význam bolesti a je důležitým předpokladem kvalitních reparačních pochodů
pozn. zvětšování rozsahu pohybu tam, kde byl bolestí omezen, je kontraindikováno respektovat různý práh vnímavosti bolesti interindividuálně
nocicepce nemusí být vědomě vnímána (podprahová), přesto ovlivňuje pohyb

Vyšetřování pasivního pohybu

1. rozsah pohybu

Kvantitativně:

- **goniometrie** (planimetrická metoda SFTR) – hodnocení rozsahu pohybu ve stupních

Kvalitativně:

- *charakter odporu*, se kterým se v průběhu provádění pasivního pohybu a v jeho konečné fázi setkáváme:
 - okamžik vzniku reflexní rezistence ve svalu - pružný svalový odpor, pohybová bariéra
 - moment napínání ligamentózního aparátu a kl. pouzdra = tužší vazivový odpor
 - ukončení pohybu tvrdou zarážkou kostní
- *senzitivní pocit*, které pohyb provázejí (tah, tlak, bolest)
- *reflexní reakce*, které v průběhu pohybu vznikají

2. manuální vyšetření kloubů a měkkých tkání

- **vyšetření kloubní vůle** = schopnost mikropohybu v jiných směrech, než jsou typické pro pohyb v daném kloubu

Kloubní vůle může být:

- vymizelá = ztuhlý kloub
- snížená = snížená hybnost
- přiměřená = norma
- zvýšená = uvolněný kloub

3. vyšetření zkrácených svalů

- zkracování svalu je dynamický proces – nejprve zvýšení svalového tonu, při přetrvávání tohoto stavu tendence ke zkracování, které je zprvu reverzibilní, později se fixuje do kontrakturny
- ke vzniku zkrácení mají tendenci tzv. posturální svaly (svaly udržující polohu)

Možnosti terapeutického ovlivnění změněného rozsahu pohybu (zmenšeného/zvětšeného): viz. 5. cv.

Tabulka fyziologických rozsahů pohybu ve velkých kloubech HKK, DKK:

kloub	pohyb	rozsah			kloub	pohyb	rozsah		
rameno	flexe	0 - 180			kyčel	flexe	0 - 120		
	extenze	0 - 45				extenze	0 - 30		
	abdukce	0 - 180				abdukce	0 - 45		
	addukce	0 - 30				addukce	0 - 30		
	hor. abdukce	0 - 110				zev. rotace	0 - 45		
	hor. addukce	0 - 30				vnitř. rotace	0 - 30		
	zev. rotace	0 - 80							
	vnitř. rotace	0 - 70							
loket	flexe	0 - 150			kolenko	flexe	0 - 135		
	pronace	0 - 90							
	supinace	0 - 90							
zápěstí	extenze	0 - 70			hlezno	dorz. flexe	0 - 20		
	flexe	0 - 80				plant. flexe	0 - 50		
	rad. dukce	0 - 20				inverze	0 - 30		
	uln. dukce	0 - 30				everze	0 - 15		

Pasivní pohyby HKK

1. Ramenní kloub

FLEXE

- Poloha pacienta: leh na zádech
- Fixace a držení: pletenec pažní (clavicula a scapula) shora, končetinu uchopit ve výši epikondylů humeru, předloktí pacienta položeno na našem předloktí, při elevaci musíme přehmátnout – fixující ruka uchopí končetinu pacienta těsně nad zápěstím, druhá ruka dopomáhá pohybu tlakem na loket z dorzální strany
- Pohyb: provádíme flexi do 90st. popř. do 180st. (elevace)

EXTENZE

- Poloha pacienta: leh na bříše, hlava otočena na opačnou stranu
- Fixace a držení: pletenec pažní (clavicula a scapula) shora, paži držíme ve výši epikondylů humeru, předloktí pacienta položeno na našem předloktí
- Pohyb: provádíme extenzi do 45st., rameno se nesmí vtáčet do VR

ABDUKCE

- Poloha pacienta: leh na zádech
- Fixace a držení: pletenec pažní shora, paži pacienta ohnutou v lokti v pravém úhlu uchopíme za dolní konec humeru, ve své dlani máme olekranon (končetinu můžeme fixovat opřením o náš bok)
- Pohyb: do abdukce s naším současným úkrokem ve směru pohybu

HORIZONTÁLNÍ ADDUKCE

- Poloha pacienta: leh na zádech, 90st. abdukce v rameni, 90st. flexe v lokti
- Fixace a držení: paži držíme nad zápěstím, druhá ruka na dolní konec humeru, olekranon ve dlani
- Pohyb: horiz. addukce, tlakem na olekranon dotahujeme tak, aby se prsty dotkly druhého ramene

HORIZONTÁLNÍ ABDUKCE

- Poloha pacienta: leh na bříše, 90st. abdukce v rameni, 90st. flexe v lokti, předloktí směřuje k zemi
- Fixace a držení: fixace na lopatce, paži uchopíme na dolním konci humeru zespoda
- Pohyb: možný pouze malý rozsah (do 30st.)

ZEVNÍ ROTACE/VNIŘNÍ ROTACE

- Poloha pacienta: leh na zádech (lze i v lehu na bříše), 90st. abdukce v rameni, 90st. flexe v lokti
- Fixace a držení: pletenec pažní, končetinu držíme nad zápěstím
- Pohyb: provádíme ZR/VR

2. Loketní kloub

FLEXE

- Poloha pacienta: leh na zádech, paže podél těla
- Fixace a držení: dolní konec humeru z dorzální strany, úchop končetiny nad zápěstím
- Pohyb: provádíme v pronačním, středním i supinačním postavení

EXTENZE

- Poloha pacienta: leh na bříše, 90st. abdukce v rameni, předloktí svěšeno volně z lehátka
- Fixace a držení: na dolním konci humeru z ventrální strany, úchop nad zápěstím
- Pohyb: provádíme extenzi v lokti (pozor na hyperextenzi – nedotahovat do krajního rozsahu)

PRONACE/SUPINACE

- Poloha pacienta: leh na zádech nebo sed, 90st. flexe v lokti, paže a loket těsně u těla

- Fixace a držení: loketní kloub zespoda, úchop nad zápěstím (ne za ruku)
- Pohyb: ze středního postavení – pronace a supinace

3. Zápěstní kloub

DORZÁLNÍ FLEXE

- Poloha pacienta: v sedu, 90st. flexe v lokti, předloktí v pronaci, pacientova ruka mimo stůl
- Fixace a držení: nad zápěstím, pacientovu ruku držíme ve své dlani
- Pohyb: při pohybu nevyvracet pacientovy prsty, tlak do dorzální flexe přes dlaň a MP klouby

PALMÁRNÍ FLEXE

- Poloha pacienta: stejně jako u dorziflexe
- Fixace a držení: nad zápěstím, naše ruka je na dorzální straně ruky pacienta
- Pohyb: pohyb provádíme tlakem na hlavičky metakarpů, prsty jsou relaxovány

DUKCE RADIÁLNÍ/ULNÁRNÍ

- Poloha pacienta: stejně jako u dorziflexe
- Fixace a držení: nad zápěstím, ruku pacienta uchopíme z palcové/malíkové strany nad hlavičkami metakarpů
- Pohyb: provádíme za současného mírného tahu, a to ze střední polohy – obě dukce

Pasivní pohyby DKK

1. Kyčelní kloub

FLEXE

- a. s pokrčeným kolennem
 - Poloha pacienta: leh na zádech, DKK nataženy
 - Fixace a držení: za hřeben kosti kyčelní, běrec si položíme na své předloktí, které je v pronaci, prostor mezi palcem a ukazovákem položíme do podkolení
 - Pohyb: do flexe s pokrčeným kolennem
- b. s nataženým kolennem
 - Poloha pacienta: leh na zádech, DKK nataženy
 - Fixace a držení: fixace jednou rukou nad kolennem z ventrální strany, úchop DK zespodu v oblasti nad hlezenním kloubem
 - Pohyb: do flexe s nataženým kolennem

EXTENZE

- Poloha pacienta: leh na bříše, DKK natažené, nohy mimo podložku
- Fixace a držení: os sacrum shora, do své dlaně si položíme patelu cvičené DK a dolní č. femuru
- Pohyb: do extenze s nataženým/pokrčeným kolennem

ABDUKCE

- Poloha pacienta: leh na zádech, necvičená DK v abdukci, cvičená DK ve středním postavení
- Fixace a držení: hřeben kosti kyčelní, běrec si položíme na své předloktí, svoji dlaň na vnitřní stranu dolní části femuru
- Pohyb: do abdukce (pozor na zevní rotaci v kyčelním kloubu)

ZEVNÍ/VNITŘNÍ ROTACE

- Poloha pacienta: leh na zádech, cvičená DK flektovaná v kolenu, běrec visí mimo podložku, necvičená DK pokrčená, opřená chodidlem o podložku na kraji stolu
- Fixace a držení: fixace jednou rukou v podkolenní, držení druhou rukou nad hlezinem
- Pohyb: ZR = tlakem na zevní kotník vychylujeme běrec dovnitř
VR = tlakem na vnitřní kotník vychylujeme běrec zevně

2. Kolenní kloub

FLEXE

- Poloha pacienta: leh na břiše
- Fixace a držení: na os sacrum, úchop nad kotníky
- Pohyb: provádíme flexi, DK se nesmí uchylovat do ZR/VR

EXTENZE

- Poloha pacienta: leh na břiše (podložit dolní konec femuru)
- Fixace a držení: na os sacrum, úchop nad kotníky
- Pohyb: tlakem na dolní č. tibie provádíme extenzi v kolenu (pozor na hyperextenzi – nedotahovat)

3. Hlezenní kloub

DORZÁLNÍ FLEXE

- Poloha pacienta: leh na zádech, DKK natažené
- Fixace a držení: nad kotníky, patu držíme ve své dlani, předloktí opřené o plosku nohy pacienta
- Pohyb: provádíme se současným úkrokem/pohybem našeho trupu, současně tah Achillovy šlachy (pozn. totéž lze provádět s pokrčenou DK), nelámeme prsty do dorzální flexe

PLANTÁRNÍ FLEXE

- Poloha pacienta: leh na zádech, DKK natažené
- Fixace a držení: nad kotníky, úchop z dorzální strany nohy
- Pohyb: tlakem nad hlavičkami metatarzů provádíme pohyb do plantární flexe

EVERZE/INVERZE

- Poloha pacienta: leh na zádech, DKK natažené
- Fixace a držení: nad kotníky, držíme z dorzální a plantární strany hlavičky metatarzů
- Pohyb: ze středního postavení provádíme everzi/inverzi