


Bp1252 Biochemie

#3 Sacharidy a deriváty sacharidů

Sacharidy


- Monosacharidy
 - Oligosacharidy
 - Polysacharidy
- 
- cukry

Sacharidy vznikají v zelených rostlinách fotosyntézou z CO_2 a H_2O .


Monosacharidy

- Hydroxyderiváty aldehydů nebo ketonů (aldosy resp. ketosy)
- Podle počtu uhlíků rozeznáváme: triosy, tetrosy, pentosy, hexosy, heptosy atd.
- Nejvýznamější jsou: aldopentosy, aldochexosy a ketohexosy

Monosacharidy




L-glyceraldehyd




D-glyceraldehyd

- Enantiomery = stereoizomery, které jsou zrcadlovými obrazy
- Diastereomery = stereoizomery, které nejsou zrcadlovými obrazy


Aldosy




Ketosy



Monosacharidy – cyklické formy




Monosacharidy – cyklické formy




Deriváty sacharidů

- Glukosamin a *N*-acetylglukosamin




Deriváty sacharidů

- Kyselina glukonová




- Kyselina glukuronová

význam při vylučování látek z organismu




Disacharidy

- Sacharosa



Složena z D-glukosy a D-fruktosy.


- Maltosa



Složena z D-glukosy.

Disacharidy

- Laktosa



Složena z D-glukosy a D-galaktosy.

Polysacharidy

- Homopolysacharidy

Složeny z jednotek jednoho sacharidu.

- Heteropolysacharidy


Složeny z různých jednotek.

Homopolysacharidy

- Škrob

Zásobní forma glukosy u rostlin. Tvoří více než polovinu všech cukrů přijímaných v potravě člověka.

- ❖ Amylosa – nerozvětvená forma, tvoří šroubovice
- ❖ Amylopektin – rozvětvená forma




Starch and Glycogen
(α -1,4 linkages)

Homopolysacharidy

- Celulosa


Složena z glukosových jednotek, lidské enzymy celulosu neštěpí.



Homopolysacharidy

- Glykogen


Zásobní forma glukosy u člověka a zvířat.
Polysacharidový řetězec je rozvětvený.



Starch and Glycogen
(α -1,4 linkages)

Heteropolysacharidy


- Kyselina hyaluronová



složená z kyseliny glukuronové a
N-acetylglukosaminu;
250-25 000 disacharidových jednotek
Vyskytuje se v kloubní tekutině.

Heteropolysacharidy

- Chondroitin sulfát



Složený z převážně z *N*-acetylgalaktosaminu a kyseliny glukuronové. Na GalNAc jednotce jsou vázány sulfátové skupiny.

Hlavní složka chrupavek.

Heteropolysacharidy

- Heparin

Složen z glukosaminu, kyseliny glukuronové a kyseliny iduronové. Většina aminoskupin GlcNH_2 jsou sulfatované, některé -OH skupiny také.

(Kyselina iduronová odvozená od aldohexosy idosy.)

Snižuje srážlivost krve (antikoagulantum).