



# MUDr. Zdeněk Pospíšil

Patofyziologie ledvin

# Anatomie močového systému.



Základní funkční jednotkou je nefron složený z buněk glomerulu, tubulu a cévní kapiláry.




1. zadržování odpadních látek metabolismu
2. k poruše vodní a elektrolytové rovnováhy

# Nemoci

Etiologie :

- prerenální/šoková ledvina  
,hepatorenální sy/  
- cévy
- renální/glomerulonefritidy,  
pyelonefritidy/  
- glomeruly  
- tubuly
- postrenální / s obstrukcí  
vývodných cest/  
-nadměrná tvorba  
nerozpustných komplexů ( urolithiaza)




# Mechanizmy poškození

## Obecné mechanizmy

- Cirkulační selhání  
(hypotenze, hypovolémie)
- Systémová inflamace  
(TNF-alfa, IL1, IL6...)
- Oxidační stres  
(NO, peroxynitrit)
- Porchy mikrocirkulace  
(dysfunkce endotelu, a-v zkraty)
- Mitochondriální dysfunkce  
(bioenergetické selhání)

## Renálně specifické poruchy



- Glomerulární vazomotorická dysfunkce
- Glomerulární mikrovaskulární trombóza
- Peritubulární mikrovaskulární poškození
- Zánětlivá infiltrace intersticia
- Dysfunkce tubulů:
  - subletální trauma
  - tubulárni apoptóza
  - tubulárni nekróza

Akutní poškození ledvin

# Prerenální -Renovaskulární nemoci

Příčiny:

- Ischemie v oblasti renálních cév a břišní aorty poškozuje ledvinu nedostatečným zásobením
- Cirkulační šok-hypotenze-šoková ledvina-vzniká nekrosa tkání ledviny-anurie.
- Nefrosklerosa-poškození kapilár u DM a hypertenze-hrozí selhání ledvin s uremií :
  - hromadění odpadních produktů bílkovin /urea,kreatin,kreatinin,KM/
  - nerovnováha tekutin a elektrolytů ( retence vody a porucha acidobazické rovnováhy)
  - projevy uremického stavu-zvracení,průjmy, anorexie,hubnutí,uremická encefalopatie,rozvrat
- Hemolytické mikroangiopatické anemie

# Renální onemocnění


## Poruchy glomerulů

Důsledek :porucha filtrační membrány-zadržování a propouštění procházejících látek metabolické přeměny/N-látky,bílkoviny/

Klinicky : akutní a chronické formy s proliferací

Funkční porucha nefronu : nefrotický/proteinurie/ a nefritický/hematurie /syndrom

Nejčastější příčina:imunologický podklad s destrukcí, s tvorbou komplexů/antigen-protilátka/



# Poruchy tubulů


Důsledek: postižení sběrného systému zánětem z krve nebo z vývodných močových cest.

Klinicky : pyelonefritidy akutní a chronické,cystopyelitidy,uretritidy-podklad bakteriální infekce a zpomalený odtok moči/retence/

Intersticiální nefritida-působení toxických látek ale i léků a zvýšené koncentrace Ca a KM/nadužívání analgetik/



# Postrenální onemocnění



## Nefrolitiazza

Příčiny: tvorba nerozpustných komplexů-urátové,  
oxalátové,fosfátové,kalciové

Hyperkalciurie ,hyperurikemie,větší přívod oxalátů v potravě  
a ostatní metabolické poruchy

Důsledky : podkladem je větší koncentrace komplexů,snížený  
odtok,změna kyselosti,dehydratace,  
zánět.patologie odvodných močových cest


Klinika: kolika ledvinná,CHRI.

# Nádory močové soustavy

Ledviny- Grawitzuv n.  
močový měchýř,...  
metastázy

Klinika :

- bolest
- změna funkce
- nález v moči - krev



# Indikátory onemocnění a léčba

- základní chemické a bakteriologické vyš. moči - hrubý odhad stupně poškozen /vyš na B,C,ketolátky ,válce/
- základní vyš. krve-hodnota kreatinin,KM,urea
- zobrazovací metody -rtg,CT,MR ledvin
- ostatní - clearence,biopsie



## Léčba dle závažnosti zjištěného stavu funkce

- medikamentozní s úpravou metabolismu
- dialýza peritoneální a přístrojová
- transplantace

# Poruchy vodního hospodářství




- Intracelulární tekutina (65%) a extracelulární (35%):plazma,mezibuněčný prostor a transcelulárně
- Buněčná membrána a stěna kapilár :-volně prostupné ro  $H_2O$ ,platí i pro ionty a elektrolyty

Příjem tekutin= výdej (homeostáza). Fyziologická sekreční schopnost ledvin.

- **Dehydratace**-celkové snížení vody-útlum reabsorpce v tubulech ledvin  
(nízká sekrece ADH u diabetes insipidus,vyšší hladina glukózy u DM s osmotickým působením)
- **Intoxikace vodou**-při nadbytku ADH


# Hyperhydratace

## A. Příčiny hyperhydratace




# Dehydratace

## B. Příčiny dehydratace



# Následky hyper a dehydratace

## C. Nejzávažnější následky hyper- a dehydratace



- **Deplece volumu** – při těžkých ztrátách pocením,zvracením,diuterika popáleniny,ztráty do intersticia a transcelularního prostoru(záněty )
- **Nadbytek volumu**-při nemozech ledviny nebo jater,srdce s tvorbou otoků a ascitu
- **Nerovnováha elektrolytů :**
  - 1.Nadbytek a nedostatek Na spojený s vodou
  2. K v nadbytku-život ohrožující stav,deplece K –poruchy příjmu ( arytmie, srdeční zástava)
  - 3.Ca nadbytek/vitamin D v nadbytku,Ca deplece-tetanie

# Poruchy acidobazické rovnováhy

- pH krve : 7,36-7,44
- ↓ acidóza ↑ alkalóza
- Pufrové (nárazníkové systémy) - homeostáza
- Dvě složky:
  - respirační (schopnost plic vylučovat CO<sub>2</sub>)
  - metabolická (vylučování kyselých produktů ledvinami)
- Pojmy- respirační acidóza x respirační alkalóza  
metabolická acidóza x metabolická alkalóza