

Trávicí systém


MUDr. Zdeněk Pospíšil

Spojení ze zevním prostředím

- oboustranně otevřená trubice

Funkce :

- Trávení - rozklad součástí potravy, působení enzymů, peristaltika, zahuštění (začíná v dutině ústní)
- Absorpce živin přes membrány buněk GIT, tenké střevo (povrch 300 m)
- Vyprazdňování
- Detoxikační funkce





Přehled poruch GIT dle příčiny:

Zánětlivá onemocnění

- infekční

ezofagitida, gastritida, duodenitida,
ileitida, colitida/appendicitida/

-toxické látky, ale i léky



Mechanické příčiny

- refluxní choroba jícnu
- illeosní stavy (torze,srůsty)



Ischemické příčiny

- nedostatečné krevní zásobení
(nekrosa vyživované části)

Nervově paralytické stavy

- ustává pohyb trávicí trubice
poruchy inervace

Malnutrice,karence mikronutrientů




Důsledky se projevují jako náhlé příhody břišní -urgentní zásah

Klinické projevy :

- **zástava pohybu tráveniny**
pasáží : bouřlivé
příznaky-odvislé od výše
postižení (NPB, mizerere)
- **krvácení** : přítomnost
čerstvé nebo natrávené
krve ve stolici nebo
zvratcích (narušení
sliznice a cévy)

Léčba u obou dle závažnosti konzervativní nebo chirurgická



-bolest



-zvracení- z dráždění v samotném zažívacím ústrojí-
dehydratace

-průjem-zvýšený obsah vody ve stolici a více defekací
- typy/sekreční,osmotický,malabsorpční/

-nadýmání

-ostatní :

teplota, peritoneální dráždění, schvácenost, pruritus,
ascites,...




Nemoci jícnu

Příčiny :

- refluxní onemocnění jícnu
- brániční hernie
- atrofické změny jícnu (úraz, popálení, poleptání)
- jícnové varixy (portální hypertenze)
- nádory jícnu


Příznaky : nausea, zvracení, pálení za sternem, masivní krvácení, reflux

Důsledky : zánět mediastina, zúžení jícnu




Nemoci žaludku a duodena

- Vznik po překonání ochranné bariery /rychlá náhrada buněk sliznice,hlen ,hydrogenuhličitan v okolí buněk/
- Vznik erosí a defektů /snížená ochranná bariera,agrese stravy a chem.látek,hypersekrece žaludečních žlázek,vliv alkoholu,kouření,stresorů a infekce Helicobacter/



Vředová choroba



Komplikace:penetrace,perforace,krvácení
zvláštní skupina stresových
vředů/popálení,traumata,těžké stavы
celkových infekcí/

Nemoci střev


- Nedostatečná absorpcie živin

Příčiny

- infekce (ileitida,colitida-apendicitida)
- nedostatek některých složek trávení (coeliakie)
- zkrácení trávící trubice
- nemoci sliznice (vředy- Crohnova choroba,změny plochy - divertikuloza,blokáda vstřebání do lymfat.cest-Hodkin)
- nádory


Příznaky a důsledky

nausea,zvracení,nadýmání,průjem,zácpa,hubnutí,kachexie



Patofyziologie jater

- největší orgán (1,5kg)
lalůčkovitá struktura, hepatocyty,
krevní zásobení cestou
hepat.arterie a v.portae
- jaterní sinusoida, žlučové kanálky, průtok krve 1,5l/min
produkce žluči 1l/den.
- opožděné projevy, dobrá regenerace buněk, 10% tkáně
zajišťuje funkčnost
- Funkce :
 - metabolická - transformace cukrů, tuků, bílkovin
jejich uložení do rezerv ve formě glykogenu
 - detoxikační - úprava cizorodých látek, vyloučení
 - skladová - látky, které tělo neumí vyrobit - vitaminy A, B₂, B₆, B₁₂, D, K, železo, měď



Nemoci jater

Poruchy jaterní buňky : steatoza,fibroza,cirhoza


Příčiny :

- alkohol
- portální hypertenze-zvýšení odporu při průtoku játry
tvorba jícnových varixů,ascitu,zvýšení N látek v krvi
zvětšení sleziny,poruchy koagulace a detoxikace látek.
- nádory jater,metastázy
- infekční zánět jater-hepatitida A,B,C,D,E
- toxiny, houby,glykosol,léky,rozpuštědla

Projevy:

- klinické-zvětšení jater,žloutenka,ascites,kožní léze,krvácivost.
- biochemické : JT,bilirubin

.....jaterní selhání



Poruchy odtoku a produkce žluči

Nejčastější příčina : žlučové kameny-omezení odtoku žluči do střeva

Projevy : žloutenka, bolest, zvětšení jater

Typy žloutenek-dle příčiny


-obstrukční

-hepatocelullární :

- infekční příčina (A,B,C,D)

- toxická

-hemolytická



Slinivka/pankreas/


- Uložení v oblasti duodena

- dvojí funkce:


- zevně sekretorická

- produkce trypsinu – při obstrukci samonatrávení s projevy nekrosy acinů

- vnitřně sekretorická
porucha tvorby insulinu
DM



Nemoci slinivky



Akutní pankreatitida

-aktivace enzymu ve vývodech život ohrožující
NPB/šok, edém plic, selhání ledvin/

Chronická pankreatitida

-opakované drobnější ataky

-alkohol, infekce./malabsorpce, diabetes, tvorba vaziva/

Nádory slinivky

Porucha vnitřní sekrece

- Diabetes mellitus

