

Neurologie

hlavové nervy

MUDR. KATERÍNA KAPOUNKOVÁ

NEUROSTATUS

- ▶ somatopsychický status
- ▶ orientační „interní nález“
- ▶ další vyšetření

sestavování vyšetřovacího nálezu vyžaduje **přísně systematický postup
"od hlavy k patě"**

končí vyšetřením stojí, chůze, somatosenzorického systému

Somatopsychický STATUS

Od vstupu do poradny

- ▶ chování, vzhled, oblečení, upravenost, způsob chůze (souhyby horních končetin, svižnost, délka a rychlosť kroků, zvedání dolních končetin, jistota chůze, směrové odchylky atd.)
- ▶ gestikulace, plynulost a intonace řeči, vyjadřování, přiměřenost odpovědí apod.
- ▶ nálada a emoční ladění (deprese, anxiozita, euforie)
- ▶ orientačně recentní a dlouhodobá paměť a koncentrace pozornosti

Somatopsychický status

Cílené dotazy

- ▶ orientace místem, časem a osobou
- ▶ zaznamenáváme poruchy myšlení, úsudku
- ▶ případné aktivní psychotické projevy (bludy, halucinace atd.)
- ▶ kvantitativní poruchy vědomí = hloubka bezvědomí (somnolence, sopor, koma, stupeň podle Glasgow Coma Scale)
- ▶ dominantní ruka (pravák, levák, ambidexter), event. přeučený levák

Orientační „interní nález“


- ▶ součástí neurostatu ⇒ TK, puls
- ▶ otoky dolních končetin a jiných otoků, důležité je posouzení pulzace končetinách tepen (a. radialis, a. axillaris, a. femoralis, a. poplitea, a. dorsalis pedis)

Další vyšetření

- sestavování vyšetřovacího nálezu vyžaduje **přísně systematický postup "od hlavy k patě"**
- končí vyšetřením stoje, chůze, somatosenzorického systému



Přehled mozkových nervů



Abnormality ve funkci hlavových nervů mohou vzniknout

- ▶ Z léze nervu
- ▶ Z léze nervového jádra
- ▶ V aferentních a eferentních drahách
- ▶ Z generalizovaného postižení nervů a svalů

Když vyšetřujeme hlavové nervy potřebujeme určit **přítomnost abnormality a přidružené potíže**

Pozor postižení se může týkat i více nervů

I. (N. OLFACTORIUS)

Vyšetření

- ▶ subjektivně
- ▶ objektivně:
 - ▶ Vybrané látky (mentol, kafr, čpavek)- zavřené oči
 - ▶ Olfaktometr
 - ▶ Nějaký předmět (pomeranč, krabice džusu,...)

Co zjišťujeme

- ▶ Látky správně identifikuje - normální nález
- ▶ Není schopen rozpozнат vůně, ale pozná čpavek – anosmie
- ▶ Nerozpozná žádný pach ani čpavek – nejde o organické postižení

Poruchy čichu

► Poruchy kvantitativní:

- ▶ HYPOSMIE, ANOSMIE (jednostranná - fraktury baze, meningeomy, tu front. laloku aj.)
- ▶ HYPEROSMIE (neurotická porucha, intoxikace kokainem)

► Poruchy kvalitativní:

- ▶ DYS,-PAROSMIE (pačich, např. rhinitidy)
- ▶ KAKOSMIE (vnímání nepříjemných čichových vjemů)
- ▶ ČICHOVÉ PSEUDOHALUCINACE, UNCIFORMNÍ KRIZE (vnímání neexistujících pachů (př. temporální epi, tu temp. laloku))

II. (N. OPTICUS)

Vyšetření

- ▶ Podívat se na oči – sledovat stranový rozdíl
- ▶ Úroveň víček – povšimnout si asymetrie
- ▶ Podívat se na pozici očí (exo a enoftalmus)
- ▶ Kontrola zornic : mají stejnou velikost ?

Reakce zornic na osvit – přímá fotoreakce (každé oko zvlášť)

Ale vyšetřujeme celé oko !!!

Ptóza = pokles víčka




Akomodace zornic- prst 10 cm a přiblížovat, pohled do dálky a pak na prst

Možné patologické nálezy:

oboustranné zúžení -v souvislosti s blefarospazmem

oboustranné rozšíření - u exoftalmu


asymetrie se pozoruje při jednostranné ptóze víčka (**Claude-Bernard-Hornerův syndrom** - ptóza, mióza, enoftalmus u leze krčního sympatiku)



- Zraková ostrost (vyšetřovat s brýlemi), každé oko zvlášť
- Optotypy (6 m vzdálenost)
- Tabulka pro čtení zblízka (30 cm od očí)- i orientačně (noviny)

- Zorné pole

Upažit obě ruce 50 cm stranou a 30 cm nad pod úroveň očí , vyšetřovaný sleduje pohyby ukazováku



Když nevidí :Spočítat prsty, vidí pohyb ruky, vnímá světlo

III. (N. OKULOMOTORIUS)

IV. (N. TROCHLEARIS)

VI. (N. ABDUCENS)

Vyšetření

- ▶ Sledovat pozici hlavy (hlava vychýlená od strany léze IV.)
- ▶ Podívat se na oči – ptóza
- ▶ Oči divergují nebo konvergují ? Je přítomna deviace oka do šikma ?

Test konvergence - dívat se na přibližující se prst ze vzdálenosti 50 cm



Poruchy okohybných nervů

- Základním projevem okohybné poruchy - **diplopie** (dvojité vidění).
- **Pokud přijde pacient s diplopií, pak je nejdůležitější zjistit zda se jedná o izolované postižení okohybného nervu nebo kombinované** (případně i s poruchami dalších hlavových nervů)

Paréza n. III

- přítomna **ptóza**
- **divergentní strabismus** (přetažení ve směru n.VI.)
- **diplopie** při pohledu ve směru postižených svalů
- **mydriasa**


Paréza n. IV

- **Není** přítomen výrazný strabismus
- **diplopie a paréza při pohledu dolů a dovnitř**

Přítomnost
nystagmu ?

Paréza n. VI

- **konvergentní strabismus** (vzhledem k zachované inervaci n. III)
- **omezený pohyb bulbu zevně**, kde je i **diplopie**.



V. (N. TRIGEMINUS) VII. (N. FACIALIS)

Z klinického hlediska je důležité rozlišovat tzv. horní a dolní větev

Vyšetření

- ▶ Prohlédnout obličej celkově: hypomimický, abnormální pohyby n.VII
- ▶ Vrásky na čele, nazolabiální rýhy
- ▶ Pozorovat spontánní mimiku- smích, mrknutí
 - zvednutí obočí, zamračení, pevně zavřít oči, pohlédnout na strop
 - vycenit zuby, vyštíplit rty nebo zapískat



The Ear



Korneální reflex (aferentace – V., efferentace- VII : dotyk rohovky- zavřou se obě oči

Chvostkův příznak:


je projevem **zvýšené idioneurální dráždivosti** → **bývá projevem hypokalcemie, u tetanických syndromů**
vyšetřuje se poklepem na větvení faciálního nervu
pokud je přítomen-homolaterální **záškub filtrá** horního rtu směrem ke straně poklepu

n.VII – n. intermedius

Chuť prvních dvou třetin jazyka

n.V- motorický

Test žvýkacích svalů – vyzvat k zatnutí zubů
Maseterový reflex




n. V. – senzorický
bolestivost výstupů jednotlivých větví
test jemného doteku (V1-čelo, V2- tváře, V3-dolní ret)



Možné patologické nálezy:

• **paréza centrální** - se projevuje jednostranným postižením **dolní větve**, t. j. poklesem koutku ústního, vyhlazením nazolabilální rýhy, neschopností se špulit ústa nebo zapískat. Vyskytuje se **u cévních mozkových příhod**, někdy i zcela izolovaně (bez současné hemiparézy)

• **paréza periferní** - je charakterizována jednostranným postižením **horní i dolní větve**. Pro horní větev je typická především asymetrie očních štěrbin (štěrbina je širší), neschopnost zavřít oko. Bulbus se stáčí zevně (**Bellův příznak**) při pokusu zavřít oči. Pacient má vyhlazené vrásky, není schopen se zamračit nebo vytáhnout obočí.



- Neuralgie trigeminu (demyelinizace, tu) – 2. a 3. větev nejčastěji, šleh bolesti (trigger point), jaro a podzim
- **Bellova obrna** (idiopatická) - věk kdykoliv, často po nachlazení, 6 týdnů – 3 měsíce, příznivá prognóza

VIII. (N. vestibulocochlearis)

Vyšetření

n. cochlearis


- ▶ Sluchová ostrost, každé ucho zvlášť + zavřené oči. Jedno zakrýt a k druhému přiložit hodinky (tření prstů)

Rinneho test : přiložit ladičku na processus mastoideus a před ucho – co je hlasitější

Weberův test : ladička na temeno – ve kterém uchu hlasitější

n. vestibularis

- ▶ Jedenak dotazem – subjektivně na vnímané poruchy rovnováhy, specificky vertiga
- ▶ Vyšetření stojí
- ▶ Přítomnost nystagmu, tinnitusu



Příznaky poškození vestibulárního systému : vertigo, nystagmus, nausea, vestibulární ataxie

► Periferní vestibulární syndrom

postižen n. vestibularis a labyrinth (Méniérova choroba, neuronitis vestibularis, zoster oticus, toxiccké poškození)

► Centrální vestibulární syndrom

postižena **vestibulární jádra** nebo **dráhy**

Poruchy sluchu

- **hypacusis** = nedoslýchavost
- **anacusis** = ztráta sluchu
- **tinnitus** – vnímání neexistujícího zvuku (šumění, pískání,...), způsobeno irritací N. cochlearis, nebo Cortiho orgánu

nedoslýchavost

- **převodní** – potíž je v zevním zvukovodu (např. cerumen, cizí těleso)
- **percepční** – způsobena lézí kochley nebo lézí **ncl. cochlearis**
- **neurální** – postižení N.VIII. a centrálních afferentních drah

periferní vestibulární syndrom: harmonický, shodný směr pomalé složky nystagmu a deviace, pac padá na stranu poškozeného labyrinthu – způsobeno poruchou 1.neuronu vestibulární dráhy (receptory)

Centrální vestibulární syndrom: není závislý na poloze hlavy; provázen trvalou závratí; tonické úchylky směřují různými směry; dysharmonický; vzniká při postižení 2.N vestibulární dráhy - postižení jader a jejich projekce

IX. (N. GLOSSOPHARYNGEUS)

X. (N. VAGUS)

XII. (N.HYPOGLOSSUS)


Vyšetření

- ▶ Vyšetření řeči
- ▶ Otevřít ústa – dásně, jazyk, měkké patro (patrové oblouky)
- ▶ Podívat se na uvulu: postavení (ve středu), říct ááááá (ve středu)
- ▶ Polknout : sklenice vody – sledovat koordinaci

Dávivý reflex: dotyk stěny faryngu za patrovými oblouky

Patrový reflex- dotykem špachtle P,L
oblouk- drobné zvednutí oblouku

Test XII: vypláznout jazyk- plazení středem



Poruchy n. IX

poruchy polykání (= mírná dysfagie), poruchy dávení (chybí afferentace dívícího reflexu), poruchy senzitivity, snížené vnímání chuti a žlázek - nevýrazné

Neuralgie glossopharyngeu - iritační bolesti v oblastech innervovaných senzitivními vlákny (UCHO, tonsilla palatina)

Poruchy n. X

jednostranná

poruchy polykání (= dysfagie), chrapotání, změny krevní tlaku, uchylování uvuly
oboustranná

rhinolalie (= řeč nosem), poruchy řeči (= dysartrie), hypertenze, příp. zástava dechu

Iritace n. vagus

bradykardie, spazmy trávící trubice (laryngospasmus, oesophagospasmus, pylorospasmus)


Poškození n. XII

► jednostranná léze:

- ▶ **hemiglosoplegie** (obrně poloviny jazyka)
- ▶ postižená strana jazyka je **atrofická**, někdy se
- ▶ v klidu se jazyk stáčí na zdravou stranu a při plazení se stáčí opačně, tedy na postiženou stranu

► oboustranná léze:


- ▶ dochází k ochrnutí obou polovin jazyka (**glossoplegie**) – nelze vypláznout, je narušená řeč (dysartrie)



Bulbární syndrom

- ▶ N IX, X a XI mají společné jádro v oblasti prodloužené míchy (často s nimi poškozen XII) – často společné poškození = **bulbární syndrom**
- ▶ **Projevy** : dysartrie, dysfagie, pokles měkkého patra (příznak opony), snížený nebo vyhaslý dávivý reflex, atrofie jazyka, fascikulace jazyka
- ▶ Oba u ALS

Pseudobulbární syndrom: postiženy dráhy nad jádry těchto nervů (přítomný dávivý reflex a postižení jazyka je malé)



Bulbární, pseudobulbární syndrom

XI. (N: ACCESORIUS)

Vyšetření

- ▶ Prohlédnout krk – m. sternocleidomastoideus (fascikulace, hypotrofie)
- ▶ Hlava v normální pozici ? Vyzvat aby tlačil hlavu vpřed
- ▶ Ramena – vyzvat aby zdvihnul ramena

