

# ZÁKLADY STATISTIKY

## **3. ANALYTICKÁ STATISTIKA**

**3.1 Opakování: výzkumné soubory,**

**3.2 Hypotéz nulová/alternativní**

**3.3 Věcná a statistická významnost**

**3.4 Testování statistických hypotéz**

# (MATEMATICKÁ) STATISTIKA

```
graph TD; A["(MATEMATICKÁ) STATISTIKA"] --> B["DESKRIPTIVNÍ"]; A --> C["ANALYTICKÁ"]; B --- D["(popisná)"]; B --- E["zpracování a popis"]; B --- F["dat"]; C --- G["(inferentní, induktivní)"]; C --- H["analýza a vyhodnocení"]; C --- I["dat"];
```

## DESKRIPTIVNÍ

(popisná)

zpracování a popis  
dat

## ANALYTICKÁ

(inferentní, induktivní)

analýza a vyhodnocení  
dat

### Využití analytické statistiky:

(1) prokázat **významnost** či **nevýznamnost** vlivu

intervence mezi výsledky testu vytrvalosti dvou  
tréninkových skupin (**tréninková metoda**),

(2) Prokázat významnost intersexuálních diferencí síly

mezi soubory tenistů a tenistek 11-12 let (**gender**).


## 3.1 Stručné opakování

### TYPY VÝZKUMNÝCH SOUBORŮ

#### ZÁKLADNÍ SOUBOR (ZS)

(generální soubor, population, Grundgesamtheit) **je soubor všech jedinců, u kterých bychom teoreticky měli šetření provádět.**

**ZS je obvykle není dostupný, výzkum je možný pouze s omezeným počtem jedinců (objektů), soubor nazýváme **výběrový soubor** (sample, Stichprobe).**



**VÝBĚROVÝ SOUBOR** získaný náhodným, resp. záměrným výběrem je podmnožinou prvků základního souboru.

Z poznatků zjištěných u **náhodně vybraného** výběrového souboru, můžeme (při splnění určitých statistických požadavků) činit **závěry platné pro základní soubor.**

## **ZÁVISLÉ SOUBORY**

(test hod na koš, družstvo A 1., 2. pokusy)

## **NEZÁVISLÉ SOUBORY**

(test hod na koš, družstvo A, družstvo B)

## 3.2 HYPOTÉZY

**HYPOTÉZA** je podmíněný výrok o vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými (Kerlinger, 1972).

Hypotézy jsou důležité, nepostradatelné prostředky vědeckého výzkumu; jsou to pracovní nástroje teorie.

### **Kritéria dobrých hypotéz**

1. hypotézy jsou ***výroky o vztazích*** mezi proměnnými
2. hypotézy obsahují ***jasné implikace*** pro ověřování předpokládaných vztahů (např. jestliže ..., pak ...).

**Hypotéza formuluje předpokládaný vztah mezi proměnnými, který se pomocí testování hypotéz zamítá nebo nelze zamítnout.**

**Druhy hypotéz** (Röthig, 1992)

**1. Pracovní hypotéza** - subjektivní domněnky o předmětu výzkumného problému.

Pracovní hypotéza je formulována všeobecně, je základem pro realizaci předvýzkumu.

**2. Výzkumná (věcná) hypotéza** – zdůvodněný předpoklad o existenci vztahu mezi dvěma či více proměnnými.

Zpřesněná formulace, ověřujeme testováním statistických hypotéz.

**3. Statistická hypotéza** - hypotetické tvrzení vyjádřené ve **statistických termínech** o relacích, vyvozených z předpokládaných vztahů ve věcné H.

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_A: \mu \neq \mu_0 \quad ; \quad H_A: \mu > \mu_0 \quad ; \quad H_A: \mu < \mu_0$$

Stupeň obecnosti ověřovaného tvrzení (hypotézy)

klesá (od pracovní H  $\rightarrow$  ke statistické H).

Stupeň přesnosti ověřovaného tvrzení (hypotézy)

vzrůstá (od pracovní H  $\rightarrow$  ke statistické H).

Hypotéza je testována pomocí tzv. **testovacích metod (testů)**, hypotézu **zamítáme**, resp. **nezamítáme**.

# HYPOTÉZA NULOVÁ

Základním typem úvahy při statistickém testování tzv. *nulová hypotéza* ( $H_0$ ).

Podstatou *nulové hypotézy* je odůvodněný předpoklad, že mezi dvěma jevy **není statisticky významný rozdíl** (rozdíl je nulový, resp. velmi malý).

Jako *nulová hypotéza* se označuje domněnka, že dva statistické soubory **se shodují** v určitých statistických parametrech (např.  $M$ ,  $r$ ).

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad (M_1 = M_2; r_1 = r_2)$$



**Nepravděpodobný výsledek ( $H_0$ )** má být stanoven **předem** (*tělesná výška tenistů/ -tek U14 je stejná*).

Výsledky testování hypotéz jsou posuzovány na tzv. **hladině významnosti ( $p, \alpha$ )**, která vyjadřuje **pravděpodobnost chyby I. druhu** (tedy chybné zamítnutí testované hypotézy).

Úroveň hladiny významnosti  **$p = 0,05$**  ( $0,01$ ) znamená, že nulová hypotéza se **zamítá**, když pravděpodobnost platnosti nulové hypotézy **je menší než 5%** ( $1\%$ ).

# HYPOTÉZA ALTERNATIVNÍ

Předpokládáme-li, že mezi dvěma jevy **existuje významný rozdíl**, formulujeme tzv. **alternativní hypotézu  $H_A$** .

Hypotéza  **$H_A$**  popírá platnost nulové hypotézy ( $H_0$ ), vymezuje situaci, když se  $H_0$  zamítá.

**Výsledek pravděpodobný** (TV  $M \neq \check{Z}$ ; U14,  $H_A$ ), resp. **nepravděpodobný** (TV  $M = \check{Z}$ ; U14,  $H_0$ ) **musí být stanoveno předem**.

**H: oboustranná**      **resp.**      **H: jednostranná**

**$H_A: \mu \neq \mu_0$  ;  $H_A: \mu > \mu_0$  ;  $H_A: \mu < \mu_0$**

## 3.2 STATISTICKÁ A VĚCNÁ VÝZNAMNOST

**Brownlee**, J. (2020). *A Gentle Introduction to Statistical Power and Power Analysis in Python*. Retrieved from <https://machinelearningmastery.com/statistical-power-and-power-analysis-in-python/>

**Cohen**, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

**Hopkins**, W. (2016). *A New View of Statistics*. <http://www.sportsci.org/resource/stats/index.html>

**Cumming**, et al. (2012). The statistical recommendations of the American Psychological Association Publication Manual: Effect sizes, confidence intervals, and meta-analysis. *Australian Journal of Psychology*, 64, 138–146. doi:10.1111/j.1742-9536.2011.00037.x

**Soukup**, P. (2013). Věcná významnost výsledků a její možnosti měření. *Data a výzkum*, 7(2), 125–148. <http://dx.doi.org/10.13060/23362391.2013.127.2.41>.

## **3.2 STATISTICKÁ A VĚCNÁ VÝZNAMNOST**

### **(STATISTIC CALCULATORS)**

<https://www.socscistatistics.com/>

<https://www.statskingdom.com/index.html>

[https://www.psychometrica.de/effect\\_size.html](https://www.psychometrica.de/effect_size.html)

<https://effect-size-calculator.herokuapp.com/>

# TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ

*V souladu s názory řady autorů (Brownlee, 2020; Cohen, 1988; Cumming, 2013; Ellis, 2010; Hoppkins, 2016):*

- 1. nejprve posuzujeme statistickou významnost**, tedy (jde-li o náhodný výběr, resp. randomizovaný výzkum) testujeme **nulovou hypotézu**, jakožto kritérium pro posouzení rizika zobecnění (např. pomocí t-testu),
- 2. V případě, že nulová hypotéza se zamítá**, zhodnotíme **věcnou významnost** (např. pomocí ES koeficient  $d$ ).

Ukázka: <http://www.socscistatistics.com/effectsize/Default3.aspx>

## A) STATISTICKÁ VÝZNAMNOST

- ✓ **Pouze statistická významnost výsledků**= dlouhodobá kritika zneužívání tohoto postupu.
- ✓ Smysluplné použití je možné jen pro **reprezentativní soubory** získané metodami **náhodného výběru** a pro **randomizované řízené experimenty**.

**Hlavní nevýhoda** testování  $H_0$  pouze pomocí statistické významnosti je její vazba na rozsah souboru (n):

1) u **velkých výběrů** jsou i nepatrné rozdíly, resp. asociace (korelace) statisticky významné,

2) u **malých výběrů** jsou i velké rozdíly, resp. velká asociace (korelace) statisticky nevýznamné (*tabulka*).

# STATISTICKÁ VÝZNAMNOST

- ✓ Výsledky **TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ** jsou posuzovány na zvolené **hladině významnosti** ( $p/\alpha = 0,05; 0,01$ )
- ✓ Úroveň hladiny významnosti  **$\alpha = 0,05$**  znamená, že nulová **hypotéza se zamítá**, když  **$\alpha < 0,05$  ( $0,01$ )**.
- ✓ V tomto případě se přikláníme k platnosti ***alternativní hypotézy***.
- ✓ Nejčastěji testujeme hypotézy o **významnosti diferencí středních hodnot** dvou výběrových souborů (rozsahu  $n_1, n_2$ ), resp. **významnost závislosti dvou či více proměnných**.

**Tabulka VIII** – Kritické hodnoty pro Pearsonův korelační koeficient (oboustranný test)

|     | $\alpha$ |        |     | $\alpha$ |        |     | $\alpha$ |        |
|-----|----------|--------|-----|----------|--------|-----|----------|--------|
| $n$ | 0,05     | 0,01   | $n$ | 0,05     | 0,01   | $n$ | 0,05     | 0,01   |
| 3   | 0,9969   | 0,9999 | 14  | 0,5324   | 0,6614 | 25  | 0,3961   | 0,5052 |
| 4   | 0,9500   | 0,9900 | 15  | 0,5140   | 0,6411 | 30  | 0,3610   | 0,4629 |
| 5   | 0,8783   | 0,9587 | 16  | 0,4973   | 0,6226 | 35  | 0,3338   | 0,4296 |
| 6   | 0,8114   | 0,9172 | 17  | 0,4822   | 0,6055 | 40  | 0,3120   | 0,4026 |
| 7   | 0,7545   | 0,8745 | 18  | 0,4683   | 0,5897 | 45  | 0,2940   | 0,3801 |
| 8   | 0,7067   | 0,8343 | 19  | 0,4555   | 0,5751 | 50  | 0,2787   | 0,3610 |
| 9   | 0,6664   | 0,7977 | 20  | 0,4438   | 0,5614 | 60  | 0,2542   | 0,3301 |
| 10  | 0,6319   | 0,7646 | 21  | 0,4329   | 0,5487 | 70  | 0,2352   | 0,3060 |
| 11  | 0,6021   | 0,7348 | 22  | 0,4227   | 0,5368 | 80  | 0,2199   | 0,2864 |
| 12  | 0,5760   | 0,7079 | 23  | 0,4132   | 0,5256 | 90  | 0,2072   | 0,2702 |
| 13  | 0,5529   | 0,6835 | 24  | 0,4044   | 0,5151 | 100 | 0,1966   | 0,2565 |

Zdroj: Anděl, Jiří. *Statistické metody*. 2. vyd. Praha: MATFYZPRESS, 2003



## B) VĚCNÁ VÝZNAMNOST

Posuzovat **významnost rozdílů** či **vztahů** pomocí **věcné významnosti** („size of effect“, „effect size“, „velikost efektu“ pomocí ES indexů; Cohen, 1988) se doporučuje u **nenáhodných výběrů**, resp. při **zamítnutí nulové hypotézy** (statistická významnost).

*Výhodou použití věcné významnosti je malá závislost na rozsahu souboru ( $n$ ).*

<http://www.socscistatistics.com/effectsize/Default3.aspx>

<https://www.statskingdom.com/index.html>

[https://stats.libretexts.org/Learning\\_Objects/02%3A\\_Interactive\\_Statistics](https://stats.libretexts.org/Learning_Objects/02%3A_Interactive_Statistics)

- ✓ **Použití věcné významnosti je požadováno jak** methodology, tak i vědeckými časopisy.
- ✓ Značný počet výzkumů obsahuje **nesprávnou interpretací výsledků**, z důvodu **používání pouze statistické významnosti**, neboť ji nabízí statistické software.

**Řada autorů** (Brownlee, 2020; Cohen, 1988; Cumming, 2013; Ellis, 2010; Hoppkins, 2016) proto doporučuje zjišťování **velikosti efektu** (effect size, ES), což má význam zejména v případě, že **nulová hypotéza se zamítá**.

# POSUZOVÁNÍ VĚCNÉ VÝZNAMNOSTI

**(1) Cohen (1988, 1992). Indexy velikosti efektu**  
(hodnoty pro malé, střední a velké efekty).

| Test     | Effect size |        |       |
|----------|-------------|--------|-------|
|          | small       | medium | large |
| <i>d</i> | .20         | .50    | .80   |
| <i>r</i> | .10         | .30    | .50   |
| $\chi^2$ | .10         | .30    | .50   |

Vysvětlivky:

*d* = pro difference středních hodnot

*r* = pro korelace

$\chi^2$  = pro chí kvadrát (rozložení četností)

# POSUZOVÁNÍ VĚCNÉ VÝZNAMNOSTI

**(2) Soukup (2013). Effect size po úpravě do intervalů**

| <b>Test</b> | <b>small</b> | <b>medium</b> | <b>large</b>  |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>d</b>    | 0,2-0,49     | 0,5-0,79      | větší než 0,8 |
| <b>r</b>    | 0,1-0,29     | 0,3-0,49      | větší než 0,5 |
| <b>Chi2</b> | 0,1-0,29     | 0,3-0,49      | větší než 0,5 |

## Př. 1: Formulace: nulová hypotéza ( $H_0$ )

$H_{01}$ : *intersexuální rozdíly* somatických a motorických předpokladů mezi tenisty ( $n=221$ ) a tenistkami ( $n=193$ ) ve věkové kategorii **11 -12 let** jsou nevýznamné.

| Soubor/SC<br>H   | Tenisté |      | Tenistky |      | Cohen's d,<br>hodnocení<br>efektu |
|------------------|---------|------|----------|------|-----------------------------------|
|                  | M       | SD   | M        | SD   |                                   |
| Výška (cm)       | 155,10  | 7,62 | 154,60   | 6,94 | 0,07 (žádný)                      |
| Hmotnost<br>(kg) | 43,50   | 6,68 | 43,49    | 7,17 | 0,00 (žádný)                      |
| MS (kp)          | 25,14   | 4,60 | 23,08    | 4,61 | 0,45 (malý)                       |
| RS               | 0,58    | 0,09 | 0,53     | 0,09 | 0,56<br>(střední)                 |

## Př. 2: Formulace: alternativní hypotéza ( $H_A$ , $H_1$ )

$H_{A1}$ : *intersexuální rozdíly somatických a motorických předpokladů mezi tenisty ( $n=157$ ) a tenistkami ( $n=163$ ) ve věkové kategorii **13 -14 let** jsou významné.*

| Category    | M (male) | SD   | M (female) | SD   | Cohen's d    |
|-------------|----------|------|------------|------|--------------|
| Height (cm) | 169.79   | 9.27 | 164.93     | 5.80 | 0.63 (med)   |
| Weight (kg) | 57.05    | 9.26 | 53.57      | 6.31 | 0.44 (small) |
| MHSL (kp)   | 34.64    | 7.53 | 29.09      | 3.84 | 0.94 (large) |
| RHSL        | 0.61     | 0.10 | 0.55       | 0.06 | 0.73 (med)   |

# TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ

## POMOCÍ STATISTICKÉ VÝZNAMNOSTI

**Nejčastěji posuzujeme:**

- 1. Významnost diferencí středních hodnot ( $M_1, M_2$ )  
dvou výběrových souborů ( $n_1, n_2$ ),**
- 2. Míru závislosti (vztahu, korelace) dvou či více jevů  
(proměnných).**

# POSUZOVÁNÍ VĚCNÉ VÝZNAMNOSTI

**(1) Cohen (1988, 1992). Indexy velikosti efektu**  
(hodnoty pro malé, střední a velké efekty).

| Test     | Effect size |        |       |
|----------|-------------|--------|-------|
|          | small       | medium | large |
| <i>d</i> | .20         | .50    | .80   |
| <i>r</i> | .10         | .30    | .50   |
| $\chi^2$ | .10         | .30    | .50   |

Vysvětlivky:

*d* = pro difference středních hodnot

*r* = pro korelace

$\chi^2$  = pro chí kvadrát (rozložení četností)



# 1. NOMINÁLNÍ DATA - STATISTICKÉ TESTOVACÍ METODY

## 1. Lyžaři



## 2. Lyžaři



## Znak - kouření

| PŘEDPOKLAD  | PROBLÉM                             | TESTOVACÍ METODA  |
|---|-------------------------------------|---|
| Dva <b>nezávislé soubory</b> (znaky nabývají právě dvou hodnot) | Zkouška významnosti rozdílů souborů | $X^2$ -čtyřpolní test (Fischerův test, čtyřpolní tabulka) |
| Dva <b>nezávislé soubory</b> (znaky nabývají více hodnot)       | Zkouška významnosti rozdílů souborů | $X^2$ -vícepolní test (kontingenční tabulka)              |
| Dva <b>závislé soubory</b> (znaky nabývají právě dvou hodnot)   | Zkouška významnosti změn            | $X^2$ -Mc Nemarův test                                    |
| Dva <b>závislé soubory</b>                                      | Hodnocení závislosti                | Koef. kontingence C                                       |

# 2. ORDINÁLNÍ DATA - STATISTICKÉ TESTOVACÍ METODY

## 1. Gymnasté A



## 2. Gymnasté B



## Znak - body

| PŘEDPOKLAD               | PROBLÉM                            | TESTOVACÍ METODA   |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| Dva nezávislé soubory    | Test rovnosti centrálních tendencí | Medianový test (jednoduchý), U-test Mann-Whitneyho, Kolmogorov-Smirnovův test, Marshallův test |
| Dva závislé soubory      | Test rovnosti centrálních tendencí | Znaménkový test, Wilcoxonův test   |
| Více nezávislých souborů | Test rovnosti centrálních tendencí | Medianový test (rozšířený), H-test Kruskal-Wallisův (analýza rozptylu)                         |
| Dva závislé soubory      | Hodnocení míry závislosti          | Spearmanův resp. Kendallův koeficient korelace   |
| Více závislých souborů   | Hodnocení míry závislosti          | Friedmanova analýza rozptylu   |

# 3. METRICKÁ DATA - STATISTICKÉ TESTOVACÍ METODY

## Tenisté



## Tenistky



**Znak:  
TV**

| PŘEDPOKLAD                   | PROBLÉM                                | TESTOVACÍ METODA |
|------------------------------|--|------------------|
| Dva <b>nezávislé soubory</b> | Zkouška rovnosti rozptylů (homogenita) | F-test           |
| Dva <b>nezávislé soubory</b> | Zkouška rovnosti středních hodnot      | t-test           |
| Dva <b>nezávislé soubory</b> | Zkouška nezávislosti korelací          | Korelační test   |
| Dva <b>závislé soubory</b>   | Zkouška rovnosti rozptylů (homogenita) | F-test           |

### 3. METRICKÁ DATA - STATISTICKÉ TESTOVACÍ METODY


**Tenisté**

|  | <b>PŘEDPOKLAD</b>        | <b>PROBLÉM</b>                           | <b>TESTOVACÍ METODA</b>                                 |
|--|--------------------------|--|---|
|  | Dva závislé soubory      | Zkouška rovnosti středních hodnot        | Diferenční t-test (párový)                              |
|  | Dva závislé soubory      | Hodnocení závislosti                     | Koef. součinné korelace a regrese                       |
|  | Více nezávislých souborů | Zkouška rovnosti průměrů                 | Analýza rozptylu, Duncanův test pořadí, Bartlettův test |
|  | Více nezávislých souborů | Zkouška rovnosti korelačních koeficientů | Test homogenity   |

**Tenistky**

**Znak:  
TV**

# ROZHODOVACÍ DIAGRAM PRO UŽITÍ t-TESTU



# STATISTICKÉ TESTOVACÍ METODY

## Párový t - test

- dva závislé soubory
- zkouška rovnosti středních hodnot

**PŘÍKLAD** – Zjistěte, zda se na automobilu určité značky sjíždějí obě přední pneumatiky stejně rychle

| číslo automobilu | 1   | 2    | 3   | 4    | 5   | 6   |
|------------------|-----|------|-----|------|-----|-----|
| pravá pneumatika | 1,8 | 1    | 2,2 | 0,9  | 1,5 | 1,6 |
| leva pneumatika  | 1,5 | 1,1  | 2   | 1,1  | 1,4 | 1,4 |
| rozdíl           | 0,3 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,2 |

$$H_0: \mu = \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_A: \mu = \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

$$T = \frac{|\bar{X} - \mu|}{s} \sqrt{n}$$

$$T < t$$

$$n-1; 1-\frac{\alpha}{2}$$

$\Rightarrow$

hypotézu nelze zamítnou

# STATISTICKÉ TESTOVACÍ METODY

## Párový t - test

| číslo automobilu | 1   | 2    | 3   | 4    | 5   | 6   |
|------------------|-----|------|-----|------|-----|-----|
| pravá pneumatika | 1,8 | 1    | 2,2 | 0,9  | 1,5 | 1,6 |
| leva pneumatika  | 1,5 | 1,1  | 2   | 1,1  | 1,4 | 1,4 |
| rozdíl           | 0,3 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,2 |

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{n=1}^n X_i = \frac{1}{6} (0,3 - 0,1 + 0,2 - 0,2 + 0,1 + 0,2) = \frac{0,5}{6} = \underline{\underline{0,0833}}$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{0,2167^2 + (-0,1833)^2 + 0,1167^2 + (-0,2833)^2 + 0,0167^2 + 0,1167^2}{5} =$$
$$= \frac{0,18833}{5} = 0,0377$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{0,0377} = \underline{\underline{0,1941}}$$

# STATISTICKÉ TESTOVACÍ METODY

## Párový t - test

$$t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} = t_{6-1; 1-\frac{0,05}{2}} = t_{5; 0,975} = 2,571 \quad = > \quad \text{z tabulek}$$

$$T = \frac{|X - \mu|}{s} \sqrt{n} = \frac{0,0833 - 0}{0,1941} \sqrt{6} = 1,0518 < 2,571$$

**Protože  $1,0518 < 2,571$ , nelze na základě získaných dat zamítnout hypotézu, že se obě přední pneumatiky sjíždějí stejně rychle.**



# STATISTICKÉ TESTOVACÍ METODY

## Párový t - test

### Pomocí Excelu – Analýza dat – Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu

|   | A                | B   | C    | D   | E    | F   | G   | H |
|---|------------------|-----|------|-----|------|-----|-----|---|
| 1 | číslo automobilu | 1   | 2    | 3   | 4    | 5   | 6   |   |
| 2 | pravá pneumatika | 1,8 | 1    | 2,2 | 0,9  | 1,5 | 1,6 |   |
| 3 | leva pneumatika  | 1,5 | 1,1  | 2   | 1,1  | 1,4 | 1,4 |   |
| 4 | rozdíl           | 0,3 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,2 |   |
| 5 |                  |     |      |     |      |     |     |   |

**Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu**

Vstup

1. soubor:

2. soubor:

Hypotetický rozdíl středních hodnot:

Popisky

Alfa:

Možnosti výstupu

Výstupní oblast:

Nový list:

Nový sešit

Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu

|                         | <i>pravá pneumatika</i> | <i>leva pneumatika</i> |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Stř. hodnota            | 1,5                     | 1,41666667             |
| Rozptyl                 | 0,24                    | 0,10966667             |
| Pozorování              | 6                       | 6                      |
| Pears. korelace         | 0,961571662             |                        |
| Hyp. rozdíl stř. hodnot | 0                       |                        |
| Rozdíl                  | 5                       |                        |
| t Stat                  | 1,051757905             |                        |
| P(T<=t) (1)             | 0,17053101              |                        |
| t krit (1)              | 2,015048372             |                        |
| P(T<=t) (2)             | 0,34106202              |                        |
| t krit (2)              | 2,570581835             |                        |

# STATISTICKÉ TESTOVACÍ METODY

## Dvouvýběrový t - test

- dva nezávislé soubory
- test rovnosti středních hodnot

**PŘÍKLAD** – U studentů rozdělených do dvou skupin byl zaznamenán počet leh-sedů za 1 minutu. Jsou obě skupiny stejně výkonné?

|            |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|
| 1. skupina | 62 | 54 | 55 | 60 | 53 | 58 |
| 2. skupina | 52 | 56 | 49 | 50 | 51 |    |

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{(n-1)s_X^2 + (m-1)s_Y^2}} \sqrt{\frac{nm(n+m-2)}{n+m}}$$

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_A: \mu_1 \neq \mu_2$$

$$|T| < t_{n+m-2; 1-\frac{\alpha}{2}} \Rightarrow \text{hypotézu nelze zamítnou}$$

# STATISTICKÉ TESTOVACÍ METODY

## Dvouvýběrový t - test

|            |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|
| 1. skupina | 62 | 54 | 55 | 60 | 53 | 58 |
| 2. skupina | 52 | 56 | 49 | 50 | 51 |    |

$$n_1=6 \quad n_2=5 \quad AP_X=57 \quad AP_Y=51,6 \quad s_X^2=12,8 \quad s_Y^2=7,3$$

$$\begin{aligned} T &= \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{(n-1)s_X^2 + (m-1)s_Y^2}} \sqrt{\frac{nm(n+m-2)}{n+m}} = \\ &= \frac{57 - 51,6}{\sqrt{(6-1)12,8 + (5-1)7,3}} \sqrt{\frac{6 \cdot 5 \cdot (6+5-2)}{6+5}} = \\ &= \frac{5,4}{\sqrt{62,5 + 29,2}} \sqrt{24,55} = 2,79 \end{aligned}$$

# STATISTICKÉ TESTOVACÍ METODY

## Dvouvýběrový t -test

$$t_{m+m-2; 1-\frac{\alpha}{2}} = t_{6+5-2; 1-\frac{0,05}{2}} = t_{9; 0,975} = 2,262 = > \text{ z tabulek}$$

$$|T| = 2,79 \geq 2,262$$

**Protože  $2,79 \geq 2,262$  zamítáme hypotézu, že se obě skupiny studentů jsou stejně výkonné.**

# STATISTICKÉ TESTOVACÍ METODY

## Dvouvýběrový t - test

### Pomocí Excelu – Analýza dat – Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů

|   | A          | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H |
|---|------------|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | 1. skupina | 62 | 54 | 55 | 60 | 53 | 58 |   |
| 2 | 2. skupina | 52 | 56 | 49 | 50 | 51 |    |   |

**Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů**

Vstup

1. soubor:

2. soubor:

Hypotetický rozdíl středních hodnot:

Popisky

Alfa:

Možnosti výstupu

Výstupní oblast:

Nový list:

Nový sešit

Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů

|                         | 1. skupina  | 2. skupina |
|-------------------------|-------------|------------|
| Stř. hodnota            | 57          | 51,6       |
| Rozptyl                 | 12,8        | 7,3        |
| Pozorování              | 6           | 5          |
| Společný rozptyl        | 10,35555556 |            |
| Hyp. rozdíl stř. hodnot | 0           |            |
| Rozdíl                  | 9           |            |
| t Stat                  | 2,77122216  |            |
| P(T<=t) (1)             | 0,010855041 |            |
| t krit (1)              | 1,833112923 |            |
| P(T<=t) (2)             | 0,021710083 |            |
| t krit (2)              | 2,262157158 |            |

# STATISTICKÉ TESTOVACÍ METODY

## F - test

- dva nezávislé soubory
- zkouška rovnosti rozptylů

**PŘÍKLAD** – Na základě dat uvedených v předchozím příkladě rozhodněte, zda oba základní soubory mají stejné rozptyly.

|            |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|
| 1. skupina | 62 | 54 | 55 | 60 | 53 | 58 |
| 2. skupina | 52 | 56 | 49 | 50 | 51 |    |

$$Z = \frac{S_X^2}{S_Y^2} \quad \text{volím tak, aby } Z > 1$$

$$H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$$

$$H_A: \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$$

$$Z < F_{n-1, m-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \quad \Rightarrow \quad \text{hypotézu nelze zamítnou}$$

# STATISTICKÉ TESTOVACÍ METODY

## F - test

|            |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|
| 1. skupina | 62 | 54 | 55 | 60 | 53 | 58 |
| 2. skupina | 52 | 56 | 49 | 50 | 51 |    |

$$n=6 \quad m=5 \quad s_x^2=12,8 \quad s_y^2=7,3$$

$$Z = \frac{s_X^2}{s_Y^2} = \frac{12,8}{7,3} = 1,753$$

$$F_{n-1, m-1; 1-\frac{\alpha}{2}} = F_{6-1, 5-1; 1-\frac{0,05}{2}} = F_{5, 4; 0,975} = 9,36 = > \text{ z tabulek}$$

$$Z = 1,753 < 9,36$$

Protože  $1,753 < 9,36$  nelze zamítnout hypotézu o shodnosti rozptylů.

# STATISTICKÉ TESTOVACÍ METODY

## F - test

### Pomocí Excelu – Analýza dat – Dvouvýběrový F-test pro rozptyl

|   | A          | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H |
|---|------------|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | 1. skupina | 62 | 54 | 55 | 60 | 53 | 58 |   |
| 2 | 2. skupina | 52 | 56 | 49 | 50 | 51 |    |   |

**Dvouvýběrový F-test pro rozptyl**

Vstup

1. soubor: \$A\$1:\$G\$1

2. soubor: \$A\$2:\$F\$2

Popisky

Alfa: 0.05

Možnosti výstupu

Výstupní oblast:

Nový list:

Nový sešit

OK

Storno

Nápověda

Dvouvýběrový F-test pro rozptyl

---

|              | 1. skupina  | 2. skupina |
|--------------|-------------|------------|
| Stř. hodnota | 57          | 51.6       |
| Rozptyl      | 12.8        | 7.3        |
| Pozorování   | 6           | 5          |
| Rozdíl       | 5           | 4          |
| F            | 1.753424658 |            |
| P(F<=f) (1)  | 0.303172533 |            |
| F krit (1)   | 6.256056502 |            |

---




# **PŘÍKLADY VÝPOČTŮ V SOUBORU:**

## **Data-výpočty**

### **Statistická analýza dat**

**A\_Statistická analýza  
dat\_postup+priklady\_JS23.docx**



Leonardo da Vinci (1490)

**Děkuji za pozornost**

**Test 25.4.2023**

**PODPIS**

**Výzkumný problém:**

***Tělesná výška a sportovní výkonnost  
v tenisu***

***1. Formulujte hypotézy:***

**$H_0$  (nulová) a  $H_1$  (alternativní)**

***2. Identifikujte výzkumné proměnné (znak, stupnice):***

**-Gender (pohlaví)**

**-Tělesná výška a hmotnost**

**-Pořadí na žebříčku ATP/WTA**

## **Muži** (ATP Rankings)

<https://www.atptour.com/en/rankings/singles/live>

***H<sub>0</sub>: TV významně neovlivňuje SV v M tenisu***

***H<sub>1</sub>: TV významně ovlivňuje SV v M tenisu***

## **Ženy** (WTA Rankings)

<https://www.wtatennis.com/rankings/singles>

***H<sub>0</sub>: významně neovlivňuje SV v Ž tenisu***

***H<sub>1</sub>: významně ovlivňuje SV v Ž tenisu***