

Dřeviny

HEN


2009

přehled dřevin ke zkoušce

Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D.



Abies alba

- Jedle bělokorá
- Strom do 50 m
- Vzpřímené rozpadavé šišky



Picea abies

- Smrk ztepilý
- Strom do 55 m
- Převislé šišky



Pinus sylvestris

- Borovice lesní
- Strom do 40 m
- Jehlice po 2



Larix decidua

- Modřín opadavý
- Strom do 40m



Juniperus communis

- Jalovec obecný
- Keř 2-5 m
- Plody – kořeni




Taxus baccata

- Tis červený
- Keř až strom do 20m
- Vzácný a chráněný



Acer campestre

- Javor babyka
- Strom 3-15 m
- Často korkové lišty



Acer platanoides

- Javor mléč
- Strom 10-30 m



Acer pseudoplatanus

- Javor klen
- Strom do 30 m



Alnus glutinosa



- Olše lepkavá
- Strom do 20 m
- Nížiny
- podmáčené lesy



Alnus incana




- Olše šedá
- Strom do 20 m
- Horské luhy



Berberis vulgaris

- Dřišťál obecný
- Keř do 3 m
- Plody jedlé až po mrazech




Betula pendula

- Bříza bělokorá
- Strom do 25 m
- Krátkověká, pionýrská



Calluna vulgaris

- Vřes obecný
- Keřík do 80 cm
- Kvete VIII-X




Carpinus betulus

- Habr obecný
- Strom do 20 m
- Výborná pařezová výmladnost



Cornus mas

- Dřín jarní
- Chráněný keř 2-6 m
- Kvete III-IV před olistěním
- Jedlé plody (více vitamínu C než citrusy)




Cornus sanguinea

- Svída krvavá
- Keř 2-5 m
- Plody nejedlé



Corylus avellana



- Líska obecná
- Keř 2-6 m
- Plody –lískové oříšky

Crataegus laevigata

- Hloh obecný
- Keř do 6 m
- Dvousemenné plody



Euonymus europaeus



- Brslen evropský
- Keř 2-5 m
- Plody „biskupské čepičky“
- Bohaté půdy (spraše nebo sprašové hlíny)

Fagus sylvatica

- Buk lesní
- Strom do 45 m
- Hladká šedá kůra
- Plod – jedlá bukvice



Frangula alnus



- Krušina olšová
- Keř 1-4 m
- Jedovatá včetně plodů



Fraxinus excelsior




- Jasan ztepilý
- Strom 20-40 m
- Plod křídlatá nažka



Ligustrum vulgare

- Ptačí zob obecný
- Keř 1-5 m
- Nepoživatelné bobule



Lonicera xylosteum

- Zimolez obecný
- Keř 1-2 m
- Jedovaté plody po dvou



Populus alba

- Topol bílý (linda)
- Strom 15-35 m
- Lužní lesy (měkký luh)



Populus nigra

- Topol černý
- Vzácný strom 15-30 m
- Není napadán jmelím
- Vytlačován kříženci s americkými topoly (*Populus canadensis*)



Populus tremula

- Topol osika – Osika
- Strom 5-20 m
- Krátkověký pionýrský



Prunus padus

- Střemcha obecná
- Keř nebo strom do 15 m
- Lužní lesy



Prunus spinosa

- Trnka obecná
- Trnitý keř 2-4 m
- Plody trpké jedlé



Quercus petraea

- Dub zimní
- Strom 20-40 m
- Plody žaludy (jedlé)
- Léčivá svíravá kůra



Quercus robur

- Dub letní
- Strom 15-45 m
- Léčivá kůra
- Krmné (jedlé) žaludy



Rhamnus cathartica



- Řešetlák počistivý
- Keř 1- 3 m
- Jedovatá / léčivá rostlina
– silné projímadlo



Robinia pseudoacacia



- Trnovník akát
- Nepůvodní strom z východu USA 15- 25 m
- Léčivé a medonosné květy




Rosa canina

- Růže šípková
- Trnitý keř 1-3 m
- Jedlé léčivé plody - šípky



Rubus fruticosus agg.



- Ostružiník křovitý souhrnný (agregovaný druh tvořený mnoha velmi podobnými mikrospeciemi)
- Trnitý plazivý keř do 1,5m
- Paseky a lesní světliny



Rubus idaeus

- Maliník obecný (Ostružiník maliník)
- Plazivý keř 0,6-1,2 m
- Jemně trnité výhony a listy
- Jedlé plody





Salix alba

- Vrba bílá
- Strom do 25 m
- Lužní lesy v nížinách
- Listy na rubu a letorosty hustě přitiskle chlupaté




Salix caprea

- Vrba jíva
- Keř až stromek 3-9 m



Salix fragilis

- Vrba křehká
- Strom do 20 m
- Lužní lesy vyšších poloh (pahorkatin a hor)
- Listy a letorosty lysé



Salix purpurea

- Vrba nachová
- Keř 2-6 m
- Zdánlivě vstříčné listy
- Načervenalé větvičky
- žluté lýko
- Křoviny lužních lesů a šterky



Salix viminalis


- Vrba košíkářská
- Keř 4-10 m
- Listy celokrajné, podvinuté, bílý rub



Sambucus racemosa



- Bez hroznatý (bez červený)
- Keř 1-4 m
- Nejedlé olejnaté plody



Sambucus nigra

- Bez černý
- Keř 3-7 m
- Léčivé květy
- Tmavofialové léčivé plody



Syringa vulgaris

- Šeřík obecný
- Keř 2-8 m
- Původní v JV Evropě a Malé Asii



Sorbus aria





- Jeřáb muk
- Strom 2-10 m
- Listy na rubu šedě nebo bíle plstnaté




Sorbus aucuparia

- Jeřáb ptačí
- Strom 5-15 m




Sorbus torminalis

- Jeřáb břek
- Strom 3-15 m





Tilia cordata

- Lípa srdčitá
- Strom do 25 m




Ulmus glabra

- Jilm drsný
(jilm horský)
- Strom do 30 m
- Asymetrické
báze listů



Vaccinium myrtillus



- Borůvka černá (brusnice borůvka)
- Keřík do 50 cm



Vaccinium vitis-idaea



- Brusinka obecná (brusnice brusinka)
- Keřík do 30 cm



Viburnum opulus

- Kalina obecná
- Keř 1-4 m
- Plody za syrova slabě jedovaté

