


**Biocenóza**

**Společenstvo**

# **Biocenóza - společenstvo**

- všechno živé na určité ploše
- zákonité seskupení → ekotop
- vzájemná provázanost organismů

# Autoregulační mechanismy



# Typy biocenóz

- přírodní
- přirozené
- umělé
  - produkční
  - okrasné
  - ruderální
  - synantropní
- reálné
- potenciální
- rekonstrukční
- monocenózy
- polycenózy



**Přírodní biocenóza**



**Přírodní biocenóza**



Přirozená biocenóza



**Polopřirozená biocenóza**



**Polopřirozená biocenóza**



**Umělé biocenózy**



Umělá biocenóza




**Umělá biocenóza**



**Umělá biocenóza**



# Přechodné biocenózy - ekotony






# Struktura biocenóz

## Základní členění

- mikrobiocenóza
- fytocenóza – rostlinné společenstvo
- zoocenóza – živočišné společenstvo

# Další vnitřní členění biocenózy

- Taxonomické - Taxocenózy
- Funkční
  - Synuzie
  - Guildy (cechy)
- Prostorové
  - Stratocenózy
  - Choriocenózy
  - Merocenózy



A photograph of a dense forest under a clear blue sky. The foreground is filled with dark green, leafy branches of various trees. In the background, several tall, thin tree trunks rise vertically, their bark a light grey or brown color. The canopy above is a mix of bright and dark green leaves, creating a textured pattern against the bright sky.

**Stratocenózy**



**Choriocenózy**

# Struktura biocenózy – životní formy

- fytoplankton
- terofyty
- kryptofyty
  - geofyty
  - hydrofyty
- hemikryptofyty
- chamaefyty
- fanerofyty
- epifyty

# Vlastnosti biocenóz

- Abundance
- Biomasa - fytomasa (do 600 t.ha<sup>-1</sup>)
  - zoomasa o 2-3 řády nižší
- Produkce - až desítky t.ha<sup>-1</sup>

# Vlastnosti druhů biocenózy

\* Frekvence

$$F = n_i/n \cdot 100 (\%)$$

\* Konstance

$$K = n_i/n \cdot 100 (\%)$$

Druh

- eukonstantní (velmi stálý) 75-100 %
- konstantní (stálý) 50-75 %
- akcesorický (přídatný) 25-50 %
- akcidentální (nahodilý) 0-25 %

# Vlastnosti druhů biocenózy

## Vazba (fidelita, věrnost)

### Druhy

- eucenní - cenobiontní
  - cenofilní
- tychocenní
- acenní
- xenocenní



# Vlastnosti druhů biocenózy


## Fidelita (věrnost) - příklad

Druhy

- eucenní
- cenobiontní
- cenofilní






- tychocenní



- acenní



- xenocenní



# Vlastnosti druhů biocenózy

## Dominance

$$D = n_i/n \cdot 100 (\%)$$

Druhy

Noctuidae

Kameničky

• eudominantní	nad 10 %	-
• dominantní	5-10 %	6
• subdominantní	2-5 %	7
• recedentní	1-2 %	9
• subrecedentní	pod 1 %	130

# Vlastnosti biocenóz

## Diverzita (rozmanitost)

- biotopová
- druhová
- genetická

## Indexy druhové diverzity

- Shannon-Wienerův index

## Ekvitabilita (vyrovnanost)

# Vlastnosti biocenóz

## Druhová podobnost

Jaccardův index

$$J_a = C / (A + B - C) \times 100 \%$$

Sørensenův index

$$S_\theta = 2C / (A + B) \times 100 \%$$

# Druhové bohatství

- v celosvětovém měřítku
- u nás
- v biocenóze

## Vlivy

- Flóra oblasti
- Charakter biotopu
- Ekologické nároky
- Čas od vzniku
- Míra narušování

# Druhové bohatství na světě

**Ca 1.3 milionu**

hmyz	900 000	cévnaté rostliny	250 000
z toho brouci	400 000	velké houby	20 000
motýli	150 000	bakterie	3000
blanokřídlí	120 000		
dvoukřídlí	85 000		
měkkýši	80 000		
pavoukovci	75 000		
obratlovci	47 000		
korýši	40 000		
hlísti	30 000		
kroužkovci	8 500		

# Kolik je jich ve skutečnosti ?

**3-6 × více**

**Ročně je popisováno kolem 10 000 nových druhů  
z toho ca - 7000 druhů hmyzu**

- 1300 pavouků
- 700 koryšů
- 350 měkkýšů
- 230 ryb
- 26 savců
- 5 ptáků

**Evropa ročně asi  
800 nových druhů**

# Druhové bohatství u nás

Přes 40 000 druhů

hmyz	27 000	cévnaté rostliny	2700
z toho brouci	6000	velké houby	3500
motýli	3370	bakterie	1500
blanokřídlí	6400		
dvoukřídlí	7080		
měkkýši	250		
pavoukovci	2400		
obratlovci	595		
korýši	360		
hlísti	1000		
kroužkovci	200		

# Druhové bohatství v biocenóze

- Biocenotické principy
  - prostředí „normální“, složité, stálé
  - prostředí extrémní, jednoduché, proměnlivé
- Vývojové stadium biocenózy (sukcese × klimax)
- Heterogenita

# Změny biocenózy v čase

## Krátkodobé

- sezónní aspekty
  - předjarní
  - jarní
  - letní
  - pozdně letní
  - podzimní
  - zimní
- populační cykly

## Dlouhodobé

- sukcese
  - primární
  - sekundární
  - endogenní
  - exogenní
- klimax

# Typy klimaxu

- klimatický klimax
- edafický klimax
- antropogenní klimax (paraklimax)



## Biocenózy

- zonální —> zonobiomy (pásma)
- azonální, extrazonální —> pedobiomy
- orobiomy (stupně)

# Klasifikace biocenóz

## Různé přístupy

- Floristické složení
- Fyziognomie společenstva (rostlinné formace)
- Abiotické podmínky stanoviště (typologický přístup)

## Curyšsko-montpellierská klasifikace