




## Urogenitální systém

FSS 2015 zimní semestr

Mgr. Jana Javora  
MUDr Dagmar Brančíková







# Vylučovací soustava:

- Exkrekční – plní v organismu především **ledviny**, dále dýchací soustava (plíce – výdej CO<sub>2</sub>) i potní žlázy – (minerály, odpadní látky i malé množství močoviny).
- Párový orgán, leží v dutině břišní, po stranách bederní páteře, tvarem připomínají fazoli, cca 12x7x3cm.
- Uprostřed ledviny je branka(hilus), kterou z ledviny vystupuje močovod a zanořují se cévy a nervy.
- Na povrchu pouzdro, tuková vrstva – ochrana, vazivo - fixace


# Anatomie




Uložení: Retroperitoneum, velikost 12x7x3cm

# Ledviny

- udržují stálý objem a osmolalitu extracelulární tekutiny  
Vylučují soli, a vodu jsou li v přebytku  
Odvádí odpadní produkty látkové přeměny  
Odvádí ve vodě rozpustné cizorodé složky
- Acidobazická rovnováha-zásadní průdržení napětí
- Regulace tlaku systémem -renin/- angiotenzin
- Řízení krvetvorby/- erythropoetin/
- Metabolismus kostí (aktivní forma vit.D3 a vstřebávání vápníku)






# Ledviny funkční oběh

Funkce: 1000-1300 ml/min,  
průtok závislý na tlaku

Oběh funkční - arter. renalis  
nutritivní – přivádí okys.krev a živiny

Inervace jen sympatická

Diuresa 1,5 l moče denně




# Nefron.-základní funkční jednotka

- 1 milion v každé ledvině (vrozený pevný počet)
- Malpigniho tělíska ( glomerulus+Bowmanovo pouzdro).-glomerulární filtrace (fyzikální proces , skimming efekt-odstředivost) ,filtrát má stejné složení jako plazma ale **ne bílkoviny** ,170litrů primární moče denně
- Proximální tubulus –aktivní sekrece,močopudné látky + rezorpce 75-80%tekutiny,
- = isotonické vstřebávání látek a vody=odtok tekutiny, která má stejný osmotický tlak jako krevní plazma

# Glomerulus = ledvinné tělisko, klubíčko

CELLULAR FEATURES OF THE RENAL CORPUSCLE






# Nefron.-základní funkční jednotka

- Henleyova klička –osmotická stratifikace ,sekrece močoviny ,protiproudý systém m,vstřebá 15% GF  
vzestupná část neprostupná pro vodu (tlustá)  
aktivně přenáší ionty (Na, K, Cl, Mg)
- Distální tubulus :hypotonická tekutina ,vstřebání iontů a vody ,aldosteron, adiuretický hormon
- Sběrný kanálek -vznik definitivní moče redukce filtrátu na 1%objemu (vstřebá 4% tekutiny)
- Juxtamedulární aparát –renin angiotenzinový systém(žízeň, produkce aldosteronu a ADH


# |Nefron

## Components of the Nephron









# Nefron



# Nefron





# Poruchy solné a vodní bilance

- Normovolemie
- Hypovolemie
- Hypervolemie
- Normální krevní tlak a osmolalita
  - Hypotenze,
  - **hypoosmolalita nebo hyperosmolalita**
  - -žízeň, chlad , cefalea
- Hypertenze
  - **hypoosmolalita nebo hyperosmolalita**
  - -žízeň, otoky,cefalea



# Osmolalita krve (extracelulární tekutiny)



- 290mosm/kg
- Osmoreceptory periferní-Adiuretický hormon -vazopresin objem tekutiny, rezorbce vody
- Atriální natriuretický polypeptid reaguje na objem tekutiny v síních, tlumí rezorbce Na
- Renin-angiotenzin , snižuje GF a produkci aldosteronu
- Aldosteron –retence Na, zvyšuje objem extracelulární tekutiny

# Průtok krve ledvinou

- TLAK KRVE
- RENIN ANGIOTENZIN
- PROSTAGLANDINY
- OXID DUSNATÝ
- ADIURETIN
- ATRIÁLNÍ NATRIURETICKY POLYPEPTID
- ADRENALIN, NORADRENALIN






## Kidney Stone



**Alternative Health News**

# Hospodaření vodní

- Denní obrat vody 2,5 litru/70kg
- Hmotnost těla 45 -75% voda,
- 3/5 intracelulárně + 2/5 extracelulárně
- (Na)natriuretický polypeptid v síních
- Deficit –žízeň –centrum v hypotalamu,
- osmolalita tělních tekutin hladina angiotenzinu
- Intoxikace vodou –nevolnost, zvracení, šok (nestačí se sekernovat ADH)



# Vývodné cesty močové

- Uretery (ledvinná pánvička –močový měchýř)30cm, hladká svalovina, vícevrstevný epitel,peristaltické vlny
- Močový měchýř 200-800ml 3 vrstevná hladká svalovina, mechanoreceptory mikční reflex nad 400ml mimo volní kontrolu, centrum mikce v prodloužené míše ,centrum v křížové míše S2-3
- Močová trubice ženy 4cm, muži 20cm (prostatická část)



# Reprodukční soustava muže

- Varlata –testes , spermatogeneze z gamet, tvoří se celý život + tvorba testosteronu v leydigových buňkách(ve varlatech)
- Testosteron: dozrávání mužských pohlavních orgánů, rozvoj sekundárních pohlavních znaků , agresivita, libido, spermogeneza ,tvorba bílkovin, svalové tkáně, kostí, tvorba červených buněk





# Varlata

- Uložení varlat mimo dut.břišní má svůj význam – teplota o 3-4st.nižší. Varlata sestupují již před narozením (kriptorchizmus), chirurg.zákrok.
- Spermatogeneze trvá cca 70dní – vytvoří se bičík, krček, hlavička – nese chromozomy (22+1pohl.) – plný počet chromozomů doplní v zygotě chrom. vajíčka (46)
- Rychlosť pohybu spermie je 1-4mm/min. - důležité optimální prostředí
- Pohlavní akt – kopulace – spojení – erekce – překrvení – vaginální dráždění – ejakulace (2,5-4ml) zásaditá reakce pH7,5
- 1ml/35-200millionů spermíí – pokles pod 20millionů=neplodnost




# Vývodné pohlavní cesty muže

- Nadvarle-epididymis dozrávání spermíí
- Chámovod –ductus deferens 40cm-tříselný kanál zadní strana močového měchýře,prostata, semenné váčky
- Semenný provazec –obal chámovodu
- Močová trubice
- Přídatné žlázy : semenné váčky –hlen pro výživu spermíí  
prostata-sekret pro výživu a hybnost spermíí
- Bulbouretrální žlázy-mazové

# Mužské pohlavní orgány:




1:močový měchýř, 2. stydká kost, 3. penis, 4. topořivé těleso, 5. žalud, 6. předkožka, 7. ústí močové trubice, 8. tračník, 9. konečník, 10. semenný váček, 11. ejakulační vývod, 12. prostata, 13. Cowperova žláza, 14. anus, 15. chámovod, 16. nadvarle, 17. varle, 18. šourek





# Reprodukční soustava ženy

- Produkuje pohl.buňky, vylučuje pohl.hormony, umožňuje pohl.spojení a zajišťuje vývoj nového jedince
- Vnitřní pohlavní orgány: vaječníky - vajíčka  
vejcovody, děloha , pochva
- Zevní pohlavní orgány stydké pysky, poštěváček
- Mléčná žláza



# Reprodukční soustava ženy



# Ovaria - vaječníky

- Estrogeny : v pubertě iniciace růstu vnitřních i zevních pohl.orgánů, stimulují růst a vývoj prsů, vývoj sekundárních pohl.znaků, ukládání tuku na predilekčních místech.
- Navozují proliferační fází menstruačního cyklu, snižují hladinu cholesterolu v krvi, tlumí růst kostí do délky, stimulují sekreci hlenu krčku dělohy, ovlivňují sexuální chování ženy
- Gestageny – hlavní zástupcem je progesteron – udržuje oplodněné a usazené vajíčko v děloze, produkce hlenu dělož.hrdla, vyvolává sekreční aktivitu ml.žláz....

# Cyklické změny reprodukčních funkcí- ovarium – vaječník


- **Párový orgán:** estrogeny X gestageny
- **Folikulárni fáze:** Gonadoliberiny (FSH + LH )  
hypotalamus –estrogeny folikulus –vznik Graafova  
zralého folikulu
- **Ovulace-corpus luteum**
- **Luteální fáze**-progestiny ze žlutého tělíska tlumí  
FSH+LH , nejde li k oplození –vznik menstruace –  
produkce FSH znova stoupne




# Cyklické změny reprodukčních funkcí - děloha - 28 dní

- **Menstruační** -1-5tý den - sliznice se uloupe na svalovinu ztráta okolo 40ml krve s vysokou fibrinolytickou aktivitou
- **Proliferační** -5-14 tý den , vliv estrogennů - ovulace
- **Sekreční** -14-28den po ovulaci , vliv progesteronu , stoupá vazkost hlenu
- **Ischemická** -28mý den , pokles hladin progestinů








*Changing hormone levels during the menstrual cycle.*

# Těhotenství



- Oplození
- kde ?- nejčastěji vejcovod,
- kdy ? spermie žijí 48 hodin
- **Hlavní hormon?** po celou dobu vliv progesteronu
  - (žluté tělísko,v druhém trimestru placenta )
- Cykly plodu
- Období embryonální 6-9 týdnů
- Období fetální 9 -40 týdnů
- porod


# Oplození



# Těhotenské hormony

- **Progesteron** – snižuje aktivitu hladké svaloviny ,brání účinku oxytocinu,podporuje rozvoj mléčné žlázy ,stimuluje energetickou přeměnu
- **HCG** - chrání žluté tělíska 2.-3.měsíc,testosteron mužského plodu
- **Estrogeny** -těhotenský stav dělohy
- **Lidský placentární somatomamotropin** –růst plodu
- **Relaxin** poddajnost děl.svaloviny rozvolnění vazů
- **Kortikoliberin** stimuluje ACTH,.surfaktant, spouští porod
- **Oxytocin** stahy děložní

# 10.Týden




# 40.Týden




# První trimestr

- **1. měsíc (4. týden)**
- Hlava a nohy embrya rostou, vyvíjejí se oči a uši. V budoucím hrudníku bije srdce a vytvářejí se plíce.
- **2. měsíc (8. týden)**
- Nenarozené dítě přestává být embryem a stává se plodem. Plod už má všechny orgány. Vytváří se čelist včetně zárodků zubů v dásních. V mozku probíhá elektrická aktivita. Plod měří asi 2 cm a jeho srdce tepe asi 140 až 150 krát za minutu.
- **3. měsíc (13. týden)**
- Tlukot srdce je slyšet stetoskopem. Vytvořily se prsty s měkkými nehty. Na prstech jsou zřejmě otisky prstů. Plod reaguje na dotyk. Vyvíjejí se pohlavní orgány, ale určení pohlaví je stále obtížné. Plod se pohybuje, svírá pěst a pohybuje hlavou. Na konci třetího měsíce (prvního trimestru) je plod asi 10 cm dlouhý a váží asi 150 g.
- **4. měsíc (17. týden)**

# 1. týden



# 2. týden





*Sonogram 1: Plod starý asi 10 týdnů (12. týden gravidity). Vzhled plodu je nepochybně „lidský“. V obličeji plodu zjemňuje rysy vyvýšený **hřbet nosu** (šipka vlevo nahore). Také původně velmi nízká bradička nabyla již přiměřenějších rozměrů. Pod ní je označeno **nuchální (šíjové) projasnění**, jehož tloušťka je znakem event. chromozomální odchylky. Tmavé oblasti v mozku jsou jeho dosud poměrně velké dutiny. Krk je již štíhlý a hladký. V oblasti zad se jasně rýsují obrysy chrupavčitých **páteřních obratlů** (šipka vpravo dole). Vpravo nahore je patrný **pupečník** (šipka). Podle velikosti plodu v tomto týdnu lze velmi přesně datovat termín porodu.*

# Druhý trimetestr

Plod slyší matčin hlas, tlukot srdce a další okolní zvuky. Plodová voda je dvakrát až třikrát denně obměněna. Matka přibývá na váze asi čtvrt kg za týden. Plod měří asi 16 cm a váží asi 250 g.

Růst dítěte během těhotenství

## 5. měsíc (21. týden)

Matce se dále zvětšují prsy, zpravidla pocituje první pohyby dítěte. Plod je asi 19 cm dlouhý a váží 350 g. Začínají mu růst vlasy a oční řasy. Na ultrazvukovém vyšetření jsou vidět pohyby a bývá možno rozpoznat pohlaví.

Žena ve 26. týdnu těhotenství

## 6. měsíc (25. týden)

Plod je aktivní a otáčí se. „Saje“ si palec (ve skutečnosti však dosud nemá vyvinutý sací reflex). Má reálnou šanci (asi 70 %) na přežití v případě předčasného porodu. Měří přes 30 cm a váží asi 900 g.

# 3. trimestr

## 7. měsíc (29. týden)

Plod rychle roste a přibývá na váze. Kope, může škytat a plakat. Chutí rozlišuje mezi sladkým a kyselým. Pracuje všech pět smyslů. Měří téměř 40 cm a váží asi 1,8 kg.


## 8. měsíc (34. týden)

Plodu rychle narostl mozek. V případě předčasného porodu má dítě velmi dobrou šanci na přežití. Měří asi 42 cm a váží 2,3 kg.

## 9. měsíc (38. týden)


Je krátce před porodem. Dítě měří od 48 do 54 cm a váží od 2,8 do 4 kg. Průměr jeho hlavy je 9,5 až 10,5 cm.

# Zdravý plod na konci 34. týdne



obvykle délka asi **45 cm**. Hmotnost se pohybuje nečastěji v rozmezí **2 200 až 2 500 g**. Horní pól dělohy dosahuje na konci tohoto období své maximální výšky, dolního okraje hrudní kosti. V posledních týdnech těhotenství pak děloha klesá poněkud dopředu a před porodem dosahuje do stejné výše jako ve 30. týdnu.

# 40 týden



Obrázek 1: Schématické zobrazení plodu v děloze krátce před porodem. Tento plod má fyziologickou, podélnou polohu, na děložní čípeku naléhá hlavičkou. Poměrně vzácně naléhá plod na pánevni vchod do pánve koncem pánevním – poloha podélná koncem pánevním. Porod probíhá zpravidla zcela normálně.

Aby plod zaujal co nejmenší prostor, má **hlavičku ohnutou dopředu – bradička se dotýká hrudníku**. Ohnutá jsou zádíčka a končetiny. **Ručičky jsou ohnuty** v kloubu loketním a jsou překřížené na přední straně hrudníku. Dolní končetiny jsou ohnuty v kloubu kyčelním i kolenním, holéně zkřížené a **stehna přitažená k přední straně bříška**. Tomuto uspořádání částí tělícka plodu říkáme pravidelné držení plodu.

**Děloha klesá** v posledním měsíci poněkud dopředu a dosahuje stejně výšky jako v 8. měsíci.


**Hlavička je stále jednou z největších částí těla**. Tvoří nyní asi jednu čtvrtinu celkové délky tělícka. **Její průchod porodním kanálem je nejobtížnější fází porodu**. Usnadňuje ho do značné míry určitá plastičnost lebky. Vazivová spojení kostí totiž umožňují, aby se hlavička porodnímu kanálu do určité míry přizpůsobila, tím, že se kostní šupiny mohou pod sebe podsunout, nebo se mohou jejich okraje překrýt.

Na konci 38. týdne od oplození (40. týden gravidity) je **mozek plodu již dostatečně zralý k tomu, aby mohl řídit důležité životní funkce** zajíšťující přežití novorozence. Dobře vyvinutý je **sací a uchopovací reflex**. Ručička dokáže již s výraznou silou uchopit nabídnutý prst. V tomto období je zralý a donošený plod připraven opustit své dosavadní životní prostředí v mateřském organizmu.

# Partus

- 1.doba 10-24hodin otvírací
- 2.doba 30minut vypuzovací
- 3.doba placenta a obaly


# Miminko v prvé době porodní - otevírací




*Děložní stahy způsobí, že se děložní hrdlo postupně zkracuje a přetahuje se přes dolní pól plových obalů. Postupně se otevírá branka děložní.*


# V druhé době porodní (vypuzovací)

cestuje plod děložním hrdlem a pochvou. V okamžiku, kdy opustí mateřské tělo, se plod stává novorozeným miminkem. Druhá doba porodní trvá průměrně u prvorodiček 50 minut, u vícerodiček a






dystokie ramének plodu



tah za hlavičku směrem dolů,  
avšak za současného tlaku  
(plochou ruky asistenta) nad sponou




prsty vějířovitě obejmou obličej a záhlaví,  
asistent současně tlaci dlani nad symfýzou



tah za hlavičku  
ve směru pánevní osy

# 3. Doba porodní vypuzení placenty



# Na konci těhotenství, v termínu porodu, má donošené a zralé miminko tyto znaky:

1. Celková délka je asi **50 cm**. Hmotnost se pohybuje nejčastěji mezi **3 000 až 3 500 g**.
2. **Kůže** je růžová a hladká, protože lanugo během posledního měsíce opadalo. Jemné vlásky lanuga mohou být ještě na ramenech a zádech novorozenéte. Obrysy tělíčka jsou zaoblené, v posledním měsíci se množství podkožní tukové tkáně ještě zdvojnásobilo.
3. **Obočí a řasy** jsou dobře vytvořené, vlásky na hlavičce jsou dlouhé několik cm. **Nehy** přesahují konečky prstíčků.
4. U chlapečků jsou pohlavní žlázy – **varlata - sestouplá do šourku**. Varlata se původně založila a vyvijela v břišní dutině. Děvčátka mají **malé stydké pysky překryty velkými**.
5. Svůj příchod na svět ohlašuje bezprostředně po porodu novorozeně **hlasitým křikem a čilými pohyby**.

Pokud dojde v průběhu porodu k deformaci hlavičky, pak se tato deformace zpravidla za několik týdnů srovná. Fontanely (měkká místa na lebeční klenbě) ale přetrvávají ještě dlouho do dětského věku. Umožňují další vývoj a růst mozku

## Delivery Presentations

### Normal Delivery



Head First Facing Backwards

### Abnormal Deliveries



Breech



Face



Shoulder




Whiplash injury



Transverse position




Placenta abruptio



Breech presentation




Placenta previa



Placenta in uterus directly after birth




Discharge of placenta



ADAM.

### Shoulder Dystocia with Brachial Plexus Injury

Position of Infant at Time of Presentation



### Postpartum Hemorrhage

Normal postpartum hemorrhage with a maximum volume preventing hemorrhage.



Uterine artery ligation hemorrhage. Air flows into the uterus.



Manual removal hemorrhage. Squeezing ligatures off the uterus in an attempt to stop the hemorrhage.



ADAM.

# Laktace

- Prolaktin – hormon adenohypofýzy – spouští tvorbu mleziva později mléka, pozitivní vliv na mateřské chování.
- Kojení – význam pro další vývoj dítěte, imunita, kontakt, duševní i emoční vývoj dítěte.
- Umělá výživa – ev.náhrada
- Vývoj dítěte - .....