

# INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU PÉČI O DOSPĚLÉ, DĚTI A DOROST

Obsah:

Přehled vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči. Obecné kontraindikace lázeňské péče.

## A. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé.

1. [Vysvětlivky používané zkratky, odkazy v textu.](#)
2. [Indikační skupiny:](#)
  - I. [Nemoci onkologické](#)
  - II. [Nemoci oběhového ústrojí](#)
  - III. [Nemoci trávicího ústrojí](#)
  - IV. [Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí](#)
  - V. [Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí](#)
  - VI. [Nemoci nervové](#)
  - VII. [Nemoci pohybového ústrojí](#)
  - VIII. [Nemoci ústrojí močového](#)
  - IX. [Duševní poruchy](#)
  - X. [Nemoci kožní](#)
  - XI. [Nemoci ženské](#)

## B. Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. [Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii.](#)
2. [Obecná ustanovení](#)
3. [Indikační skupiny](#)
  - XXI. [Nemoci onkologické](#)
  - XXII. [Nemoci oběhového ústrojí](#)
  - XXIII. [Nemoci trávicího ústrojí](#)
  - XXIV. [Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí](#)
  - XXV. [Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí](#)
  - XXVI. [Nemoci nervové](#)
  - XXVII. [Nemoci pohybového ústrojí](#)
  - XXVIII. [Nemoci ledvin a cest močových](#)
  - XXIX. [Duševní poruchy](#)
  - XXX. [Nemoci kožní](#)
  - XXXI. [Nemoci gynekologické](#)

## Přehled vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči

Druh nemoci podle indikačního seznamu

Nemoci onkologické	Odborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření ne starší 2 měsíců.
Nemoci ústrojí oběhového	EKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží

	navrhující lékař).
Diabetes mellitus	Glykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí.
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí	Rozepsaný výdech vitální kapacity, u onemocnění horních cest dýchacích odb. vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zvaží navrhující lékař, u indikací XXV/1,2,3,4,6,7,8, není nezbytný).
Nemoci ústrojí trávicího	Příslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních šťáv.
Nemoci jater a žlučníku	Příslušná laboratorní vyšetření popř. RTG žlučníku, sonografie apod.
Nemoci nervové	Odborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.
Nemoci pohybového ústrojí	Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.
Nemoci ledvin a močových cest	Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový, sedimentace erytrocytů). Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearance kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika.
Nemoci duševní	Odborné psychiatrické vyšetření (přehledem dosavadního průběhu léčby).
Ostatní nemoci	Příslušná odborná vyšetření.
Poznámka	U nemocných starších 70 let komplexní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém.

### Obecné kontraindikace lázeňské péče

1. Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství zejména břišního typu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružená s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky.
2. Všechny nemoci v akutním stádiu.
3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
4. Stavby po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavby po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompenzovaný diabetes mellitus.
6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.
7. Kachexie všeho druhu.
8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjištěnými známkami pokračování nemoci.
9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační supinu XXVI není epilepsie kontraindikací.
10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.
11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze /s výjimkou nevidomých/. Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.

13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI, XXVIII a indikaci XXIII/2.
14. Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.
15. Těhotenství.
16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X).
17. Hypertenze na 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

## A. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

1. Vysvětlivky, zkratky a přehled odkazů používaných v textu.

K - komplexní lázeňská péče

P - příspěvková lázeňská péče

A - zdravotní pojišťovna náklady nehradí

Lázeňská místa, v nichž lze poskytnout komplexní lázeňskou péči jsou vyznačena podtržením.

- 1/ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře zdravotní pojišťovny.
- 2/ Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.
- 3/ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 7 dnů.
- 4/ Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.
- 5/ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.
- 6/ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
- 7/ Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.
- 8/ Pouze pro psoriatickou artritidu a sklerodermii s kožními projevy.
- 9/ Mimo hemofilickou artropatii
- 10/ Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

## I. Nemoci onkologické

č.indikace dg.	Indikace	Délka léč. pobytu	typ lázeň. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
I/ 1 dle zákl. dg.	Onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy.	21 1/	P,K	Léčbu lze poskytnout nemocným v klinické remisi. Kompl. láz. péči lze poskytnout na dopor. klinického onkologa nebo jiného odborníka zpravidla 1x do 24 měsíců po ukončení kompl.protinádorové léčby. Opakování léč. pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných M. Hodgkin lze v indik. Případech poskytnout komplexní lázeňskou péči opakovaně.	Recidiva onemocnění, metastázy, nádorová kachexie.	<u>Františkovy</u> <u>L.</u> <u>Karlova</u> <u>Studánka</u> <u>Karlovy</u> <u>Vary</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské</u> <u>Lázně</u>

Lázeňská léčba je vhodná především u:	M. Hodgkin, nehodkginské lymfomy	Karlovy Vary, Luhačovice, Karlova Studánka
	Nádory varlat, žaludku, kolorektální nádory/anus praeternaturalis Karlovy Vary není kontraindikací	Karlovy Vary
	nádory horních cest dýchacích, hltanu a hrtanu	Karlova Studánka, uhačovice
	nádory vnitřních rodidel	Františkovy Lázně
	nádory mamy (láz. léčba je možná i při probíhající horm.terapii.)	Mariánské lázně, rantiškovy
Vhodnost lázeňské léčby je nutno individuálně zvážit u:	Mozkových a kožních nádorů, nádorů žlučníku a slinivky břišní sarkomů kostí a měkkých částí, nádorů štítné žlázy, prostaty. Pokud je u nemocného s tímto postižením shledána indikace k lázeňské léčbě, je léčení možné.	Karlovy Vary Mariánské Lázně (nádory prostaty)
	U nádorů plic (primární bronchogenní ca) lze doporučit láz.péči zpravidla až po uplynutí 1 roku od ukončení komplexní léčby při trvající remisi stejně i u nádorů ledviny /(Grawitzův nádor)	Luhačovice, Mariánské Lázně, Karlova Studánka
	O vhodnosti lázeňské léčby u chronické leukemie rozhoduje vždy hematolog.	Karlovy Vary, Mariánské Lázně
	Indikace pro lázeňskou léčbu u ostatních méně častých nádorů stanoví klinický onkolog individuálně.	Karlovy Vary, Luhačovice, Karlova Studánka

## II. Nemoci oběhového ústrojí (Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření)

1	2	3	4	5	6	7
II / 1 dle zákł. dg	Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizik. faktory (dyslipoproteinemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: hypertenze, diab.mellitus, přev.2.typu, obezita, hyperurikémie, genetická zátěž).	21 2/	P, K	Komplexní lázeň. péče při prvním pobytu na doporučení internisty nebo kardiologa. Při opakovaném pobytu nutno u obézních prokázat redukci hmotnosti.	Negativní přístup k léčbě, neschopnost aktivního pobytu.	Františkovy L. Jeseník Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n.Bečvou
II / 2 L 01, L 09 L 30, L 33 L 40, L 41	Stav po akutní karditidě do 12 měsíců po vzniku	28	K	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Aktivita revmatického procesu, Infekční endokarditida, funkční postižení NYHA III. IV.	Běloves Františkovy L. Libverda Poděbrady Teplice n.B. Komstantinovy L.

II / 3 dle zakl. dg.	Vrozené a získané srdeční vady	28	P	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Aktivita revmatického procesu, Infekční endokarditida, funkční postižení NYHA III,IV.	Běloves Františkovy L. Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n B.
II / 4 L 20, L 24 L 25	Symptomatická ischemická choroba srdeční.	28	P		Síňokomorový blok II. a III. stup. funkční postižení NYHA IV.	Běloves Františkovy L. Jeseník Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n B.
II / 5 L 21, L 22	Stav po infarktu myokardu nejpozději do 4 měsíců po vzniku (pacient po AIM s nekompl. průb.).	28 3/	K	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Síňokomorový blok II. a III.st., funkční postižení NYHA IV.	<u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n B.</u>
II / 6 L25	Ischemická choroba srdeční s překonaným infarktem myokardu po 4 měs. Od vzniku do 12 měsíců po vzniku.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout výjimečně na doporučení internisty nebo kardiologa nemocným, kteří ze zdravot. důvodů nemohli být léčeni dle II /5.	Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libvedra</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.B</u>
II / 7 L 10, L11, L 12, L 13	Hypertenzní choroba I.-III. st. dle SZO. Juvenilní hypertenze.	28	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout u HCH III.st.komplikované, ICHS, CMP, obliteraci cév DK II. b st. nebo vaskulární nefrosklerózu na doporučení internisty nebo kardiologa.	Maligní zvrst, stavy po CMP s výrazně omez.pohyblivostí nebo změnou psychiky, klidové bolesti DK, isch. ulcerace nebo gangréna, diabetická nefropatie s klinickými nebo labor. známkami uremie, funkční postižení NYHA IV.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> Jeseník Hodonín Karlova Stud. <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n. B.</u>
II / 8 L 70, L 73	Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stadiu I až II b.	28	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na	Závažné projevy celkové aterosklerózy,	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u>

L 79				doporučení internisty u stádia II b.	klidové bolesti, těžké defekty.	<u>Hodonín</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n B.</u> <u>Darkov</u>
II/9 L 80, L 83, L 87, L 89	Stavy po trombozách a tromboflebitidách s přetrvávajícími následky nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stadia, stavy po operaci varixů, chron. lymfatický edem.	28	P	,	Opakovaná plicní embolie, rozsáhlé bércové vředy, elefantiáza, recidivující erysipel.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Hodonín</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n B.</u> <u>Darkov</u>
II / 10 dle základní dg.	Funkční poruchy periferních cév.	28	P, K	Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 33 odst.7 zákona o všeob. zdravotním pojištění (dále jen "zákon")		<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Luhačovice</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n B.</u> <u>Darkov</u> <u>Karlova Stud.</u>
II / 11 dle zákl. dg.	Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných, po revaskularizačních operacích. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice.	28 3/	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení kardiologa, kardiochirurga nebo internisty do 6 měsíců po operaci.	Síňokomorový blok III.st., aktivita zánětlivého procesu, inf. endokarditis, embolické komplikace, funkční postižení NYHA IV.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n B.</u>
II / 12 dle zákl. dg.	Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému.	28	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga angiologa či kardiologa do 6 měsíců od operace.	Těžké trofické defekty, embolické komplikace.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n B.</u>

### III. Nemoci ústrojí trávicího

Obecné kontraindikace:

- poruchy průchodnosti GIT a biliárního traktu s projevy stázy nad překážkou
- zevní i vnitřní spontánně vzniklé píštěle v GIT i biliárním traktu
- penetrace peptického vředu a stav po manifestním krvácení vředu do 1 měsíce
- empyem žlučníku a biochemické známky cholestázy
- jaterní nedostatečnost
- mentální anorexie, pokud není v regresi
- stavy vyžadující operace na GIT i bil. traktu, pokud nelze léčbu chápat jako předoperační přípravu

poznámka: anus praeternaturalis není kontraindikací lázeňské léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

1	2	3	4	5	6	7
III / 1 K 20, K 21 K 22, K 29 K 30	Vleklé funkční žal. dyspepsie též na podkladě refluxu z duodena, kardioesofag. iritace a další benigní symptomatická onem. jícnu (hiátové hernie, refluxní ezofagitis), erozivní gastritis po eradikaci Helicobacter pylori.	21	P		Kouření, abusus alkoholu, léků	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III / 2 K 25, K 26 K 27, K 28	Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně vleklých dyspepsií přetrvávajících po léčbě či remisi.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení gastroenterologa při pravidelných a častých exacerbacích.	Kouření, abusus alkoholu. Exacerbace není kontraindikací léčby.	<u>Bílina</u> <u>Karlovy</u> <u>Vary</u> <u>Luhačovice</u>
III/ 3 Dle základní dg.	Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu.	21 3/	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení chirurga nebo gastroenterologa do 6 měsíců po operaci.	Kouření, abusus alkoholu, léků, hrubě defektní chrup s nedostatečnou žvýkací schopností	<u>Bílina</u> <u>Karlovy</u> <u>Vary</u> <u>Luhačovice</u>
III / 4 Dle základní dg.	Vleklé střevní poruchy s projevy maldigestce či malabsorbce, stavy po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách, dráždivý tračník Obstipace habituální či druhotně indukovaná.	21	P, K	U obstipace lze lázeňskou léčbu poskytnout pouze na dopor. gastroenterologa. Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona u stavů po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách.	Abusus kodeinu a příbuzných látek.	<u>Bílina</u> <u>Karlovy</u> <u>Vary</u> <u>Luhačovice</u>
III / 5 K 50, K 51	M. Crohn, proctocolitis idiopatica.	21 3/	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení gastroenterologa, jedná-li se o těžší formy onemocnění a dg. je jednoznačně potvrzena.		<u>Bílina</u> <u>Karlovy</u> <u>Vary</u>
III / 6 Dle základní	Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva - netýká se	21 3/	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na dopor. chirurga do 6 měsíců po operaci.		<u>Bílina</u> <u>Karlovy</u>

dg.	apendektomie					Vary
III / 7 K 80, K 81 K 82, K 83 B 66	Chronická onemocnění žlučníku a žluč. traktu s litiázou i bez ní, pokud operace není vhodná. Parazitózy biliárního traktu (Clonorchis, Opisthorchis ap.) jako součást konzervativní léčby, předoper.příprava. Funkční poruchy žlučového traktu.	21	P, K	Opakování léčby je vhodné k udržení remise, zvláště u osob chirurgicky vysoce rizikových (věk, krvácivé stavy, rozsáhlé břišní adheze/) Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout dle § 33 odst. 7 zákona u onemocnění diagnostikovaných jako choroba z povolání.	Neodkladná chirurgická léčba. Pokud nejde o rizik. skupiny pak i jasně indik. chir. léčba, nemá-li být láz. léčba předoperační přípr. substenóza či litiáza žlučovodů bez biochem. známek cholestázy není kontraindikací, léčba je vhodná jako předoperační příprava.	<u>Bílina</u> <u>Karlovy</u> <u>Vary</u> <u>Luhačovice</u>
III / 8 Dle základní dg.	Stavy po operacích žlučníku a žlučnickového traktu, po endoskopických a jiných instrumentálních zákrocích pro stenózu a litiázu žlučových cest. Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.	21	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, gastroenterologa nebo internisty do 6 měs. po dissoluci kamenů, extrakorporální litotrypsii a po oper. a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházely nebo následoval febrilní či icterický průběh nebo akutní pankreatitis. Opakování (PLP) je vhodné pokud přetrvává dyspepsie, jako prevence novotvorby kamenů při litogenní žluči, kde přetrvává mitigovaný zánět žlučovodů (i subfebrilie), zející papila Vateri, či biliodigestivní anastomóza (pneumocholedochus) umožňující reflux střevního obsahu.	Abusus kodeinu a příbuzných látek, obezita při přetrvávající dyspepsii (přejídání, nedodržování životosprávy). Biochemické známky cholestázy.	<u>Bílina</u> <u>Karlovy</u> <u>Vary</u> <u>Luhačovice</u>
III / 9 dle zákl. dg.	Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékové, profesionální) chronická aktivní hepatitis s přetrváváním infekčních markerů, stav po mononukleóze s jat. Poškozením., vrozené poruchy jaterních funkcí a jiné chronické jaterní choroby.	21 3/	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 12 měsíců po propuštění z ústavního léčení na doporučení infektionisty nebo hepatologa. Opakování je možné při přetrvávajících biochemických či histologických známkách jaterní poruchy.	Pokročilá jaterní nedostatečnost, stav po krvácení z jícnových varixů. Abusus alkoholu a drogová závislost. Kontraindikací není HBsAg.	<u>Karlovy</u> <u>Vary</u>



III / 10 K 85, K 86	Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy, prokázaná chron. pankreatitis, stavy po operacích a transplantaci pankreatu.	21 3/	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo chirurga do 6 měsíců po akutní příhodě spojené s hospitalizací. Opakování je vhodné u vleklé maldigesce a malabsorbce při zjevné poruše stavu výživy (hubnutí).	Cholelithiáza a jiné poruchy odtoku žluči a pankreat. sekretu do střeva (substenóza pap.Vateri) vyžadující chirurgickou léčbu. Abusus alkoholu, drogová závislost, jaterní insuficience.	<u>Karlovy</u> <u>Vary</u> <u>Bílina</u>
---------------------------	--	----------	---------	---	--	--

#### IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

1	2	3	4	5	6	7
IV / 1 E 10, E 11 E 12, E 13 E 14	Diabetes mellitus do 6 měsíců od zjištění - edukační program.	14 4/	K	Doporučuje diabetolog, u diabetu II. typu i internista nebo praktický lékař. Opakování je případně možné ještě jedenkrát po dvou letech, u nemocných s předpokladem, že opakovaný pobyt pomůže zlepšit kompenzaci. Edukační program je diferencován pro I a II typ diabetu.	Neschopnost fyzické zátěže, nespolupracující nemocný, jiné závažné choroby.	<u>Karlovy</u> <u>Vary</u> <u>Luhačovice</u> <u>Poděbrady</u> <u>Lipová</u> <u>Lázně</u>
IV / 2 E 10, E 11 E 12, E 13 E 14	Diabetes mellitus s výjimkou zařazené pod IV/1.	21	P	Léčbu lze poskytnout zpravidla po 12 měs. od zjištění dg. k úpravě životosprávy, posílení správných návyků, redukci hmotnosti. doporučuje ošetřující lékař (diabetolog,internista, prakt. lékař/.	Nespolupracující nemocný, komplikace diabetu.	Karlovy Vary Luhačovice Mariánské L. Lipová Lázně Poděbrady
IV / 3 E 10, E 11 E 12, E 13 E 14	Diabetes mellitus s komplikacemi (mikro a makroangiopatie, neuropatie). DM s těžkou obtížně ovlivnitelnou obezitou.	21	P, K	Na doporučení diabetologa. Komplexní léčbu lze poskytnout 1x u počínajících komplikací nebo při jejich záchytu.	Pokročilé stádium diabetických komplikací.	<u>Karlovy</u> <u>Vary</u> <u>Luhačovice</u> <u>Lipová</u> <u>lázně</u> <u>Poděbrady</u>

IV / 4 E 65, E 66 E 68	Obezita.	21	N	Doporučenou délku léčebného pobytu lze individuálně upravit.		Bílina Karlovy Vary Lipová Lázně Luhačovice Mariánské L. Poděbrady
IV / 5 E 78,	Hyperlipoproteinemie II.-V. typu	21	P	Případy mimo indikaci II / 1		Bílina Karlovy Vary Lipová Lázně Luhačovice Mariánské L.
IV / 6 E 05,	Tyreotoxikóza	21	P		Těžší poškození kardiiovaskulárního ústrojí, maligní struma.	Jeseník Lipová Lázně
IV / 7 E 05	Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.	21	K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení endokrinologa nebo internisty do 6 měsíců po operaci.	Těžší poškození kardiiovaskul. ústrojí.	<u>Jeseník</u> <u>Lipová</u> <u>lázně</u>
IV / 8 D 35	Stavy po operacích benigního adenomu nadledvin a hypofýzy, vyvolávajícího hyperfunkční syndrom	21	K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení endokrinologa nebo internisty do 6 měsíců po operaci.		<u>Jeseník</u>

#### V. Netuberkulózní nemoci dechového ústrojí U všech onemocnění je kontraindikací kouření.

č.indikace dg.	Indikace	Délka léč. Pobytu	typ lázeň. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
V / 1 dle základní dg.	Stavy po operacích HCD a DCD (netýká se stavů po operacích tonzil adenoidních vegetací a nosní přepážky).	21 1/ 5/	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení chirurga, odborníka ORL, nebo TRN do 6 měsíců po operaci.	Empyémy , pštěle.	<u>Jeseník</u> <u>Karlova</u> <u>Stud.</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské</u> <u>L.</u>
V / 2 J 31, J 32 J 35, J 37	Hypertof. nebo atrof. záněty HCD, ozaena v soustavném odb. léčení, chronické sinusitidy, sinobronchitidy	21 1/ 5/	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na dopor. otorinolaryngologa v případě ozaeny	Hnisavé záněty PND vyžadující chirurgickou léčbu, neléčený rhinosclerom.	<u>Jeseník</u> <u>Karlova</u> <u>Stud.</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské</u> <u>L.</u>

	soustavně léčené.					
V / 3 J 37, J 38	Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení /učitelé , duchovní apod./	21 1/ 5/	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení foniatra v případech kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova</u> <u>Stud.</u> <u>Luhačovice</u>
V / 4 J 30	Alergické rýmy prokázané alergol. vyšetřením v soustavném léčení.	21	P		Hnisavé záněty PND vyžadující chirurgickou léčbu.	Jeseník Karlova Stud. Luhačovice Mariánské L.
V / 5 J 12, J 13 J 14, J 15 J 16, J 17 J 18	Stavy po opakovaném nebo komplikovaném zánětu plic.	21 1/ 5/	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení internisty nebo odborníka pro TRN, především v návaznosti na hospitalizaci.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova</u> <u>Stud.</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské</u> <u>L.</u>
V / 6 J 40, J 41 J 42, J 47	Chronická bronchitis v soustavném léčení, včetně chronické mukopurulentní bronchitis a bronchiektazií. Onemocnění recidivujícími záněty DCD a chron. zánětem dýchacího ústrojí z rizika fibrogenního prachu s poruchou plicní funkce.	21 1/ 5/	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. internisty nebo odb. pro TRN, pokud hodnoty VC plic nebo FEV 1 sec. Byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty a u bronchiektazií. Pacientům v riziku fibrogenního prachu lze poskytnout kompl. láz. péči i dle § 33 odst. 7 zákona u vysoké míry rizika po expozici 5 let, u střední míry rizika po expozici 10 let , u malé míry rizika event. příspěvková péče.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova</u> <u>Stud.</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské</u> <u>L.</u>
V / 7 J 43, J 44	Obstruktivní chronická bronchitis	21 1/ 5/	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota FEV 1 sec. byla opakovaně nižší než 60 % náležité hodnoty.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova</u> <u>Stud.</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské</u> <u>L.</u>
V / 8 J 45	Astma bronchiale všech stadií i profesionální etiologie.	21 1/ 5/	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. alergologa nebo odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů průměrně alespoň jedenkrát měsíčně s poklesem hodnoty FEV 1 sec. Spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % náležité hodnoty ( spirometrické hodnoty		<u>Jeseník</u> <u>Karlova</u> <u>Stud.</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské</u> <u>L.</u>

				nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu.)		
V / 9 dle zákl. dg.	Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v dlouhodobé péči včetně pneumokonióz všech stadií.	28 3/	K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. odborníka pro TRN.	U silikotuberkulózy jen u osob vyřazených z dispenzárních skupin aktivní TBC.	<u>Jeseník</u> <u>Karlova Stud.</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské l.</u>
V / 10 dle zákl. dg.	Následky poškození respektive toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na HCD a DCD.	28 3/	K	Komplexní lázeňská léčba se poskytuje dle § 33 odst. 7 zákona		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Stud.</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské l.</u>

#### VI. Nemoci nervové Kontraindikace pro celou indikační skupinu : kouření

1	2	3	4	5	6	7
VI/1 G51, G52 G54, G55 G56, G58 G59, G61 G63, G64 G94, G95 G96	Chabé obrny mimo poúrazové včetně poinfekčních polyradikulo-neuritid, postpoliomyelitický syndrom.	21 6/	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa nebo rehabil.lékaře po odeznění akutního stadia. Opakování KLL, 1x ročně je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem ke zhoršení klinického stavu nebo pro zpomalení progresu onemocnění. U nemocných s obrnou lícního nervu lze poskytnout léčbu jako K 1x v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léčebné rehabilitace.		<u>Dubí</u> <u>Jánské Lázně</u> <u>Klimkovice</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>
VI / 2 G 59, G 60 G 61, G 62 G 63, G 64	Polyneuropatie s paretickými projevy.	21 6/	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře u chabých obrn s těžším postižením než odpovídá 3. stupni svalového testu.		<u>Bílina</u> <u>Dubí</u> <u>Jáchymov</u> <u>Jánské Lázně</u> <u>Mšené</u> <u>Klimkovice</u> <u>Teplice</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>

VI / 3 G 54, G 55	Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	21	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa nebo rehabil. lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd., nebo u případů nejevicích známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby , u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému zákroku.		<u>Bělohrad</u> <u>Bílina</u> <u>Dubí</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Jánské</u> <u>lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Kundratice</u> <u>Libverda</u> <u>Mariánské</u> <u>Lázně</u> <u>Mšené</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u>
VI / 4 GO4, GO5,GO	Zánětlivé nemoci centrálního nervstva/ stavy po meningoencefalitidách/ pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.	21 6/	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabil. lékaře v návaznosti na odeznění akut. stadia, opakovaná kompl. láz. léčba je možná pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdravotního stavu.		<u>Janské</u> <u>lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Velké</u> <u>Losiny</u> <u>Vráž</u>
VI / 5 dle zákl. dg.	Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce.	21 6/	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa nebo rehabil. lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stadia. Opakovanou kompl. láz. léčbu lze poskytnout do 24 měs.po vzniku onemoc. pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce. U každého nemocného je před posláním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léč. těl. výchovou z hlediska kardiovaskul. aparátu.	Opakování náhlé CMP více než dvakrát, recidiva hemiparéz od 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy zejména percepční, kouření, známky kardiální insuficience.	<u>Dubí</u> <u>Janské</u> <u>lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Mšené</u> <u>Velké</u> <u>Losiny</u> <u>Vráž</u>
VI / 6 dle zákl. dg.	Stavy po poraněních a operacích centrálního a perif. nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce.	21 6/	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa, neurochir.,ortopeda nebo rehab. lékaře v návaznosti na ukončení hospitalizace.		<u>Bělohrad7/</u> <u>Dubí</u> <u>Janské</u> <u>Lázně</u> <u>Jáchymov</u> <u>7/</u>

				Opakování kompl. láz. léčby je možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce.		<u>Karviná</u> <u>Velké</u> <u>Losiny</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>
VI / 7 G 35, G 36 G 37	Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění mimo ataku.	21/	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa po první atace onem. a zpravidla po 2 letech od ukončení poslední lázeňské léčby.	Výrazná ataxie, pokročilé plegické stavy, ataky opakující se do 1 roku.	<u>Bílina</u> <u>Dubí</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>
VI / 8 G 11, G 12 G 13, G 24.9 G 60, G 70.9 G 71, G 72 G 73	Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní	21 6/	P, K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa, v návrhu nutno uvést výsledek kardiolog. vyšetření. Ve formě kompl. láz. léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji.	Myastenická onemoc. a paroxys. svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stav provázené poruchami dýchání a nedostatečnou plicní ventilací.	<u>Janské</u> <u>Lázně</u> <u>Velké</u> <u>Losiny</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>
VI / 9 G 95	Syringomyelie s paretickými projevy.	21	P, K	Lázeň. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa. Ve formě kompl. láz. léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky.	Poruchy dýchací a polykací	<u>Dubí</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>
VI / 10 G 80, G 81 G 82, G 83	Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstatnosti.	21 1/	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa nebo rehab. lékaře nemocným do 21 let věku. Pokud je ústavní rehabilitace nezbytná lze kompl. láz. léčbu poskytnout i nemocným starším 21 let, nikoliv častěji než 1x za 2 roky.		<u>Dubí</u> <u>Janské</u> <u>Lázně</u> <u>Klimkovice</u> <u>Vráž</u>
VI / 11 G 20, G 21	Parkinsonova choroba	21	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout 1x na doporučení neurologa.	Netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróze.	<u>Dubí</u> <u>Libverda</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské</u> <u>L.</u> <u>Vráž</u>

## VII. Nemoci pohybového ústrojí

1	2	3	4	5	6	7
VII / 1 M 05, M 06 M 08, M	Revmatoidní artritida st. I.-IV. / včetně juvenilní artritidy /.	21 3/ 5/	P, K	Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor.-revmatologa od II. stadia choroby s funkčním	Vysoká nebo narůstající aktivita, neschopnost	<u>Bechyně</u> <u>Darkov</u> <u>Bělohrad</u>

09				postižením třídy “ b “.	samostatného pohybu.	<u>Bohdaneč</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Ostrožská N.Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice.</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Hodonín</u>
VII / 2 M 45	Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba ).	21 3/ 5/	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa od II stadia choroby s funkčním postižením třídy “ b “ soustavně léčené na revmatologickém nebo rehabilitačním oddělení.	Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N.Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Kostelec</u>
VII / 3 M 02, M 03 M 06, M 07	Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritida, Reiterův sy, enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy.	21 3/ 5/	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa  a/ při postižení páteře II. a vyššího stadia dle klasifikace pro ankylozující spondylitidu b/ při chronické artritidě periferních kloubů od II. stadia dle klasifikace pro revmatoidní artritidu.	Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení, artritidy specifického původu.	<u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Lipová</u> <u>Lázně 8/</u> <u>Mšené</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Slatinice</u> <u>Velichovky</u> <u>Bechyně</u> <u>Kostelec</u>
VII / 4 M 32, M 33 M 34, M 35	Difusní onemocnění pojiva s kloubními projevy (systémový lupus erytematos, sclerodermie, polymyositis a dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné sy.).	21 3/	K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout v klinické remisi na doporučení revmatologa.	Vysoká nebo narůstající aktivita, závažné viscerální postižení včetně postižení CNS.	<u>Jáchymov</u> <u>Lipová</u> <u>Lázně 8/</u> <u>Teplice</u> <u>Klímkovice</u>

VII / 5 M 12, M 14 M 36	Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurologická a plicní onemocnění. (hemofilická, diabetická artropatie, akromegalie, hypertyreóza, hypertrofická pulmonální osteoartropatie, artrózy ze snížené vnímavosti pro bolest apod.).	21	P, K	Léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa ve spolupráci s odborníkem příslušného oboru. Kompl. láz. léčbu lze poskytnout pouze u hemofilické artropatie na doporučení hematologické poradny.	Čerstvá hemartróza, artritidy specifického původu, maligní proces.	<u>Bělohrad 9/</u> <u>Darkov 9/</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice 9/</u> <u>Teplice v Č</u> <u>Třeboň 9/</u> <u>Velichovky 9/</u> <u>Klimkovice</u>
VII / 6 M 10, M 11 M 14	Metabolická onemocnění s postižením kloubů (dnavá artritida, artikulární chondrokalcinóza, ochronotická artropatie aj.).	21	P, K	Léčbu lze poskytnout výjimečně jako komplexní na doporučení revmatologa při polyartikulárních artritických změnách s dekompenzací.		<u>Bělohrad</u> <u>Jáchymov</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Mariánské L.</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Bechyně</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Kundratice</u> <u>Mšené</u> <u>Toušev</u>
VII / 7 M 80, M 81 M 82	Osteoporóza primární a sekundární (především z inaktivity) zejména se svalovými paravertebrálními spasmami.	21	P, K	Léčbu lze poskytnout na doporučení internisty nebo revmatologa. kompl. láz. léčbu lze poskytnout pouze podle § 33 odst. 7 zákona u kostních změn, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu.	Akutní zhoršení, stavy po čerstvých kompresivních frakturách obratlů a ostatních kostí.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Jáchymov</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Slatinice</u>
VII / 8 dle zákl. dg.	Bolestivé sy. šlach, úponů, burz, podkožní tkáň, tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji, a nadměrným jednostranným přetížením mimokloubní revmatismus celkový a lokalizovaný.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona.		<u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Dubí</u> <u>Hodonín</u> <u>Kundratice</u> <u>Luhačovice</u> <u>Ostrožská</u> <u>N. Ves</u> <u>Teplice v Č</u> <u>Třeboň</u> <u>Vráž</u> <u>Kostelec</u> <u>Bechyně</u> <u>Bludov</u> <u>Darkov</u> <u>Františk. L.</u> <u>Jáchymov</u> <u>Libverda</u> <u>Mšené</u> <u>Slatinice</u> <u>Toušev</u>



						<a href="#">Velichovky</a> <a href="#">Klimkovice</a>
VII / 9 M 16	Koxartróza v soustavném lčení.	21 3/	P, K	Kompl. láz. lčbu lze poskytnout na dopor. Revmatologa, ortopéda nebo rehabil. lékaře od III. stadia choroby s funkčním postižením třídy "b", zcela výjimečně od II. stadia v případech rychlé progresy a častých bolestivých dekompenzací. U oběžných je opakování lčby možné po prokázání snížení hmotnosti.	Neschopnost samostatného pohybu, nestabilizovaná osteoartróza.	<a href="#">Bechyně</a> <a href="#">Bělohrad</a> <a href="#">Bohdaneč</a> <a href="#">Darkov</a> <a href="#">Františkovy L.</a> <a href="#">Kundratice</a> <a href="#">Mšené</a> <a href="#">Ostrožská</a> <a href="#">N.Ves</a> <a href="#">Teplice</a> <a href="#">Velichovky</a> <a href="#">Hodonín</a> <a href="#">Jáchymov</a> <a href="#">Libverda</a> <a href="#">Slatinice</a> <a href="#">Toušev</a> <a href="#">Třeboň</a> <a href="#">Kostelec</a>
VII / 10 M 17, M 22 M 23	Gonartróza v soustavném lčení.	21 3/	P, K	Komplexní lázeňskou lčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa, ortopéda nebo rehabil. lékaře od III., stadia choroby, zcela výjimečně od II. stadia v případech rychlé progresy nebo opakované zánětlivé iritace. U oběžných je opakování láz. lčby možné po prokázání snížení hmotnosti.	Těžké destruktivní změny.	<a href="#">Bechyně</a> <a href="#">Bělohrad</a> <a href="#">Bohdaneč</a> <a href="#">Františkovy L.</a> <a href="#">Jáchymov</a> <a href="#">Libverda</a> <a href="#">Ostrožská</a> <a href="#">N.Ves</a> <a href="#">Teplice</a> <a href="#">Třeboň</a> <a href="#">Kostelec</a> <a href="#">Darkov</a> <a href="#">Hodonín</a> <a href="#">Kundratice</a> <a href="#">Mšené</a> <a href="#">Slatinice</a> <a href="#">Toušev</a> <a href="#">Velichovky</a>
VII / 11 M 15, M 18 M 19	Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postižením ručních a nožních kloubů).	21	P, K	Kompl. lázeňskou lčbu lze poskytnout výjimečně na dopor. revmatologa, ortopéda nebo rehab. lékaře při rhizartróze, Heberdenových nodositách, omartróze nebo u generalizované polyartrózy v případech, kdy onemoc. způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou pracovní neschopnost.	-	<a href="#">Bělohrad</a> <a href="#">Darkov</a> <a href="#">Františkovy L.</a> <a href="#">Jáchymov</a> <a href="#">Libverda</a> <a href="#">Ostrožská N.</a> <a href="#">Ves</a> <a href="#">Teplice</a> <a href="#">Třeboň</a> <a href="#">Kostelec</a> <a href="#">Bechyně</a> <a href="#">Bohdaneč</a> <a href="#">Hodonín</a> <a href="#">Kundratice</a>

						<u>Mšené</u> <u>Slatinice</u> <u>Toušeň</u> <u>Velichovky</u>
VII / 12 M42,M43 M47,M48 M49,M50 M51,M53 M54	Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu,soustavně léčený.	21	P,K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout Výjimečně, na doporučení rehabilitačního lékaře,pouze u funkční etiologie obtíží, jde-li o edukaci léčebných a režimových opatření s cílem zabránit snížení pracovní schopnosti (soběstačnosti).Opakování láz. péče se nepředpokládá.	Kompresivní radikulární syndrom	<u>Běloves</u> <u>Bílina</u> <u>Bludov</u> <u>Bechyně</u> <u>Darkov</u> <u>Dubí</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Jáchymov</u> <u>Konstantinovy</u> <u>L.</u> <u>Kundratice</u> <u>Klimkovice</u> <u>Kostelec</u> <u>Libverda</u> <u>Mariánské L.</u> <u>Ostrožská</u> <u>N.Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice n. B.</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Hodonín</u> <u>Karviná</u> <u>Karlovy V.</u> <u>Kostelec</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mšené</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Toušeň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u>
VII / 13 M41	Skoliózy idiopatické a jiné s tíží zakřivení do 60 st. dle Cobba, soustavně léčené.	21 1/5	P,K	Léčbu lze poskytnout jako komplexní na doporučení ortopéda nebo rehabil. lékaře nemocným do 25 let s tíží zakřivení od 20 stupňů dle Cobba.		<u>Bělohrad</u> <u>Jánské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské L.</u> <u>Vráž</u>
VII / 14 Dle zákl..dg.	Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortoped. operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního.	21 1/5	P,K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. ortopéda, neurochirurga, neurologa nebo rehabil. lékaře do 1 roku po závažných úrazech a operacích s významným omezením hybnosti nebo narušením pohybového stereotypu.	Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsuze je nutné předem projednat s vedoucím	<u>Bělohrad</u> <u>Bludov</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Dubí</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Bechyně</u> <u>Jánské Lázně</u> <u>Karviná</u>

					lékařem lázeňské léčby.	<u>Mariánské L.</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u> <u>Libverda</u> <u>Mšené</u> <u>Teplice v Č</u> <u>Toušeh</u> <u>Třeboň</u> <u>Slatinice</u>
VII / 15 dle zákl..dg	Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní.	21 1/5	P,K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. ortopéda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po operaci.	Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčby.	<u>Bělohrad</u> <u>Bechyně</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Jáchymov</u> <u>Klimkovice</u> <u>Jánské Lázně</u> <u>Slatinice</u> <u>Karviná</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u> <u>Mariánské L.</u>
VII / 16 dle zákl..dg	Předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní.	21 10/	P,K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. specialisty-ortopéda, je-li nezbytně nutná v rámci přípravy k operačnímu výkonu.	-	<u>Bechyně</u> <u>Jáchymov</u> <u>Jánské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Třeboň</u> <u>Vráž</u> <u>Mariánské L.</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Klimkovice</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Velichovky</u>

### VIII. Nemoci ústrojí močového

Kontraindikace pro celou skupinu VIII. chronická glomerulonefritis se známkami aktivity, stavy spojené s městnáním moči pro překážku v močových cestách.

č.indikace dg.	Indikace	Délka lěč. Pobytu	typ lázeň. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VIII / 1 dle zákl..dg	Netuberkulózní chronické záněty cest močových, chronická pyelonefritida.	21 3/	P,K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. urologa nebo internisty u chronické pyelonefritidy v solitární ledvině při cystickém		<u>Mariánské</u> <u>L.</u>

				onemocnění ledvin nebo pokud hladina kreatininu v séru trvale přesahuje 150 µmol/l		
VIII / 2 N20,N21 N22	Nefrolitiáza bez prokazatelného městnání v močových cestách, nefrokalcinóza.	21	P,K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. urologa nebo internisty při nefrolitiáze v solitární ledvině nebo při oboustranné nefrolitiáze, pokud tyto stavy nejsou indikované k operační léčbě, dále u cystinové nefrolitiázy a bilat. Nefrokalcinózy.		<u>Mariánské L.</u>
VIII / 3 dle zákl..dg	Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovesikálních, stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii /nefrolitolapaxii/	21	P,K	Kompl.láz.. léčbu lze poskytnout na dopor. urologa do 6 měs./ alt.12 měs./ od výkonu jako doléčení po ESWL a po operacích s výjimkou stavů po prostatektomii.		<u>Mariánské L.</u>
VIII / 4 N34,N40 N41,N42	Prostatitida,prostatovesikulitida, chronická uretritida.	21	P			<u>Mariánské L.</u>
VIII / 5 dle zákl..dg	Stav po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu.	21	K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení nefrologa.		<u>Mariánské L.</u>

### IX. Duševní poruchy

č.indikace dg.	Indikace	Délka léč. pobytu	typ lázeň. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
IX / 1 F 20,F 21 F 25,F 30 F 31,F 32 F 33,F 34	Psychózy ve stádiu remise	21 5/	P,K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém	Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.	<u>Dubí Jeseník</u>

				psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.		
IX / 2 F 40,F 41 F 42,F 43 F 45,F 48 F 51,F 54 F 06.6 F 06.7 F 07.1 F 07.2	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy včetně poruch psychosomatických.	21 5/	P,K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. Psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.	Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.	<u>Dubí</u> <u>Jeseník</u> <u>Libverda</u>

## X. Nemoci kožní

č.indikace dg.	Indikace	Délka léč. pobytu	typ lázeň. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
X / 1 L20	Atopický ekzém.	28 3/	P,K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. dermatologa do 25 let věku a dále, pokud láz. léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci, nebo je její alternativou.		<u>Jeseník</u> <u>Lipová</u> <u>Lázně</u> <u>Kostelec</u>
X / 2 L40	Psoriasis vulgaris.	28	P			Lipová Lazně Kostelec Ostrožská N. Ves
X / 3 L40	Psoriasis generalisata et arthropatica.	28 1/	P,K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. dermatologa v případě, že lázeňská léčba je alternativou hospitalizace, bezprostředně navazuje na hospitalizaci nebo ambul. léčbu pro akutní exacerbaci. U atopické psoriázy i na doporučení revmatologa.		<u>Ostrožská</u> <u>N.Ves</u> <u>Lipová</u> <u>Lázně</u> <u>Kostelec</u>
X / 4 L70	Acne conglobata et indurata.	28	P,K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout na dopor. dermatologa nemocným do 25 let.		<u>Lipová</u> <u>Lázně</u> <u>Kostelec</u>
X / 5 dle zakl.dg	Chronické dermatózy.	28	P,K	Kompl.lázeňskou léčbu lze poskytnout na dopor. dermatologa , v případě, že lázeňská léčba je pokračováním nebo		<u>Lipová</u> <u>Lázně</u> <u>Kostelec</u>

				alternativou hospitalizace.		
X / 6 dle zakl..dg	Toxické kontaktní dermatitidy a ekzém profesionálního původu v soustavném odborném léčení.	28 1/	P,K	Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 33 odst. 7 zákona.		<u>Lipová</u> <u>Lazně</u> <u>Kostelec</u>
X / 7 dle zakl..dg	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné smršťování jizev, do 6 měsíců od zhojení.	28 1/	K	Léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, plastického chirurga nebo rehabilitačního lékaře.		<u>Lipová</u> <u>Lazně</u> <u>Bechyně</u> <u>Jánské</u> <u>Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Bělohrad</u>

## XI. Nemoci ženské

č.indikace dg.	Indikace	Délka léč. pobytu	typ lázeň. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
XI / 1 N 96,N 97	Sterilita a infertilita (primární a sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, abortus habitus).	28	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout u žen do 40 let věku celkem 2x. U sterility je nutné i vyšetření partnera a jde-li o ženu starší 35 let genetické vyšetření obou partnerů.		<u>Františkovo</u> <u>L.</u> <u>Klimkovic</u> <u>Mariánské</u> <u>L.</u>
XI / 2 E 28 N 85,N 91	Porucha ovariální funkce a vývoje dělohy (hypoplasia uteri, oligohypomenorrhoe, cyclus anovularis, insufficientia ovarialis, deviation uteri).	28	P,K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout celkem 2x.		<u>Františkovo</u> <u>L.</u> <u>Klimkovic</u> <u>Mariánské</u> <u>L.</u>
XI / 3 N 70,N 71 N72,N 73 N76	Zánětlivé onem. vnitř. rodidel a jejich následky (zánětl.kompl. po umělém přeruš. těhotenství, kolpitis chron.occlusio tubarum,parametritis chronica, adhesiones organorum pelvis minoris).	28	P,K	Láz. léčbu je možno poskytnout po akutní exacerbaci zánětlivého onemocnění opakovaně, u žen ve fertilním věku jako komplexní.		<u>Františkovo</u> <u>L.</u> <u>Klimkovic</u> <u>Mariánské</u> <u>L.</u>
XI / 4 dle zakl..dg	Stavy po gynekol. operacích a po operacích v oblasti malé pánve.	28	P,K	Kompl.láz. léčbu lze poskytnout do 12 měs. od operace a to po operacích, které byly komplikované nebo s komplik.		<u>Františkovo</u> <u>L.</u> <u>Klimkovic</u> <u>Mariánské</u> <u>L.</u>

				průběhem a dále u žen do 30 let po břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.	
XI / 5 N 94,N 95	Funkční poruchy ( klimakterický syndrom,dyspareunie, algopareunie,frigidita dysmenorhoe, algomenorhoe, pelvipathia spastica).	28	P		Františkovy L. Jeseník Klimkovice Mariánské L.

## B. Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

### 1.Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii:

Bělohrad	pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let možná v doprovodu rodičů po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny
Bludov	pro děti od 3 let a dorost
Darkov	pro děti od 3 do 15 let
Františkovy Lázně	pro děti od 6 let a dorost
Jánské Lázně	pro děti od 2 let a dorost, u indikací skupiny XXV od 3 let a dorost. U indikací skupiny XXVI a XXVII je možná léčba dětí od 1 roku po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny
Jeseník	u indikací skupiny XXV a indikace XXX/2 pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 do 6 let je možná pouze v doprovodu rodičů. Indikace skupiny XXIX jsou určeny pouze pro léčbu dorostu
Karlovy Vary	pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Kynžvart	pro děti od 2 do 15 let
Lipová	pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Luhačovice	u indikací skupiny XXV pro děti od 5 let a dorost, u indikací skupiny XXIV pro děti od 10 let a a dorost
Mariánské Lázně	u indikací skupiny XXV a indikace XXVII/4 pouze pro dorost, u indikací XXVIII a XXXI pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Poděbrady	pro děti od 3 let a dorost
Teplice n.B.	pro děti od 3 let a dorost
Teplice	pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Velké Losiny	u indikací skupiny XXV pro děti od 3 let a dorost, u indikací skupiny XXVI pro děti od 1 roku a dorost
Železnice	pro děti od 3 let a dorost
Klimkovice	pro děti od 3 let a dorost, děti s indikacemi skupiny XXVI je možno v doprovodu rodičů přijímat již od 1 roku věku. Indikace XXVII/4 pouze pro dorost

## 2. Obecná ustanovení

Délka léčebného pobytu dětí a dorostu se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař lázeňské léčebny. Dorostu lze výjimečně a se souhlasem rodičů poskytnout lázeňskou péči i v léčebnách pro dospělé.

## 3. Indikační skupiny

### XXI .Onkologická onemocnění

č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XX/1 dle zák. dg.	Onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoli známek recidivy a metastáz. Lázeňskou léčbu doporučuje klinika dětské onkologie FN Praha 5-Motol a oddělení dětské onkologie FN s poliklinikou v Brně, příp. jiné odborné onkolog. pracoviště.	Jánské Lázně	

### XXII. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavy bezvědomí v anamnéze. Na doporučení odborníka pro preventivní kardiologii je možno na indikaci XXII/IO vysílat děti s rodiči s indikací II/1 do Konstantinových Lázní. Délka pobytu dítěte i dospělého je stejná, tj. 21 dnů.

č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXII/1 IOO, IO1 IO2	Stavy po revmatické horečce od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/2 I40	Stavy po akutní karditidě nerevmatické para či postinfekční od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/3 IO5, IO6, IO7, IO8 IO9, I33, I41, I42	Chronické karditidy.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/4 Q20-Q26	Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév před operací.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/5 dle zák. dg.	Stavy po operacích vrozených nebo získaných vad oběhového ústrojí..	Poděbrady, Teplice n. B.	
XXII/6 IOO, M35	Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.	Poděbrady, Teplice n. B.	
XXII/7 F45	Neurocirkulační asthenie závažné symptomatologie.	Poděbrady, Teplice n. B.	



XXII/8 I10, I11, I12, I13	Juvenilní hypertenze.	Poděbrady Teplice n. B. Klimkovice	
XXII/9 I77, I78, I79	Nemoci periferních cév.	Poděbrady Klimkovice Teplice n. B.	
XXII/10 dle zákl. dg.	Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory.	Poděbrady Teplice n. B.	

### XXIII. Nemoci ústrojí trávicího

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/.

č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXIII/1 dle zákl. dg.	Chronické onemocnění žaludku, funkční poruchy žaludku, chronická gastritis a duodenitis erosiva, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a dvanáctníku.	Karlovy Vary	Stenózy a penetrace, případy vyžadující reoperaci
XXIII/2 dle zákl. dg.	Chronické onemocnění střev, funkční poruchy tenkého a tlustého střeva, chron. enterokolitidy včetně M.Crohn a ostatní primární malabsorpční syndromy, dermatogenní malabsorpční syndromy, polyposis intestini, megacolon vrozené i získané, stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.	Karlovy Vary	Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev
XXIII/3 dle zákl. dg.	Nemoci jater, stavy po infekční hepatidě, chron. hepatitidy, cirhózy ve stavu kompenzace, toxická poškození jater, stavy po inf. mononukleóze s jaterní poruchou, stavy po úrazech a operacích jater a jiné hepatopatie.	Karlovy Vary	Pokročilá jaterní nedostatečnost
XXIII/4 dle zákl. dg.	Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest, vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece, chron. cholecystitidy, biliární dyspepsie, stavy po operacích žlučníku a žluč. cest.	Karlovy Vary	Obstrukce nebo infekce žlučových cest, empyem žlučníku, cholangioitis
XXIII/5 dle zákl. dg.	Chronické nemoci pankreatu, stavy po akutní pankreatitis, chron. pankreatitis, pankreatická achylie vrozená i získaná, mukoviscidosa, stavy po operacích a úrazech pankreatu.	Karlovy Vary	Časté exacerbace pankreatitidy

### XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V rámci indikace XXIV/1 je možno přijímat do DL Karlovy Vary děti a mladistvé s čerstvě zjištěným diabetem, zpravidla v doprovodu rodičů, k edukačnímu pobytu v trvání 14 dnů.

č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXIV/1 I0,E11, E12,E13	Diabetes mellitus.	Karlovy Vary Luhačovice	Nestabilizovaný diabetes

XXIV/2 E65, E66, E68	Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů.	Bludov Karlovy Vary Luhačovice Poděbrady	
XXIV/3 E78	Hyperlipoproteinemie.	Karlovy Vary Poděbrady	
XXIV/4 EO5	Tyreotoxikóza.	Jeseník	
XXIV/5 EO5	Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.	Jeseník	

## XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXV. kardiopulmonální nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. Pro léčbu v Jánských Lázních jsou bronchiektázie kontraindikací.

č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXV/1 J31,J32, J35,J37, J38,J39	Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností.	Bludov Jánské Lázně, Jeseník Kynžvart Marián. Lázně Luhačovice Velké Losiny	
XXV/2 J30	Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Marián. Lázně Velké Losiny	
XXV/3 J40,J41 J42	Bronchitis recidivans.	Jánské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Marián. Lázně Velké Losiny	
XXV/4 J32,J40, J42	Sinobronchitis.	Jánské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Marián. Lázně Velké Losiny	
XXV/5 J12,J13 J14,J15, J16,J17 J18	Rekonvalescence po zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 let.	Jánské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Marián. Lázně Velké Losiny	
XXV/6 J44,J45	Bronchitis asthmatica, spastica a obstructiva.	Jánské Lázně Jeseník Kynžvart	

		Luhačovice Marián. Lázně Velké Losiny	
XXV/7 J45	Asthma bronchiale.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Marián. Lázně Velké Losiny	
XXV/8 J42,J44	Dermorespirační syndrom.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Marián. Lázně Velké Losiny	
XXV/9 dle zákl. dg.	Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích a plic.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Marián. Lázně Velké Losiny	
XXV/10 dle zákl. dg.	Intersticiální plicní fibróza.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Marián. Lázně Velké Losiny	
XXV/11 dle zákl. dg.	Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Marián. Lázně Velké Losiny	

## XXVI. Nemoci nervové

**Kontraindikace** pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXVI/1 dle zákl. dg.	Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny). Pozn.:přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.	Janské Lázně Velké Losiny Klimkovic	
XXVI/2 G11-13, G24.9, G71 - 73	Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Klimkovic	Imobilní pacienti s rychlou progresivitou nemoci

XXVI/3 G80-83	Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení).	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Železnice Klimkovice	Mentální retardace znemožňující spolupráci při léč. rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI/4 GO5,GO6, GO8,GO9, G11,G12, G54,G55	Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabilitací, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorů CNS.  Pozn.: Přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Železnice Klimkovice	Mentální retardace znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI/5 G54,G55	Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	Bělohrad Janské Lázně Teplice Klimkovice Velké Losiny	

## XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXVII/1 MO8, MO9	Juvenilní chronická artritida a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře.  Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka.	Bělohrad Poděbrady Teplice Teplice n. B. Darkov	Výrazné oběhové poruchy
XXVII/2 dle zákl. dg.	Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu.	Bělohrad Janské Lázně Teplice Darkov	
XXVII/3 dle zákl. dg.	Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 36 měsíců po úrazu nebo operaci.	Bělohrad Janské Lázně Poděbrady Teplice Darkov	
XXVII/4 M41	Skoliózy - mobilní ve stálé rehabilitační péči.	Bělohrad Darkov Janské Lázně Marián. Lázně Teplice	

		Klimkovice Velké Losiny	
XXVII/5 M91, M92	Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.	Darkov Teplice Poděbrady x)	
XXVII/6 M42	Morbus Scheuermann.	Bělohrad Darkov Teplice	
XXVII/7 M86	Vleklé osteomyelitidy.	Darkov Teplice	Stavy s píštělí
XXVII/8 M50,M51 M53,M54, M42	Vertebrogenní syndrom algický funkčního či degenerativního původu.	Bělohrad Bludov Jánské Lázně Teplice Darkov Velké Losiny	

x) pouze pro primární a sekundární osteoporózu

### XXVIII. Nemoci ledvin a cest močových

č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXVIII/1 N10,N11, N12,N30, N31	Recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomické nebo funkční léze.	Bludov Marián. Lázně	Známky ledvinové nedostatečnosti s kreatininemií nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mmHg
XXVIII/2 N20,N21, N22,N23	Urolitiáza - po operaci nebo spontánním odchodu konkrementu - s konkrementem in situ, neoperabilní stavy, - recidivující formy sui generis nebo metabolicky podmíněné.  Pozn.: dle možností sdělit chemické složení konkrementu.	Marián. Lázně	Lokalizace konkrementu s nebezpečím kompletní blokády močových cest
XXVIII/3 dle zákl. dg.	Stavy po operacích močového ústrojí (mimo urolitiázu - do 12 měsíců po výkonu, - do 3 let po výkonu, pokud jsou komplikovány infekčním zánětem).	Bludov Marián. Lázně	Operační rána s píštělí vyžadující trvalé chirurgické ošetřování, stavy vyžadující trvalé používání urinalu nebo opakované cévkování
XXVIII/4 NO2,NO3, NO4	Vleklá difusní onemocnění ledvinových klubiček (glomerulonefritis, lipoidní nefróza, hereditární nefropatie) pouze v klidovém stádiu bez sklonu ke klinickým recidivám a bez potřeby medikamentózní terapie ve vysokých dávkách.	Marián. Lázně	Vysoká a nevyrovnaná aktivita onemocnění, sklon k iontové a vodní dysbalanci, FW vyšší než 50 mm/hod., kreatininemie nad 150 umol. diastol. Hypertenze nad 100 mmHg

### XXIX. Duševní poruchy

Určeno pouze pro lázeňskou léčbu dorostu

č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXIX/1 F20, F21 F25, F30, F31, F32, F33, F34	Psychózy ve stádiu remise.	Jeseník	Poruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád
XXIX/2 F40, F41, F42, F43, F45, F48, F51, F54, FO6.6 FO6.7, FO7.1, FO7.2	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	Jeseník	Poruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád

### XXX. Nemoci kožní

Kontraindikace pro celou skupinu XXX. mikrobiální ekzém.

č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXX/1 L40	Psoriasis - chronické a recidivující formy.	Darkov Kynžvart Teplice n. B. Lipová Lázně	
XXX/2 L20, L23	Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo.	Darkov Jeseník Kynžvart Teplice n. B. Lipová - Lázně	Impetiginizace, mikrobiální ekzémy
XXX/3 L70	Indurativní a konglobující formy akne.	Darkov Lipová-Lázně	
XXX/4 L94	Sklerodemie.	Darkov Lipová-Lázně	Maligní a progredující formy
XXX/5 L85	Ichtyózy.	Darkov Kynžvart Teplice n. B. Lipová-Lázně	
XXX/6 dle zákl. dg.	Chronické dermatózy.	Darkov Kynžvart Teplice n. B. Lipová.Lázně	
XXX/7 dle zákl. dg.	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.	Bělohrad Janské Lázně Lipová-Lázně Železnice	

**XXXI. Nemoci gynekologické**

Kontraindikace pro celou skupinu XXXI.: appendicitis chronica.

č.indikace dg.	Indikace	Lázeňské místo	Kontraindikace
XXXI/1 N70,N71 N72,N73, N74,N75 N76,N77	Zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.	Frant. Lázně Klimkovice Marián. Lázně	
XXXI/2 N85	Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy.	Frant. Lázně Klimkovice	
XXXI/3 N91, N92, N93,N94	Primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem nebo při zavedení umělého cyklu k zástavě růstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po velkém zhubnutí, hypoestrinní hypooligo-menorea.	Frant. Lázně Klimkovice	
XXXI/4 N92	Stavy po léčených juvenilních metroragiích hypohormonálních nebo zánětlivých.	Frant. Lázně Klimkovice	Hyperestrogenní stavy.
XXXI/5 dle zákl. dg.	Sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením rodidel.	Frant. Lázně Klimkovice	
XXXI/6 dle zákl. dg.	Stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných břišních operacích se vztahem ke krajně malé pánve, zejména po appendectomii do 12 měsíců od operace.	Frant. Lázně Klimkovice Marián. Lázně	