



Stavba kardiovaskulární soustavy



Stavba srdce


- Endokard
 - endotel
 - subendotelové vazivo
 - elasticko-muskulární vrstva
 - subendokardové vazivo (i větve převodního systému)
- Myokard
- Epikard – viscerální list perikardového vaku
 - jednovrstvený plochý epitel
 - lamina propria
 - subepikardové vazivo (i tuková tkáň)
- Perikard – parietální list perikardového vaku
- mezi epikardem a perikardem dutina – 50 ml tekutiny



Section of the heart wall showing the components of the outer pericardium (heart sac), muscle layer (myocardium), and inner lining (endocardium).



Srdce - endokard




- endotel
- subendotelové vazivo
- elasticko muskulární vrstva
- subendokardové vazivo


Chlopně

- endokardové řasy vyztužené tuhou vazivovou ploténkou (pokračování srdečního skeletu)
- jsou vždy bezcévné
- upínají se do nich chordae tendinae

- I. srdeční ozva – uzavírání cípatých chlopní (mitrální a trojcípé)
- II. srdeční ozva – uzavírání aortální a pulmonální chlopně (poloměsíčité)







Srdeční svalová tkáň




kardiomyocyty pracovní - tl:10-15 μm , l:85-100 μm a **vzrušivé**

- válcovitý nebo s výběžky /Y/
- 1 oválné jádro uprostřed s 1 nebo 2 jadérky
- sarkolema + lamina basalis
- **myofibrily** – žíhané /kratší sarkomery, sousední myofibrily sdílejí myofilamenta/
- hojně **mitochondrie**
- GA, glykogen, lipofuscin, lipidy
- kardiomyocyty síní – aurikulin /ANF/
- SR - diády

Srdeční svalová tkáň





Myokard síní





- kardiomyocyty síní menší
 - menší počet T-tubulů
 - granula s ANF
-
- myokard síní je tenčí než komor
 - myokard PK – 4 mm
 - myokard LK – 10 – 12 mm

Převodní systém srdeční

- vzrušivé kardiomyocyty
 - **nízký počet myofibril** – uloženy periferně, náhodné uspořádání
 - ↑ **obsah glykogenu** – světlejší buňky
 - chybí interkalární disky, T-tubuly
 - hojně **nexusy**
 - **Purkyňova vlákna**



Cévy – kapiláry (vlásečnice)



Marcello Malpighi byl italský biolog a lékař, je označován jako „Otec mikroskopické anatomie, histologie, fyziologie a embryologie“


V roce 1661 identifikoval a popsal plicní kapilární síť spojující malé arterie a vény, jeden z největších objevů v historii vědy.

Kapiláry

- kapiláry se souvislou endotelovou výstelkou
- kapiláry fenestrované
- kapiláry s póry
- kapiláry sinusoidní


endotelová buňka + bazální lamina

- Metabolické funkce kapilár
 - výměna plynů, živin
 - propustnost kapilár /ovlivňování../
 - diapedéza leukocytů
 - deaktivují PG, Ser, kininy
 - katabolizují lipoproteiny..
 - konvertují angiotenzin I → II, syntetizují NO
 - uvolňují prostacykliny /inhibice agregace destiček/
 - syntetizují von Willebrandův faktor





Kapiláry se souvislou endotelovou výstelkou


- 6-30 μm
- mozek, thymus, svalstvo, plíce..
- stavba
 - **endotelové buňky** + lamina basalis /1 buňka stačí k vystláni příčného průměru kapiláry/
 - pericyty + jemná kolagenní a retikulární vlákna



plíce



Kapiláry se souvislou endotelovou výstelkou






bariéra
krev-orgán

mozek

Kapiláry fenestrované



- ve výběžcích **endotelových buněk** – fenestrace /60-80 nm/ přepažené diafragmou
- lamina basalis kompletní
- střevní klky, endokrinní žlázy

Fenestrated Capillary



Kapiláry s póry



- fenestrace bez diafragmy
 - jenom glomeruly ledvin





Kapiláry sinusoidní

- nepravidelné lumen – průměr **/8-40 µm/** kolísá v průběhu téže kapiláry
- štěrbiny mezi buňkami
- **fenestrace** v cytoplazmě buněk
- **nesouvislá lamina basalis**
- schopnost fagocytózy endotelových buněk
- játra, kostní dřeň, endokrinní žlázy

Discontinuous Capillary




Kapiláry sinusoidní



2 μm


Portální oběh

dva systémy kapilárního řečiště za sebou




ledviny

venózní




játra



hypofýza


Obecná stavba cév

- **T. interna /intima/**
 - endotel
 - subendotelové vazivo – kolagenní + retikulární vlákna
- **T. media** – cirkulárne uspořádané hladké svalové buňky + elastická vlákna
- **T. externa /adventitia/-**
řídké kolagenní vazivo




Arterie



- Arterie velkého kalibru /elastické/
- Arterie malého a středního kalibru /svalové/
- Arterioly



Arterioly




- lumen < 0.5 mm
- endotel – Weibel-Paladeho granula (s faktorem VIII)
- membrana elastica interna
- media – 1-3(5) vrstev hladkých svalových buněk





Arterie svalového typu

- **t. intima**
 - endotel
 - subendotelové vazivo
- **membrana elastica interna** – zahuštěná síť elasticických vláken
- **t. media** – nejtlustší /až 40 vrstev hladkých svalových buněk/, kolagenní a elastická vlákna
- **membrana elastica externa**
- **t. externa** – řídké kolagenní vazivo





Arterie svalového typu




membrana elastica interna

Arterie velkého kalibru /elastické/


- T. intima – poměrně mohutná
 - endotel
 - subendotelové vazivo – rosolovité
- T. **media** – nejmohutnější, bohatá na elasticá vlákna – **membranae fenestratae**
- T. externa – tenká, longitudinálně orientované kolagenní a elasticá vlákna, vasa vasorum, nervi vasorum



Aorta – arterie elastického typu




Aorta – arterie elastického typu



orcein

Aorta /orcein/




20 µm



Vény

- Velké vény
- Malé a střední vény – 1-9 mm
- Venuly – 0.2-1 mm

- T. intima a media jsou tenčí, **adventicia** je tlustší, vrstvy nejsou dobře ohraničeny, ve stěně větší množství kolagenních vláken, žilní chlopňe
- Adventicia velkých vén – navíc obsahuje svazky longitudinálně probíhajících hladkých svalových buněk




Malé a střední vény



chlopňě – derivát intimy, malé a
střední vény dolní poloviny těla


Velké vény - vena cava



20 µm

Arterie uzavíracího typu

hladké svalové buňky longitudinálně na rozhraní intima-media, vyklenují intimu dovnitř – funkčně jako chlopně, regulace průtoku krve



Arteriovenózní anastomózy

- přímé spojky mezi
arteriolami a venulami

a. dorsalis penis
a. thyroidea..

Stavba srdce a cév

Pericardium and Heart wall

