

Kardiální markery

Markery kardiovaskulárního onemocnění

Myokard (srdeční sval)

- Permanentní kontraktilelní aktivita zajišťující cirkulaci krve (transportní a distribuční funkce)

- Endokrinní žláza


Srdce nás většinou nebolí, možná právě proto jsou srdeční choroby tak nebezpečné



Aerobní metabolismus

(35% objemu svalu zaujímají mitochondrie)

- Hlavní zdroj energie: volné mastné kyseliny
- Významný zdroj energie: glukóza, laktát
- V malém množství: ketolátky, pyruvát, aminokyseliny



AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM (AKS)

= komplex klinických symptomů, které se vyvíjejí při akutní ischémii srdečního svalu

Zahrnuje (nerozlišuje):

NESTABILNÍ ANGINU PECTORIS (NAP), která se projevuje nejčastěji až při zvýšené námaze
a

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU (AIM),
který je konečným důsledkem

Projevy ischémie myokardu

1. Změna mechanické aktivity myokardu

- poruchy kontraktility
- poruchy elektrické aktivity srdeční

2. Subjektivní příznaky onemocnění

- Bolest na hrudi (stenokardie)
- Dušnost, náhlé zpocení, neklid, úzkost

Poznámka: někdy chybí varovná bolest, projeví se pouze celkové příznaky (němý infarkt)

Nejčastější příčiny ICHS

- **Koronární ateroskleróza**

Dlouhodobý chorobný proces poškozující cévy ukládáním tuků do jejich stěny. Vytvářejí se tzv. aterosklerotické pláty. To vede k postupnému zužování průsvitu tepny, která se může úplně uzavřít.

To vede k ischémii a poruchám tkání a orgánů, které tepna vyživuje.

Dojde-li k úplnému uzávěru tepny(např.u AIM) – postižené tkáně většinou odumírají

Další příčiny ICHS

- koronární spasmy
- poruchy humorální regulace koronárního průtoku
- embolie do koronárního řečiště
- trombóza v koronární tepně bez aterosklerózy
- arteritidy (zánět)

Diagnóza AIM

1. **Anamnéza** (charakter, frekvence a doba trvání bolesti)-
20% AIM bez příznaků
2. **Elektrokardiogram** (dvanáctisvodové EKG)-10%
„němé“ EKG
3. **Laboratorní nálezy** (**proteiny uvolněné z nekrotického ložiska do cirkulace**)
4. **Koronarografie** (definitivní vyšetření často spojené s akutní intervencí na koronárním řečišti, včetně perkutální koronární angioplastiky, PTCA)

Jaké jsou možnosti klinické
biochemie pro stanovení
srdeční ischémie a nekrózy?

Doporučení ČSKB



Česká společnost klinické biochemie
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

česky | english

ČSKB 50. let ČSKB Výbor Členská základna Zápis Systém ocenění Koncepte oboru Regionální odborníci a konzultanti Volby Média o KB	Odborné akce 50 let historie odborných akcí Akce ČSKB Granty ČSKB Archiv akcí ČSKB Mezinárodní akce Archiv mezinárodních akcí Ostatní odborné akce	Vzdělávání Atestace Kurzy Proběhlé kurzy LabTestsOnline Edukační zdroje	Časopisy Časopisy v historii ČSKB KBM FONS	Doporučení Kalkulátory	Stanoviska Právní výkazy Odborná stanoviska
Spolupráce Odborné společnosti Profesní organizace Mezinárodní instituce Partneři	Sekce laborantů 50 let ČSKB a laborantů Úvod Výbor sekce Biolab	Kvalita Kvalita a 50 let ČSKB Akreditace laboratoří Národní akreditační standardy	Legislativa MZ ČR Registrační listy Pojišťovny	Odkazy Nemocnice Odborné společnosti Zahraniční časopisy Statistika, kvalita	Diskusní fórum

A red circle highlights the "Doporučení" (Recommendations) section, and a red arrow points from the text below to this section.

Doporučení České společnosti klinické biochemie
Stanovení biochemických markerů poškození myokardu
(2008)

Použití kardiálních troponinů při podezření na AKS (2015)

Jaké máme možnosti laboratorního stanovení?

- Nekrózy myokardu
 - cTnI, cTnT, CK-MB(mass), myoglobin
- Funkční výkonnosti myokardu
 - BNP, NT-proBNP
- Rizika vývoje aterosklerózy
 - lipidy, lipoproteiny, homocystein, receptory LP
- Systémového zánětu
 - CRP,
 - sérum amyloid A protein?, fibrinogen?,...

Současné doporučení ČSKB (2015)

- CK, CK-MB, CK-MB mass nejsou doporučené pro diagnostiku AKS
- Vyšetření troponinů v čase 3-6 h od AKS (cut-off 99.percentil zdravé populace)

Dnes jsou do této skupiny přiřazeny i další markery:


- Sloužící k prognóze_dalšího vývoje onemocnění a k predikci rizika (prevenci) vzniku AKS
- Rizikové faktory ICHS
- Zánětlivého procesu
- Nestability atherosklerotického plátu
- Aktivace trombocytů (ruptura plátu)

Historie: Enzymy a izoenzymy

Analyt	Počátek vzestupu (h)	Maximum (h)	Normalizace (d)	Násobek horní ref.meze v době maxima
AST (1955)	4-8	16-48	3-6	do 25
CK (1960)	3-6	16-36	3-5	do 25
LD (1956)	6-12	24-60	7-15	do 8
izoLD (1963)	6-12	30-72	10-20	

- Nezařazeny do dg.AIM
- Nejsou pro myokard specifické

Kardiomarkery a AIM



Izoenzymy LD

HYDRAGEL ISO CK/LD 15/30

sebia


16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Izoenzymy CK

HYDRAGEL 7 ISO CK/LD



1 2 3 4 5 6 7

sebia

Metody stanovení:

1. Imunochemické (ng/l)
CK-MB mass (hmotnostní koncentrace)
2. Stanovení aktivity (μ kat/l)
3. Elektroforetické

CK-MB mass

Zvýšené hodnoty:

- onemocnění kosterního svalstva
- onemocnění srdečního svalu

AIM: zvýšení po 4-8h; maximum 16-36h; návrat 2-3d

Význam:

- náhradní alternativa; není k dispozici cTn (?)
- doporučuje se k detekci reinfarktu při $>$ cTn

Troponiny

- Bílkoviny, které jsou ve formě tzv. troponinového komplexu spolu s aktinem a tropomyosinem součástí tenkých svalových vláken
- Komplex je přítomen pouze v kosterním a srdečním svalu
- Tropomyosinový komplex se podílí na regulaci svalové kontrakce

Rozdělení troponinů

- **TnT**
váže troponinový komplex k tropomyosinu,
- **TnI**
moderátor aktinmyosinové ATPázy
- **TnC**
vazebný protein pro vápníkový ion

Primární struktura troponinu z kosterního svalu a myokardu je různá,
je splněn požadavek na kardiospecifickou metodu


srdeční troponiny:

cTnI a cTnT

c=cardiac

Různé molekulární formy cTn a problém výběru vhodných epitopů

Volné formy (3-8%) – komplexy(bi- a ternární)
– oxidované, redukované a fosforylované formy
– fragmenty, konformační změny




změny v imunoreaktivitě

Doporučení k laboratorní diagnostice AKS

- Používání jediné hodnoty rozhodovacího limitu (cut-off) cTnI nebo cTnT
- 99. percentil referenční („zdravé“) populace
- Požadování hodnoty přesnosti měření:
 $CV < 10\%$

Přesnost metody není stejná v celém rozsahu měřených hodnot



Srdeční troponiny a realita

- Pro měření cTnI je k dispozici NIST-CRM 2921
- Soupravy na stanovení cTnI zatím nejsou mezi sebou harmonizovány ~ úkol pro výrobce
- Z toho vyplývá **nesrovnatelnost výsledků** a velká závislost na použité metodě

Příčiny nesrovnatelnosti výsledků

- Nedostatečná definice analytu
- Heterogenní směs
- Rozdílné protilátky

(výrobci diagnostik používají různé dvojice/trojice záhytných protilátek)

Doporučené odběry krve

- Při přijetí
- Za 6 – 9 hodin
- eventuelně za 12 – 24 hodin (pokud předchozí hodnoty byly pod cut-off hodnotou a stále existuje klinické podezření na AIM)

D.Rajdl et al., LA, 02/11

Zvýšená koncentrace srdečního troponinu ještě neznamená infarkt myokardu,

kromě ischemické nekrózy existuje možnost neischemického a iatrogenního poškození myokardu

Hranice pro odlišení reverzibilních a nevratných (nekroza) změn v myokardu není zcela jasná

Metody stanovení

1. Referenční metoda: není k dispozici
CRM: NIST-CRM 2921 (cTnI)
2. Rutinní metody: Imunoanalytické
 - luminometrická detekce
(LIA, ILMA, CMIA, ECLIA)
 - fluorimetrická detekce
(MEIA, FPIA)

Hypersenzitivní troponiny

- Doporučení ČSKB z roku 2015
- Meze pro dospělou populaci ($M/Z \geq 18\text{let}$)
- LoD <0,1-3> ng/l

Věk (rozmezí)	35 až 44 let	45 až 54 let	55 až 64 let	65 až 74 let
99. percentil muži (ng/l)	20	20	37	47
99. percentil ženy (ng/l)	8	8	19	37

MYOGLOBIN

- Hemoprotein (Mr=17 800,153 AK) vyskytuje se především v cytoplazmě kosterních svalů a srdečního svalu
- Funkce: přenos a vazba kyslíku
- Vylučován GF
- Biologický poločas v plazmě 10-20 min
- Myoglobin z kosterního, srdečního i hladkého svalu se navzájem neliší

- zvýšení koncentrace myoglobinu v krvi je nespecifické

infarkt myokardu: zvýšení 0,5-2h

maximum 6-12h

návrat 12-48h

(doporučuje se k detekci reinfarktu myokardu)

Klinický význam

- Poškození kosterního svalstva
(fyzická námaha, dušnost, křeče, i.m.injekce,aj.)
- Zvýšená koncentrace u nemocných s renální insuficiencí
- Onemocnění srdečního svalu
Falešně negativní výsledky:
vyšetření mimo diagnostický interval (2-12 h)
u malých AIM (non-Q)

Využívá se jako kardiomarker s nízkou specifitou, ale s vysokou negativní prediktivní hodnotou tohoto stanovení
(vyloučení akutní koronární léze při negativním výsledku vyšetření)

1h (40%) 3h(90%) 4h(96%)

Metody stanovení

1. Referenční metoda – není k dispozici
CRM – není k dispozici
2. Rutinní metody
 - Imunoanalytické**
 - luminometrická detekce
(LIA, ILMA, CMIA, ECLIA)
 - fluorometrická detekce (MEIA, FPIA)

Biochemické funkční markery

Natriuretické peptidy (NP)


Místa vzniku a příčiny

- Svalovina srdečních komor na síní
- Reakce na objemové přetížení srdce:
 - podpora diurézy a natriurézy (protiklad účinku systému renin-angiotenzin-aldosteron)

Rozdělení NP

- ANP
- BNP
- CNP
- DNP
- VNP
- Urodilatin

Syntéza a sekrece BNP



Klinický význam

- Stanovení/vyloučení diagnózy srdečního selhání (ASS)
- Diferenciální diagnostika dušnosti
- Diagnostika objemové nebo tlakové zátěže myokardu (bolest na hrudi)
- Odhad prognózy a stratifikace rizika u nemocných se SS u AKS
- Monitorování efektu terapie SS


Metody stanovení

1. Referenční metoda – není k dispozici
CRM – není k dispozici
2. Rutinní metody
 - Imunoanalytické
 - luminometrická detekce (LIA, ILMA, CMIA, ECLIA)
 - fluorometrická detekce (MEIA, FPIA)

Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání

Jindřich Špinar, Petr Janský*, Jiří Kettner**, Ivan Málek**

Interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Brno, *Kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Motol,
**Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika



Příznaky CHSS

- **ÚNAVA A NEVÝKONNOST**

(snížená dodávka krve, kyslíku a živin metabolizujícím tkáním)

- **DUŠNOST**

(městnání krve v

Často u starší populace podceňovány, posuzovány „jako následek věku“ nebo přisuzovány jiným onemocněním

- **Periferní OTOKY**

(městnání krve na periferiích, zejména v oblasti kotníků)

Pomocná vyšetření:

- **ECHOKARDIOGRAFIE** s doplerovským vyšetřením
- **RTG srdce a plic**
- Pravostranná srdeční **KATETRIZACE** (zlatý standard s hodnocením plnících tlaků levé komory)
- Klidové **EKG**
- Selektivní **KORONAROGRAFIE**
- RADIOLOGICKÉ vyšetření (radionuklidová angiografie)

**Vyšetření jsou obtížně dostupná
a spojená s vysokými náklady**

- **LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ** □ NP a NT-proBNP

Novější markery

1. Markery tvorby aterosklerotických plátů
2. Markery systémového zánětu
3. Markery destabilizace aterosklerotických plátů
4. Markery nenekrotické ischémie
5. Markery nekrózy myokardu
6. Markery funkční výkonnosti myokardu
7. Markery hemokoagulační aktivity
8. Markery fibrinolytické aktivity

C-reaktivní protein (CRP)

- Protein akutní fáze zánětu (marker zánětu)
(Cyklický pentamér Mr=118 kDa)
- Název: schopnost precipitovat C-polysacharid pneumokoků
- Syntéza: v játrech vyvolaná zánětlivými cytokiny, zejména IL-6, méně v endotelu a jiných buňkách
- Vzrůst: 6-10 h po začátku zánětu, vrchol za 1-3 dny, zvýšení (až 500x) přetrvává 1týden i více
- U pacientů s AKS má prognostický význam

Klinický význam

- Marker zánětu
- Rozlišení bakteriálního a virového původu zánětu → napomáhá lékařům v terapeutickém rozhodování o nasazení antibiotické léčby
- Monitorování průběhu bakteriální infekce a efektu terapie


- Stanovení rizika rozvoje aterosklerotického procesu

< 1 mg/l	malé
1-3 mg/l	
> 3 mg/l	vysoké

Metody stanovení

1. Referenční metoda: není k dispozici
CRM: ERM-DA472/IFCC (2009)
2. Rutinní metody: **imunoanalytické**
Imunoturbidimetrie
Latexová imunoturbidimetrie
Zesílení imunoturbidimetrie pomocí částic
Zesílení imunonefelometrie pomocí částic
Chemiluminiscence
ELISA

cTnT „rychlý test“



POCT Kardiálních markerů

- Radiometer ATQ90 Flex
cTnI, cTnT, CKMB,
Myoglobin, NT-proBNP,
CRP



POCT Kardiálních markerů

- Roche cobas h 232

Troponin T, NT-proBNP, D-dimer,
CK-MB, Myoglobin



Děkuji za pozornost