


GIT III



Játra
Žlučník
Slinivka břišní

Játra /hepar/





- největší žláza lidského těla-1.5 kg
- přijímá jak venózní krev cestou v. portae (~75% krevního zásobení), tak arteriální krev cestou a. hepatica (~25%)
- je obklopena tenkou capsula fibrosa hepatis složenou z vaziva, které zesiluje v oblasti porta hepatis
- z porta hepatis vstupuje do jaterního parenchymu málo řídkého intersticiálního vaziva a nezřetelně ohraničuje jaterní lalůčky
- **funkce**
 - jako **exokrinní** žláza, protože secernuje žluč /kolem 1 litru/
 - detoxikace /léky, toxiny, hormony, produkty metabolismu - bilirubin/ - aER, peroxisomy
 - **endokrinní** – syntéza plazmatických bílkovin – albumin, fibrinogen, protrombin, lipoproteiny, cholesterol
 - zásobárna glykogenu a lipidů, vitaminů, Fe
 - syntéza glukózy, glukoneogeneze

Jaterní lalůček



Jaterní lalůček




šestiboký hranol o rozměrech asi 2,5 mm x 1 mm

Jaterní lalůček




trámčitý epitel



trámce hepatocytů




v. centralis



Hepatocyty a sinusoidy


- tvoří asi 80% buněk jater
- polygonální buňky (25-30 μm) s 1, 2 nebo 3 jádry s nápadnými jádérky
- bohatá organelová výbava
- kontaktní plochy tvořené mikrovláčky nebo hladké
- žlučové kanálky (kapiláry)
- **jaterní sinusoidy** /charakteristika!/
 - perisinusoidální prostor (Disse), perisinusoidální fibroblasty (strádání lipidů, vit.A)
 - Kupfferovy buňky – fixované makrofágy

žlučové kanálky



jaterní sinusoidy

Funkční a nutritivní oběh v játrech




v. portae → v. interlobularis → venula circumlobularis → **sinusoidy** → v. centralis

a. hepatica → a. interlobularis → arteriola interlobularis → **sinusoidy** → v. centralis


.....vv. sublobulares, vv. hepaticae, v. cava inferior

Játra – portální triáda






v. interlobularis
a. interlobularis
d. interlobularis

Glissonova triáda



Žlučové cesty

- žlučové kapiláry
- Heringovy kanálky (1-vrstevný plochý až kubický epitel)
- **interlobulární žlučovody** (v portobiliární oblasti – 1-vrstevný kubický epitel+vazivo)
- **lobární žlučovody** – (1-vrstevný cylindrický epitel +vazivo)
- **extrahepatické žlučové cesty**
 - ductus hepaticus dexter a sinister
 - ductus hepaticus communis
 - ductus cysticus
 - ductus choledochus
 - **stavba:**
 - sliznice
 - epitel /1-vrstevný cylindrický/
 - lamina propria /s mucinózními žlázkami/
 - fibromuskulární vrstva




extrahepatický žlučovod

epitel vystýlající žlučový systém neobsahuje pohárkové buňky, součástí sliznice není lamina muscularis mucosae

Žlučník

- sliznice
 - četné slizniční řasy /v prázdném žlučníku, v naplněném mizí/
 - **epitel** /jednovrstevný cylindrický s mikrokilky, produkce hlenu/
 - **lamina propria**
- tunica muscularis
 - prostorová síť hladkých svalových buněk
- serosa nebo adventicia


Gall Bladder H&E



Žlučník /vesica fellea/



Žlučník /vesica fellea/





Pankreas

- **vazivová složka**




- capsula fibrosa
- septa → laloky a lalůčky

- **žlázová tkáň**

- **exokrinní**
 - sekreční oddíly
 - vývodní cesty
- **endokrinní**
 - Langherhansovy ostrůvky



Pankreas




tubuloalveolární žláza (pankreatická šťáva - 1.5 l/denně - čirá, alkalická tekutina - trypsin, chymotrypsin, lipázy, amylázy..)



Pankreas

centroacinózní buňka



- **sekreční část (serózní aciny)**
 - serózní buňky
 - centroacinózní buňky
- **vývodní cesty**
 - vsunuté vývody
 - intralobulární vývody /**ne žíhané!!**/
 - interlobulární vývody
 - ductus pancreaticus maior /2-vrstevný cylindrický epitel+vazivo/
 - ductus pancreaticus accessorius



serózní buňka




Pankreas – Langerhansův ostrůvek




0.1 - 0.5 mm

0.75 - 1.5 milionu




↑ 12.1.2 Endokrinní pankreas – Langerhansovy ostrůvky, TEM



α-buňky (nebo A-buňky) obsahují granula s glukagonem, β-buňky (nebo B-buňky) obsahují granula s inzulínem. β-buňky jsou v ostrůvcích nejpočetnější (70 %), α-buňky tvoří asi 20 %. Aktivita α-buněk i β-buňky je řízena především hladinou glukózy v krvi.


V serózních buňkách exokrinního pankreatu se nacházejí velká sekreční granula s enzymy.

Pankreas – Langerhansův ostrůvek



myš - zelená-insulin,
červená-glukagon

- α-buňky - glukagon (15–20%)
- β-buňky – **insulin** a amylin (65–80%)
- δ-buňky – somatostatin (3–10%)
- PP-buňky (gamma buňky) – pankreatický polypeptid (3–5%)
- epsilon buňky – ghrelin (<1%)



mezidruhové rozdíly