

# GASTROINTESTINÁLNÍ SOUSTAVA

Mechanické a chemické zpracování potravy

Vstřebání a vyloučení produktů

Obrana vnitřního prostředí (toxiny, mikroby...)

Motilita GIT – nervové řízení

Sekrece GIT – humorální řízení

Transportní mechanismy, funkce jater

Motilita, sekrece, trávení, vstřebávání

+

## PARASYMPATIKUS


pregangliová cholinergní vlákna  
n.VII, n.IX, n.X, nn.pelvici (S2-S4)

-

## SYMPATIKUS

postgangliová adrenergní vlákna  
Th5-L2

(tonus a motilita –)  
(vasokonstrikce)  
(musc.mucosae, sfinktery +)



# ENTERICKÝ NERVOVÝ SYSTÉM

(pleteně + zakončení sympatiku a parasympatiku + další neurony GIT)

**Lokální (místní) reflexy**

**Centrální reflexy**

Chemoreceptory, mechanoreceptory,  
termoreceptory...  
(mucosa, musc. externa)

Řízení:

- motility GIT
- sekrece GIT
- vasomotoriky GIT

Mediátory a modulátory:

Ach, VIP, NOR, DOPA, serotonin, histamin, AT II, PG  
somatostatin, enkefalin, GABA, TRH, neuropeptid Y, substance P  
sekretin, GIP, glukagon, gastrin, CCK, G-releasing peptid


(Sekretinová skupina)

(Gastrinová skupina)

**Cirkulární svalovina:** inhibiční vlákna, kontrakce – střevo je delší a užší

**Longitudinální svalovina:** žádná inhibiční vlákna, kontrakce – střevo je kratší a širší

Stálý tonus  
S, PS



**SIGNÁLY DOPŘEDU: SPĚCHAT, UVOLNIT CESTU**

**SIGNÁLY DOZADU: ZPOMALIT, UZAVŘÍT CESTU**

# ELEKTROFYZIOLOGIE GI HLADKÉHO SVALU

Klidové napětí:

od -40 do -80mV ( $\uparrow$  gNa  $\downarrow$  gK)

Nižší aktivita Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATPázy

Pomalé vlny (oscilace klid.MN)

3 (žal.) – 12(duod.)/min – **bazální elektrický rytmus**

Hrotitý potenciál

nízká voltáž, depolarizace – Na<sup>+</sup> a Ca<sup>2+</sup>, 1-10/sec

Pacemakerové buňky

automacie


Variabilita

neurohumorální regulace

Inervace: nexy, inervace cirkulární svaloviny >> longitudinální svaloviny

Bez nervosvalové ploténky

Ach, ENS, výjimky



Modulace pomalých vln – amplituda, méně frekvence



Pohyby (střevo):

- Segmentační: D - 12/min, J – minutový rytmus
- Peristaltické

# MOTILITA GIT

## KONTRAKCE

**tonické** (žaludek, tračník)

**rytmické**

## POHYBY

**propulzivní** (peristaltika, myenterický reflex)


**mísící**

**Receptivní relaxace.**

# POLYKÁNÍ


- Orální fáze (volní)
- Faryngeální fáze (reflexní)<1s
- Ezofageální fáze (peristaltická)

Potrava – žvýkání (volní i reflexní)  
Sliny (1.5 litrů / den)  
Frekvence polykání asi 600x / den



Achalázie (kardiospasmus)  
Gastroezofageální reflux

# MOTILITA ŽALUDKU



Reflexní relaxace dolního sfinkteru



Receptivní relaxace fundu a těla  
(X. – VIP) (Laplace:  $P = T \cdot R$ )

Pacemakerová zóna (3/min)

Motorický gradient  
( $F \lll A$ )

Migrující myoelektrický komplex  
(hladové stahy)

1-2 hod: klid

10-20 min: aktivita, v hladu zesiluje

Vrstvení tráveniny

**PYLORUS = sfinkter ???**

společný ENS s bulbus duodeni


hladký sval

sympatikus +++, n.X. --- (VIP)


N. vagus +

Plexus caelicus -

# VYPRAZDŇOVÁNÍ ŽALUDKU



# ZVRACENÍ (OBRANA)






- Antiperistaltika jejunu a duodena
- Relaxace pyloru a antra
- Kontrakce bránice (zvýšený nitrobřišní tlak)
- Obrácený „Valsalva“ (snížený nitrohruční tlak)
- Kontrakce pyloru a antra
- Relaxace kardiie
- Relaxace horního faryngeálního svěrače

Emetika: centrální  
periferní

Antiemetika

# MOTILITA TENKÉHO STŘEVA

- Pomalé vlny – zhruba 11-13/min v duodenu, 8-9 v ileu
- Minutový rytmus (jejunum) – salvy zhruba po 1 min
- Hodinový rytmus (migrující motorický komplex, **MOTILIN**)




Segmentární motilita >>> peristaltika (do 10 cm)

PS

## MOTILITA TLUSTÉHO STŘEVA

- Pomalé vlny s frekvencí 4-6/min
  - Segmentace = **haustra**; 5-10 cm/hod – **kývavé pohyby**
  - **Masová** peristaltika; 1-3/den – „úklid“
  - **Reverzní** peristaltika – prox. colon („zdržení“ – resorpce vody a solutů)
  - Kontrola análního sfinkteru: int. – reflexní, ext. – volní (+reflexní)
  - Defekace: abdominální svaly +++, svaly pánevního dna –
  - Reflex: kolono-kolonický, gastro-kolický
- Parasympatikus + (X. po FL)
  - Sympatikus – (L2 – L4)





# GI REFLEXY

Superponovány na bazální tonus

PS a S (sfinktery S PS) R. dolního esofagu

Reciproční funkce long. a cirk. svalu

Inervace jen cirk. svalu


Motilitu zvyšuje:

- CCK
- Substance P
- Gastrin

Masová peristaltika

Haustrace, segmentace

Reverzní peristaltika



Pylorický r. (X.)

PS a S

Enterogastrický r.  
(chemoreceptory)

Kolono-ilický r. (+)

Kolono-kolonický r.

Volní kontrola

Polykací r.

Lokální r.

Receptivní relaxace fundu (X.)

bolus

Intestino-intestinální r.  
(distanze)

2-4 hod

Gastro-ilický r.

10-20 hod

Gastro-kolický r.

R. vnitřního análního  
sfinkteru

Volní kontrola