

Nutriční podpora nemocných, psychologická podpora nemocných

Dietní systém

Možnosti dietní podpory

Sondová, parenterální výživa

Psychologická problematika

Možnosti dietní podpory

- při poklesu příjmu potravy pod $\frac{1}{2}$ denní dávky
 - dieta č. 14 -výběrová
 - výživná mléka – sipping
 - obohacená o energii, minerály, vitaminy, stopové prvky
 - po 250 ml
 - celkem 2 l stačí k úhradě celodenní potřeby

Sondová výživa

- sonda - měkké materiály, dobrá tolerance nemocnými
 - nasogastrická, PEG – pro mixovanou stravu nesterilní
 - nasojejunální – pro definovanou stravu, strava splňuje kritéria léčiva, sterilní
- úskalí – u neutropenických nemocných po chemoterapii

Parenterální výživa I

- podpůrná
- při zachování částečného p.o. příjmu a neúspěchu nebo nemožnosti p.o.podpory
- cíl - dodávka energie, bílkovin, tuků, tekutin
- obvykle do periferní žíly, není třeba koncentrovaných roztoků (do 20% G a 20mmol/l K+)

Parenterální výživa II

- kompletní
- komponenty
 - cukry – 4g/kg a den
 - aminokyseliny – 1g/kg a den
 - tuky – 1g/kg a den
 - vitaminy - A,B,C,D,E,K,P-P atd.
 - minerály - Na, K, Cl, Ca, P, Mg
 - stopové prvky – Fe, Se, Co, Zn, Cu, Mn

Parenterální výživa III

- dodávka energie – 30 kcal /kg a den
- při převaze cukrů odbourání na CO₂, zatěžuje dýchání
- při převaze bílkovin nadměrná produkce NH₂ skupin – zatěžuje ledviny a játra
- tuky – minimální dodávka při septických stavech

Parenterální výživa IV

- **roztoky**
- glukóza – 5,10,20,40% - dle stavu hydratace a kardiální kompenzace
- aminokyseliny – 4,5,8,10%
- tuky 10,20% - MCT
- minerály – NaCl 10%, KCl 7,5%, Ca gluc. 10%, K₂HPO₄ 6,8%, MgSO₄ 10,20%
- 1ml = 1-2mmol
- vitaminy – Multibionta, Vitalipid – i.v., možno hradit i i.m.
- stopové prvky – Addamel, Tracutil ...

Příklad parenterální výživy

- nemocný o hmotnosti 70kg – potřeba energie min. 30kcal/kg/den = 2100 kcal/den
- glukóza 20% 2000ml – 1200kcal
- aminokyseliny 8% 1000ml – 240kcal
- tuky 20% 500ml – 700kcal
- minerály – Na^+ 100mmol, K^+ 50mmol, Ca^{2+} 20mmol, PO_4^{2-} 20mmol, Mg^{2+} 20mmol
- Multibionta
- Addamel

Dietní systém I

- **0** – nic per os (operační den, akutní pankreatitidy)
- **0S** – čaj (první den po operacích na GIT, krvácení do GIT)
- **1** – tekutá (energeticky neplnohodnotná, na přechodnou dobu)
- **2** – šetřící (floridní ulcer, gastritida po odeznění akutní fáze)
- **3** – racionální strava

Dietní systém II

- **4** – s omezením tuků (onemocnění jater, slinivky břišní, žlučníku)
- **4S** - s vyloučením tuků (akutní stav)
- **5** – bezezbytková – kolitická (floridní fáze zánětlivých střevních onemocnění)
- **6** – s omezením bílkovin 50 g denně (renální insuficience)
- **S35** – Addisova – 35g bílkovin na den
- **S20** – Giordano-Giovanetti – 20g/den

Dietní systém III

- 7 – nízkcholesterolová
(hyperlipidémie, kardiovaskulární choroby)
- 8 – redukční 1850 kcal = 7560 J
- 8S – přísná redukční 1200kcal = 5040J
- 600 – nejpřísnější – 600kcal = 2520J
- 9 – diabetická s udáním množství glycidů (150,200,250g/den)
- 9S – diabetická s omezením tuků

Dietní systém IV

- 10 – neslaná (hypertenze, kardiální dekompenzace – nemocní dlouho nedodržují)
- 11 – výživná (po TBC, po těžkých infekcích, nemocní s nádory)
- 12,13 – diety dětského věku
- 14 – výběrová
- 15 - vegetariaňská

Psychologická podpora nemocných

I

- **přijetí k hospitalizaci**
 - orientace v prostoru
 - orientace v osobách
 - orientace v postupu
- **sdělení diagnózy**
 - fáze boje – zhoršení nálady, konflikty se spolupacienty, s rodinou, nespokojenost s personálem
 - fáze popření – nemocný se chová, jakoby io diagnóze nevěděl, plánuje blízkou budoucnost

Psychologická podpora nemocných

II

- **fáze smlouvání** – namlouvá si, že jde o omyl, požaduje další doplňující vyšetření, odkládá procedury, obrací se na léčitele
- **fáze smíření** – konkrétní podoba boje s chorobou, požaduje reálné informace hlavně z hlediska prognózy a svého dalšího života, zařizování v zaměstnání, zabezpečení rodiny

diagnózu zná nejprve nemocný, on sám rozhodne, kdo další bude informován a jak

Psychologická podpora nemocných

III

- **léčba choroby – příznivé období, postupné zlepšování, zvládání komplikací motivováno možným příznivým výsledkem**
- **relaps onemocnění – ubírá duševních sil, pocity beznaděje, situace je dobrá, pokud máme co nabídnout**

Psychologická podpora nemocných

IV

- pokud nemáme další možnosti, je situace stejná jako v terminálním stadiu – paliativní péče
- cílem paliativní péče je
 - zmírnění utrpení
 - udržení kvality života nemocného na dobré, nikoli snesitelné úrovni
- při zhoršování stavu neváhat s použitím opiátů – adekvátní dávkování

Ošetřující personál

- náročné postavení – blízké vztahy s nemocnými i jejich rodinami
- trauma při fatálním zakončení
- syndrom vyhoření
- značná fluktuace personálu

**Děkuji za pozornost a přeju
hodně štěstí u zkoušky**

