




FYZIOLOGIE VIDĚNÍ



Zrak – nejdůležitější smysl,
u člověka 80% informací přicházejících z vnějšího prostředí
pro zpracování v CNS je získáno prostřednictvím zraku


CNS zpracovává odlišné druhy zrakové informace současně
(simultánně) a okamžitě pomocí paralelních subsystémů
zrakové dráhy – na rozdíl od akustické informace, která je
Zpracovávána postupně (sukcesivně)

Oko: optické (rohovka, komorová tekutina, čočka, sklivec)
a nervové elementy (sítnice)





Pupilární reflex (zúžení a rozšíření zornice)

- neuronální dráha začínající v sítnici – n.opticus
- oddělení do pretekální oblasti k jádru okohybnných nervů- Edinger-Westphalovo jádro
- jako vlákna ANS –končí: m.sphinkter-m.dilatator pupillae





B. Oko: akomodace na dálku (1) a na blízko (2)





Světločivné elementy: tyčinky a čípky



Obsahují zrakové pigmenty, které se působením světla chemicky rozkládají.

Základ: sloučenina bílkovin opsinu a retinenu (derivát vit.A), působením světla pigment bledne, ruší se vazba mezi opsinem a retinenem. Rozpad pigmentu=nervový vzruch=akční potenciál v ganglionových buňkách sítnice. Působením vit.A se vazba obnovuje. Nedostatek vit.A- šeroslepost (nyktalopie)




FIGURE 12-12 Effect of light on current flow in visual receptors. In the dark, Na^+ channels in the outer segment are held open by cGMP. Light leads to increased conversion of cGMP to 5'-GMP, and some of the channels close. This produces hyperpolarization of the synaptic terminal of the photoreceptor.

Ve tmě jsou sodíkové kanály drženy otevřené působením cGMP, Proud teče od vnitřního segmentu k zevnímu světlu kanály uzavírá – hyperpolarizace synaptických zakončení

Phototransduction: mechanism

Opsin + retinen1

Zrakový pigment v tyčinkách


=rhodopsin,

Jeho opsin=skotopsin

V etně je retinen1 v rhodopsinu

Ve formě 11cis- světlo přemění

Na all-trans izomer



1. Absorption of a photon isomerizes retinal


- a) Converts opsin to metarhodopsin II
2. Metarhodopsin II activates the G-protein transducin
 - a) Activates cGMP phosphodiesterase (PDE)
 3. PDE hydrolyzes cGMP to GMP
 - a) Decreased [cGMP] closes cGMP gated cation channels
 - b) Photoreceptor hyperpolarizes, less glutamate released

fosfodiesteráza katalyzuje cGMP-5 GMP, uzávěr cGMPkanálů-hyperpolarizace-snížené uvolňování synapt.mediátoru-odpověď bipolárních buněk

RETINA

Its organized on layers
Visual receptors+4types of neurons.
Many different synaptic transmitters

- Pigment epithelium
 - Absorbs light rays, prevention the reflection of rays back through the retina
 - Contains melanin to absorbs excess light
 - Stores Vitamin A
 - Photoreceptors
 - Transduce light energy into electrical energy
 - Rods and cones
 - Ganglion cells
 - Output cells of retina project via optic nerve
- Bipolar cells – 12 different types occur
- Horizontal cells
- Amacrine cells - 29types have been described
- The neural elements of retina are bound together by glial cells – Muller cells




Periphery of retina

- High degree of convergence → large receptive field
- High sensitivity to light, low spatial resolution

Fovea

- Low convergence → small receptive fields
- Lower sensitivity to light, high resolution (visual acuity)





Receptive fields


□ On-center/off-surround

- Light shines on center of ganglion cell receptive field → ganglion cell increases AP firing
- Light on surround region → decreased AP firing

□ Off-center/on-surround

- Light on center → decreased AP firing
- Light on surround → increased AP firing





Tyčinky a čípky reagují na světlo hyperpolarizací

Horizontální buňky - hyperpolarizací


Bipolární buňky hyperpolarizací nebo depolarizací

Amakrinní – depolarizační potenciály a hroty typu generátorového potenciálu sloužící pro vznik AP v gangliových buňkách


Colour Vision

- 3 types of cones, each contain photopigment with different absorption spectra
 - 420 nm - blue
 - 530 nm - green
 - 560 nm - red
- Colour interpreted by ratio of cone stimulation
 - Orange (580nm) light stimulates:
 - Blue cone - 0%
 - Green cone - 42%
 - Red cone - 99%
 - 0:42:99 ratio of cone stimulation interpreted by brain as orange


Vnímání barev je dáno poměrem frekvence vznuků ve 3 systémech čípků





Guyton Figure 50-8



C. Aditivní míšení barev




D. Absorpce světla rodopsinem




Binokulární vidění



- Okohybné svaly – společná jednotka
- Funkce obou očí – kyklopské oko
- Fixujeme-li předmět a jiný je blíže – heteronymní diplopie (vidíme jej zkříženě a dvojitě)
- Fixujeme-li předmět a jiný je dále – homonymní diplopie



A. Binokulární zorné pole




B. Kružnice horopteru




Hloubkové vidění - stereoskopické

- Vzniká transformací trojrozměrného prostoru na dvojrozměrný v receptorech sítnice
- Teorie vysvětluje toto vidění projekcí předmětů na tzv. korespondující a nekorespondující body sítnice
- Korespondující – to jsou ta místa kam je promítán obraz bodu fixovaného foveou – tyto body definují horopter (množina všech bodů v prostoru, jejichž obraz dopadá na korespondující místa)
- Geometrická approximace – horopterová kružnice
- Fúze (splynutí obrázků obou očí v jeden prostorový)




Střední ucho – zabezpečuje převod akustických signálů vzduchem

Vnitřní ucho – místo receptorů




Eust.tr.-vyrovnaní vzdušného tlaku ve středouší s vnějším barometrickým, normálně je uzavřená




Struktura vláskové buňky

Laterálnim pohybom vláskov se dráždí receptor
– receptorový potenciál


Kostěné a blanité struktury vnitřního ucha








Intenzita zvuku se kóduje jako amplituda receptorového potenciálu, v dostředivých vláknech
Jako frekvence AP; vyjádření v decibelech

Výška tónu s frekvencí (počtem vln/čas)










Chemoreceptory čichové sliznice

- Drážděny látkami, které se rozpustí v nosovém hlenu,
- plocha 5 cm^2
- Fylogeneticky nejstarší smysl
-
- Henningova klasifikace pachů:
- Květinový, ovocný, živicový,
- Kořenitý, hnilec, spáleninový
-
- Citlivý smysl
- (metylmerkaptan=česnek- $400\text{pg}/1 \text{ l vzduchu}$)
- receptory se rychle adaptují
- Hypoosmie –anosmie -hyperosmie

Poznámka: nervová zakončení vláken n.trigeminus – čpavek, mentol, chlor-spouští se reflexní odpovědi na dráždivé látky – zastavení dýchání, kýchání, slzení



Chuťové pohárky a chuťové chemoreceptory

drážděny chuťovými látkami rozpuštěnými ve slinách

Chuťové receptory v pohárkách na sliznici jazyka, epiglottis, patře a faryngu

Vejcovitý tvar, 50-60 mikrom, 40 vlastních chuťových Receptorů=vláskové buňky přečnívající do ústní dutiny
Afferentní vlákna přiléhají na spodinu chuťové buňky (50 vláken na 1 pohárek)

Základní chutě: sladká (hrot jazyka)-slaná (zadní okraje)
-kyselá (přední okraje)-hořká (kořen jazyka)

Návrh na 5.typ: umami

