

# Ošetrovatelský proces u pacienta se salmonelózou

*Seminární práce do předmětu Ošetrovatelství  
a Odborná praxe v neodkladné péči a složkách IZS*

**Student:**

Semestr: 2., prezenční studium

Vyučující: Mgr. Liana Greiffeneggová

## **OBSAH**

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | ANAMNÉZA .....                         | 3 |
| 2 | STRUČNÁ PATOFYZIOLOGIE ONEMOCNĚNÍ..... | 3 |
| 3 | OBLAST VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ .....            | 4 |
| 3 | ÚROVEŇ SEBEPÉČE.....                   | 4 |
| 4 | VÝŽIVA A METABOLISMUS .....            | 5 |

## 1 ANAMNÉZA

Anamnézu jsem sepsala s pacientem oddělení Kliniky infekčních chorob. Jde o 52letého muže, který pracuje jako stavební inženýr u velké firmy. Je svobodný, bezdětný, žije ve středně velkém městě, společně s matkou.

Pořadí hospitalizace: 1.

Hospitalizován(a) \_\_\_\_ dnů

Obvod hrudníku:

Výška:

Obvod pasu:

Tělesná hmotnost:

Obvod hlavy:

Celkový dojem: pacient je klidný, hovorný, spolupracuje, mluví pomalu, srozumitelně, je upravený, čistý. V průběhu sepisování anamnézy se ptal na některé věci týkající se jeho onemocnění a hospitalizace.

**Lékařská diagnóza:** salmonellosis ac.

## 2 STRUČNÁ PATOFYZIOLOGIE ONEMOCNĚNÍ

Salmonelóza je označení pro akutní průjmová bakteriální onemocnění způsobovaná netyfoidními bakteriemi rodu *Salmonella*. Jedná se o velmi hojné onemocnění. V ČR je ročně hlášeno několik desítek tisíc případů (např. r. 2006 to bylo 25 102 případů).

Přenáší se obvykle alimentárně, tedy nakaženou potravou nebo kontaminovanou vodou, u dětí také fekál-orálně. Často onemocnění u lidí propuká po konzumaci nedostatečně tepelně upraveného kontaminovaného masa a vajec, případně výrobků obsahujících tyto suroviny, kontaminovaných při nesprávné manipulaci a nedodržení hygienických postupů.

Inkubační doba je 6-48 hodin. Projevuje se zejména průjmy - někdy i 20-30× denně s kolikovitými bolestmi, často též zvracením, horečkou a bolestmi hlavy. Taktéž se může následně dostavit dehydratace. Průjmy trvají v závislosti na formě salmonelózy, stejně tak horečky.

Při léčbě není obvykle vhodné podávat antibiotika. Doporučuje se hodně pít, jíst lehké potraviny, podávat živočišné uhlí, Endiaron, pro děti je vhodné aplikovat formou sáčků Santax anebo také obsah WHO roztoku. Ošetřovací doba je cca 7-14 dní, poté příznaky samy odezní.

U některých lidí může salmonelóza přetrvávat ve žlučových cestách. Při dlouhodobé nákaze salmonelózou se nemoc může stát chronickou a způsobit poškození jater, ledvin a podobně.

### **3 OBLAST VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ**

Ošetřovatelské diagnózy aktuální:

1) Dg.:

Určující znaky:

2) Dg.:

Určující znaky:

3) Dg.:

Určující znaky:

Ošetřovatelské diagnózy potenciální:

1) Dg.:

Určující znaky:

2) Dg.:

Určující znaky:

3) Dg.:

Určující znaky:

### **3 ÚROVEŇ SEBEPÉČE**

Ošetřovatelské diagnózy aktuální:

1) Dg.:

Určující znaky:

2) Dg.:

Určující znaky:

3) Dg.:

Určující znaky:

Ošetřovatelské diagnózy potenciální:

1) Dg.:

Určující znaky:

2) Dg.:

Určující znaky:

## 4 VÝŽIVA A METABOLISMUS

Ošetrovatelské diagnózy aktuální:

4) Dg.:

Určující znaky:

5) Dg.:

Určující znaky:

6) Dg.:

Určující znaky:

Ošetrovatelské diagnózy potenciální:

3) Dg.:

Určující znaky:

**Následující text vymažte!**

- Zpracujte postupně všechny oblasti „Anamnézy“
- Pracujte podle NANDA diagnostiky (použijte Ošetrovatelské diagnózy v NANDA doménách od autorky Marečkové)
- **U jedné vybrané oš. dg. zpracujte intervence**
- Jako přílohu vložte oskenovanou anamnézu
- Po dokončení práce aktualizujte obsah
- Práci odevzdejte podle pokynů na plánu praxe, vytištěnou, na katedru PA (Komenského 2).

