

Poruchy primární hemostázy

P. Smejkal

Hemostáza

- Primární
 - trombocyty
 - cévní stěna
 - adhezivní proteiny
- Sekundární
 - prokoagulační faktory
 - inhibitory koagulace
- Fibrinolytické mechanismy
 - aktivátory
 - inhibitory

Krvácivé projevy u poruchy prim. hemostázy

- **Krvácení potraumatické, perioperační
(okamžitě)**
- **Slizniční**
- **Petechie**
- **Hematomy**

Vyšetření primární hemostázy I


Základní vyšetření:

- počet trombocytů (MPV), aPTT, PT, fibrinogen

Globální testy prim. hemostázy:

- PFA - 100
- doba krvácení: - Duke
 - Ivy (Simplify R)
- Rumpel - Leedeho test
- trombelastograf (ROTEG)

PFA – 100 (schéma)



PFA – 100 (closure time = CT)

- kolagen / epinefrin (94 – 193 s)
- kolagen / ADP (71 - 118 s)

Závisí na:

- počtu trombocytů (<100)
- funkci trombocytů
- VWF
- Ht (<30%)
- afibrinogenemii

Nezávisí na:

- koagulačních faktorech (VIII, IX, XI)
- kumarinech
- heparinu


Vyšetření primární hemostázy II (specifická)

- adhezivita: - *in vitro* – dle Salzmana
- retrakce
- VWF:RCo
- ověření počtu a morfologie trombocytů (MPV)
- agregace
- imunofenotypizace
- elektronová mikroskopie
- DF 3

Agregace trombocytů – indukce kolagenem

FN Brno

OKH



Agregace

Date	Time	First name	Last name	Pat.#	Test	Remark	Channel	Agg. Max [%]	Agg. Inclination [%/min]	Agg. LagPhase [s]
05.10.2017	09:49:52			-	Kollagen 2 µg/ml		4	78.49	85.81	44.6

Vyšetření destiček na flowcytometru

Glykoproteiny:

- IIa = CD 61
- IIb = CD 41
- Ib α = CD 42b

Markery aktivace:

- * P-selectin = CD 62P

Imunologické stanovení počtu destiček (CD41)

Retikulované trombocyty (obarvení mRNA)

Defekty primární hemostázy - cévní stěny (dědičnost autosomálně dominantní)

- **Hemangiomy** (Kasabach-Merritt syndrom)
Telangiectázie (Rendu-Osler-Weber syndrom = HHT) **(AD)**
Ehler-Danlos syndrom (AD)
 - cévní **fragilita**, hyperelastičnost, hypermotilita, prominující bulby, malý nos a rty
 - dg: elektroforéza kolagenu z kultury fibroblastů
- **Marfanův syndrom (AD)**
 - dlouhé končetiny, prsty, aneuryzmata, subluxace čočky

Defekty primární hemostázy - cévní stěny (získané)

Henoch-Schönleinova purpura

- **vaskulitida – poškození imunokomplexy**
- **alergie – infekční agens, potraviny, léky**
- postižení:
 - kůže
 - sliznice GIT
 - kloubů
 - močových cest
- pozitivní Rumpel-Leedeho test
- léčba vyvolávající příčiny (+kortikoidy)

Defekty primární hemostázy - cévní stěny (získané)

Steroidní purpura:

- změna struktury kolagenu (inhibice mRNA)
- tvorba sufuzí
- obdobou je senilní purpua

Skorbut:

- porucha tvorby kolagenu
- krvácení
 - perifolikulární
 - z dásní

Poruchy trombocytů

Odchylka počtu:

- **trombocytopenie**
- **trombocytóza (trombocytémie)**

Trombocytopatie:

- **ve smyslu hypofunkce**

Trombocytopenie - etiologie

- pseudotrombocytopenie v EDTA (15-20%)
- destičkový satelitismus
- získané (sekundární)
 - protilátkové
 - ostatní
 - zvýšený zánik v periferii
 - snížená produkce
- vrozené (primární)

Trombocytopenie hereditární - klasifikace

- **velikosti trombocytů**
- **typ dědičnosti**
- **přidružené abnormality**
- **funkčního defektu trombocytů**
- **mutace**

Velikost trombocytů

- MPV < 7 fl
 - **Wiskott-Aldrich**
 - X-vázaná trombocytopenie
- MPV = 7-11 fl
 - **TAR (trombocytopenie s aplazií radia)**
 - kongenitální amegakaryocytárni trombocytopenie
 - dědičná trombocytopenie s predispozicí k AML
 - AD trombocytopenie s vazbou na chromosom 10
- MPV > 11 fl
 - **nejčastější**

Typ dědičnosti

- většina autosomálně dominantní
- autosomálně recesivní
 - TAR
 - Bernard-Soulier sy
- X-recesivní
 - Wiskott-Aldrich sy

Přidružené abnormality

- MYH 9 (Fehtner sy, Epstein sy, APSM)
- TAR (trombocytopenie s aplázií radia)
- dědičná trombocytopenie s predispozicí k AML
- X-vázaná trombocytopenie s dyserytropoезou
- Paris-Trousseau (Jacobsen) sy
- velokardiofacial sy

Hereditární makro - trombocytopenie I

- Bernard-Soulier (AR, fu – P: ristocetin)
 - defekt GPIb/IX/V
- Gray platelet sy (AD, fu – P: ADP, kolagen, trombin)
 - agranula malá, prázdná, vakuolizace MGK, myelofibroza
- Destičkový typ von Willebrandovy choroby (AD, fu – P)
 - agregace po ristocetinu $< 0,5 \mu\text{g}/\text{ml}$
 - agregace po VWF bez ristocetinu (dif. dg. M.VW 2B)
 - defekt GP Ib
- May-Hegglin anomálie (AD, fu - N)
 - Döhleho inkluze leukocytů (1 v buňce)




Hereditární makro - trombocytopenie II

mutace MYH9 – gen pro nesvalový myosin Ila

porucha distribuce uvnitř buněk myosinu a tubulinu

- **May-Hegglin anomálie** (AD, fu - N)
 - Döhleho inkluze leukocytů (1 v buňce)
- **Epstein sy** (AD, fu – P: ADP, kolagen)
 - inkluze detekovatelné pouze **imunohistochemicky**
 - glomerulonefritis, hluchota, katarakta
- **Fechtner varianta** (AD, fu – N)
 - více leukocyt. inkluzí (dif. dg. M-H, CH-H)
 - glomerulonefritis, hluchota, katarakta
- **Sebastian varianta** (AD, fu – N)
 - více leukocyt. Inkluzí
 - mohou být detekovatelné pouze **imunohistochemicky**
 - bez přidruženého defektu

Döhle-like inkluze + makrotrombocyt



Hereditární normo - trombocytopenie amegakaryocytární

- TAR – trombocytopenie s aplázií radia (AR, fu – P: kolagen, epinefrin)
- Fanconiho anemie (AR, fu - ?)
 - cytopenie, pigmentace, hypoplasie – skeletu, očí, ledvin, mentální retardace
 - instabilita chromozomů (minim. 5 genů)
- dědičná trombocytopenie s predispozicí k AML (AD,fu- N/P: kolagen,epinefrin)
 - defekt genu CBFA2 (AML1)
 - TH: SCT (vyloučit u sourozeneckých dárců)
- famil. trombocytopenie (AD, fu- N/P: kolagen,epinefrin)

Hereditární normo – trombocytopenie I

Glanzmannova trombastenie, defekt GP IIb/IIIa (AR):

- patol. retrakce
- typ I: - defekt FBG v α gr.
- II: - norm. FBG v α gr. (norm. retr.)
- III: - GP IIb/IIIa přítomen, funkční defekt
- norm. adhezivita
- GP IIb/IIIa < 5%
- GP IIb/IIIa > 10%

- Scott syndrom: (AR)
- porucha transportu PS ze vnitřní na vnější stranu
- patol DF3, KT, snížení vazby FVa, Xa

Hereditární normo - trombocytopenie II

Defekt δ granulí: (fu - P: kolagen, epinefrin, ARA , ADP)

- Heřmansky-Pudlák (AR)
 - HPS protein – fu při vzniku organel, **defekt lysozomů**
 - **okulokut. albinismus**, pigment v makrofázích
 - plicní fibroza, střevní onem.
- Chediak-Higashi sy (+trombocytopenie) (AR)
 - CHS protein – hydrofobní, fu v membránách, **defekt lysozomů**
 - **okulokutánní albinismus**, infekty, lymfoproliferace
 - **Chediak-Higashi granula POX pozit**

Hereditární mikro - trombocytopenie

- Wiskott-Aldrich (XR, fu – P: ADP, kolagen, trombin)
 - defekt WASP
 - přenos signálu IC
 - regulace cytoskeletu
 - lymfopenie až od 6 let
 - \downarrow IgM \uparrow IgA, IgE
 - MPV 3,8 – 5,0 fl (7,1 – 10,5) $\varnothing 1,8 \pm 0,12 \mu\text{m}$ (2,3 \pm 0,12)

Hereditární trombocytopenie

Defekt:


- membrány: Bernard-Soulier, Glanzmann, dest. typ vWCh,
- δ granulí: Heřmansky-Pudlák, Chediak-Higashi sy, Wiskott-Aldrich (může být i defekt α granulí)
- α granulí: Gray platelet sy,
- enzymů: COX, LPO, TXS
- signální defekty: mobilizace ARA, Ca, aktivace G proteinu, fosforylace

Porucha:

- adheze
- aktivace
- sekrece
- agregace
- prokoagulace

Hereditární

trombocytopenie



Získané trombocytopenie: zvýšený zánik v periferii na podkladě protilátek

- autoprotilátky:

- ITP: - imunokomplexy (akutní)
 - protilátky (chronická)
- HIT II: proti komplexu PF4+heparin
- antifosfolipidový sy – protilátka proti β 2GP1, který se váže i na povrch trombocytů, může být trombocytopenie

- aloprotilátky:

- » novorozenecká
- » potransfúzní

Získané trombocytopenie: zvýšený zánik v periferii neimunitní etiologie

- hypersplenismus – redistribuce
(doprovází hepatopatie)
- DIC
- trombotické mikroangiopatie
 - TTP, HUS, MAHA
- HIT I
- diluce

Získané trombocytopenie: snížená produkce

- toxicke vlivy:
 - chemické
 - léky (kombinace s protilátkami)
 - infekce (kombinace s protilátkami)
 - aplastická anemie (kombinace s protilátkami)
- infiltrace dřeně malignitou:
 - solidní TU, leukemie
 - lymfoproliferace (kombinace s protilátkami)
- deficit folátů a B 12

Heparinem indukovaná trombocytopenie HIT

HIT –typ I:

- přímý proagregační efekt heparinu, trombocyty $>100 \times 10^9/l$

HIT - typ II:

- komplex heparin-PF4-protilátka reaguje s destičkovým Fc receptorem a vyvolá uvolňovací reakci
- předpokládá se, že se jedná o genetickou odchylku Fcg-IIa destičkového receptoru
- výskyt 4. - 10. den po nasazení heparinu
- počet trombo často $< 60 \times 10^9/l$
- důležitější je relativní pokles - o 50% HIT 2 vysoce pravděpodobné
- u 50% nemocných paradoxní trombózy - označováno HITT

HIT - typ 2 – diagnostika a léčba

- laboratorně (+ klinicky vyloučení jiné příčiny, event. trombóza):
 - pokles trombocytů - o 50%
 - agregace trombo - nízká senzitivita, vysoká specifita
 - ELISA pro komplex heparin-PF4 protilátky
 - nejvhodnější sledov. uvolnění 14C-serotoninu
 - cytoflowmetrie - IgG/M asociované s trombo
 - » - vysoká senzitivita, nízká specifita
- léčba:
 - zkřížená reaktivita mezi UFH a LMWH udávána i ve více než 60%; nejnižší je udávána u Fragminu (cca 25%)
 - Argatroban (inhibitor IIa),
 - Danaparoid (může být zkřížená reaktivita)
 - Arixtra (oligosacharid s anti-Xa) (nelze vyloučit zkříž. reakt.)

Terapie trombocytopenií / peníí

- **trombokoncentrát:**

$< 10 \times 10^9 / l$

$< 20 \times 10^9 / l$ - rychlý pokles, jiná rizika

$< 50 \times 10^9 / l$ - operace, krvácející, AML M3

$< 80 - 100 \times 10^9 / l$ - operace CNS, oční

- Kl: TTP, HUS, HIT II

- **zohlednit:** - koagulogram (fibrinogen)

- je-li trombocytopenie

- klin. stav - krvácení

- rychlosť poklesu

- **trombopoetin a jeho analoga (kratší peptidy)**

Trombocytóza

Získané:

- **reaktivně:**
 - infekty, nádory, záněty, stres
 - po splenektomii
 - následkem krvácení
 - při sideropenii
- **esenciální trombocytémie:**
 - klonální myeloproliferace
- **doprovází i ostatní myeloproliferace:**
 - CML, myelofibrózu, polycytémii vera

Vrozené:

- extrémně vzácné