

# Endokrinologická onemocnění

Vyšetřovací metody v endokrinologii

Hypotalamo-hypofyzární systém

Hormony předního laloku hypofýzy

Onemocnění z postižení hypotalamu

Nádory hypofýzy

Hyperpituitarizmy

Diabetes mellitus

# Anatomicko-fyziologické poznámky

- ❖ hormony – látky ovlivňující i tkáně vzdálené od místa tvorby, dopravovány krví
- ❖ zpětná vazba – dlouhá, krátká, ultrakrátká
- ❖ časové vztahy – většinou 24 hodinové cykly
- ❖ účinek prostřednictvím receptorů
- ❖ možnost neúčinnosti – receptor není
  - PL proti receptoru
  - poruchy regulace

# Anatomicko-fyziologické poznámky

- ❑ vazba na receptor spustí další řetězec – druhý posel – cAMP
- ❑ hyperfunkce, hypofunkce
- ❑ primární – postižení cílové žlázy
- ❑ sekundární – postižení hypofýzy
- ❑ terciární - postižení hypotalamu


# Vyšetřovací metody v endokrinologii

- nepřímé známky – reflex Achillovy šlachy, hladina cholesterolu, LD
- přímé stanovení hladin hormonů – přesnější, ale nutné opakované vyšetření během dne – respektování rytmů
- stimulační testy – pomocí ACTH, TSH
- supresní testy – podání hormonů cílové žlázy sníží její aktivitu
- měření bazálního metabolizmu
- akumulace jódu

# Hypotalamo-hypofyzární systém I

- hypotalamus – v oblasti třetí komory mozkové v přední části diencefala
- v blízkosti je chiasma opticum
- dostává povely z vyšších center neurotransmitery – dopamin, noradrenalin, GABA, serotonin
- produkuje liberiny a statiny – putují do předního laloku hypofýzy hypotalamo-hypofyzárním portálním oběhem

# Hypotalamo-hypofyzární systém



# Hypotalamo – hypofyzární systém

## II

- ✓ LHRH – luteinizační hormon releasing hormon
- ✓ TRH – thyroid ...
- ✓ CRH – corticotropin ...
- ✓ GHRH – growth hormon ...
- ✓ GHIH – growth hormon inhibiting hormon

# Zadní lalok hypofýzy

- – neurohypofýza
  - ADH – antidiuretický hormon
  - stimulem je zvýšení osmolality, pokles ECT, hypovolémie
  - oxytocin – kontrakce hladkého svalstva dělohy při porodu i při koitцу, zlepšení transportu spermíí, ejekce mléka u kojících
  - sekreci stimuluje dráždění prsních bradavek, genitální krajiny, tlumí alkohol

# Přední lalok hypofýzy

## ➤ FSH

- působí na folikulární buňky vaječníků u žen – růst folikulu, příprava na ovulaci
- na Sertoliho buňky u mužů – produkují bílkovinu dopravující testosteron do semenných kanálků – nezbytný pro vývoj spermií

## ➤ LH

- u žen podporuje závěrečné zrání ovariálních folikulů, náhlý vzestup vyvolává ovulaci
- u mužů stimuluje Leydigovy buňky k produkci testosteronu

## ➤ TSH

- stimuluje buňky štítnice, zpětnou vazbu zajišťuje T3 (i pro hypotalamus)

# Přední lalok hypofýzy

## ➤ ACTH

- adrenokortikotropní hormon, stimuluje kůru nadledvin, zvláště glukokortikoidů (zpětná vazba), méně mineralokortikoidů a androgenů

## ➤ STH

- růst kostí, syntéza bílkovin, proliferace buněk.
- antagonista inzulinu, zvyšuje lipolýzu, pozitivní bilance Ca, P, Mg, podpora odolnosti

## ➤ PRL

- prolaktin – při kojení amenorrhea, totéž při pathologicky zvýšených hladinách

# Produkce antidiuretického hormonu je spouštěna

- A) dehydratací
- B) hyperhydratací

# Produkce antidiuretického hormonu je spouštěna

- A) dehydratací
- B) hyperhydratací

# Onemocnění z postižení hypotalamu I

- ✓ příčiny – tumory, traumata, zánětlivé změny, sarkoidóza, cévní postižení, vrozené i získané poruchy
- ✓ druhy postižení – diabetes insipidus
- ✓ poruchy gonád, nadledvin, štítnice -vše terciární
- ✓ poruchy růstového hormonu, prolaktinu, termoregulace, příjmu potravy, poruchy spánku, psychické poruchy

# Onemocnění z postižení hypotalamu II

- diagnostika – laboratorní - hladiny hormonů RTG selly, angiografie, CT, EEG, oční neurologie
- diagnostika celkově nesnadná – zasahuje mnoho systémů
- léčba – substituce, chirurgické odstranění nádoru – většinou zůstává anosmie, diabetes insipidus

RTG sely



# Diabetes insipidus

- postižení oblasti syntézující ADH – nucleus supraopticus a paraventricularis
- příčina – úrazy hlavy, virózy, lokalizované encefalitidy
- příznaky – polydipsie, polyurie málo koncentrované moči, nelze provést koncentrační pokus – hypovolemický šok
- rozlišení mezi primárním a sekundárním DI – reakce na podaný ADH
- léčba – substituční

# Syndrom neadekvátní sekrece ADH (SIADH)

- hypersekrece ADH
- zvýšená citlivost receptorů
- příčiny – traumata, operace, plicní onemocnění, poruchy CNS, endokrinopatie, paraneoplastický syndrom
- přílišná expanze objemu ECT, hyponatrémie, hypoosmolalita, zmatenosť, edém mozku, plicní edém
- léčba – omezení příjmu vody, furosemid, hypertonický roztok NaCl (2,5%)

# Hypopituitarismus

- panhypopituitarizmus, parciální, primární , sekundární
- hypotalamický – nádory, infarzace, infekce, úrazy, ozáření
- hypofyzární – nádory, infarzace (Sheehanův syndrom – poporodní nekróza hypofýzy), ozáření, úrazy, autoimunitní
- při postupném rozvoji postiženy nejprve pohlavní hormony, poslední kortizol

# Hypopituitarismus

- příznaky
  - lokální – výpadky zorného pole, dvojité vidění, útlak
  - celkové – zástava růstu, nevyvíjí se sekundární pohlavní znaky, suchá nažloutlá kůže, únava, nevýkonnost, amenorrhea, zácpa
- laboratorně – vyšetření hladin hormonů, CT, RTG selly
- léčba – substituce, event. chirurgická nebo ozáření

# Nádory hypofýzy

- adenomy
  - ACTH – sekundární Cushingova choroba
  - STH - gigantismus, akromegalie
  - PRL - amenorrhea, ztráta libida
- příznaky – necharakteristická bolest hlavy, bitemporální hemianopsie, změny na očním pozadí, někdy diabetes insipidus
- diagnostika – hladiny hormonů
- léčba – chirurgická, necitlivé na radioterapii, nutná substituce kortikoidů

# Hyperpituitarizmy

- ACTH hyperpituitarizmus – centrální forma Cushingova syndromu – selhání zpětné vazby, adenom hypofýzy trvale stimuluje kůru nadledvin vs ektopická tvorba ACTH – ovískový Ca
- PRL hyperpituitarizmus – nejčastější Tu hypofýzy,
- u žen - oligomenorrhea, galaktorrhea, celkově dobrý stav, mírná hypertrichóza, větší mléčné žlázy, polycystická ovaria
- u mužů bolesti hlavy, poruchy zraku, oligospermie, azoospermie, gynekomastie

# Hyperprolaktinemický syndrom


- vyvolán mnoha příčinami - farmakologické, endokrinní, hypotalamické – diagnostika při vyněchání farmak, po léčbě ostatních endokrinopatií
- léčba – pouze sledování, dopaminergní látky, chirurgická terapie, záření

# Hyperpituitarizmy

- **STH hyperpituitarizmus** – akromegalie u dospělých, gigantismus u mladistvých, vzniká jako primární nebo sekundární (zvýšená sekrece GHRH)
- **příznaky**
  - lokální – zvětšení tureckého sedla
  - celkové - zvětšování akcí, zhrubnutí vizáže, hypertenze, snížená tolerance glukózy
- **léčba** – dopaminergní látky, ozáření, chirurgická léčba



# Akromegalie



# Diabetes mellitus

- nedostatečné inzulinové působení, hyperglykémie, glykosurie
  - příčiny
  - snížená syntéza inzulinu
  - poruchy uvolnění do krevního oběhu
  - poruchy transportu (protilátky)
  - porucha působení v cílovém orgánu (receptory)
  - porucha odobourávání a působení antagonistů

# Charles Best a Sir Frederick Banting




Objevitelé inzulinu Charles Best  
(vlevo) a Sir Frederick Banting (vpravo)

# Výskyt diabetu

- v ČR
- cca 10% populace
- cca 20% populace nad 65 let věku
- 90% diabetiků II. typu
- 10% diabetiků I. typu



# Výskyt diabetu v jednotlivých věkových kategoriích




# Diabetes mellitus - rozdělení

- rozdělení
- I. typu – závislý na inzulinu IDDM  
u 70-90% průkaz protilátek proti inzulinu  
(LADA, MODY)
- II. typu – nezávislý na inzulinu  
porucha sekrece inzulinu  
snížená účinnost inzulinu – **inzulinová  
resistence**
- při jiných chorobných stavech


# Postup syntézy inzulinu

- postup syntézy inzulinu – proinzulin, odštěpí se C-peptid, podle jeho hladiny se posuzuje intenzita syntézy inzulinu



# Účinky inzulinu

- účinky inzulinu
  - zvyšuje vychytávání glukózy v játrech
  - zvyšuje syntézu jaterního glykogenu
  - usnadňuje vstup glukózy do buněk a její zpracování nitrobuňčně



# Pro rozvoj diabetu II. typu je rozhodující

- A) inzulinová resistance
- B) destrukce Langerhansových ostrůvků

# Pro rozvoj diabetu II. typu je rozhodující


- A) inzulinová resistance
- B) destrukce Langerhansových ostrůvků

# Nedostatečné inzulinové působení

- vede k
  - snížení transportu glukózy do buněk
  - zvýšení glukoneogenezy
  - snížení utilizace glukózy
  - zvýšení glykogenolýzy
  - zvýšenému odbourání bílkovin
  - snížení proteosyntézy
  - zvýšení lipolýzy
  - vzestupu koncentrace mastných kyselin v séru
  - acetonémii

# Diagnostika diabetu

ideálně cíleným screeningem



*Thomas Willis zavedl do lékařské praxe neobvyklý průkaz cukrovky, a to ochutnávání moče pacientů.*

*zdroj: převzato z W01 a upraveno*



# Klinická diagnostika

- intenzivní žízeň s pocitem sucha v ústech
- halované oči
- častější močení větších objemů moči
- svědění genitálu
- vulvitida, balanitida
- váhový úbytek
- dehydratace
- acetonový zápach dechu

# Laboratorní diagnostika

- glykemie – 3,2-5,6 mmol/l
- glykosurie – negativní
- oGTT – 1g glukózy na 1 kg hmotnosti v cca 300 ml čaje/vody, odběr glykémie před podáním, po 1 hodině a po dvou hodinách
- nad 7mmol/l kontraindikován – diagnóza zřejmá
- C-peptid – nalačno a po jídle – k odlišení I. a II. typu
- autoimunita – PL proti Langerhansovým bb – anti GAD, anti IA2, IAA, jiné autoimunity

# Orální glukózový toleranční test

před	po 1 hod	po 2 hod	glykosurie	výsledek
pod 5,6 mmol/l	do 11 mmol/l	pod 7,8 mmol/l	ne	norma
6-7 mmol/l	nad 11 mmol/l	nad 8 mmol/l	ne	porušená glukózová tolerance
6-7 mmol/l	nad 11 mmol/l	nad 11 mmol/l	ano	diabetes mellitus

# Lidové metody a lidová sdělení

- kvasnice vhozené do čerstvě vymočené moči – je-li přítomna glukóza, kvasnice začnou pracovat
- „na cukrovku jsou dobré švestky (ovocný cukr)“ ↗
- „na cukrovku je dobrý med“ ↗
- „když se očekává větší práce, musí se přidat inzulinu“ ↗
- „několik dní před kontrolou na diabetologii se musí jíst hodně citronů!“ ↗

# **Parametry dlouhodobého sledování diabetu**


# Pravidelná kontrola u diabetologa

- glykémie, glykemický profil
- glykosurie
- glykosylovaný Hb – do 60 g/l nad 65 let věku
  - do 40 g/l do 65 let věku
- zvýšená hladina krevního cukru chemicky mění hemoglobin – zpětně tak lze usoudit na úroveň kompenzace za posledních 14-120 dní
- proteinurie - semikvantitativně
- mikroalbuminurie – do 30 mg/24 hod
- TK



# Roční kontroly

- ❖ hladina C peptidu
- ❖ proteinurie – sběr za 24 hod – do 150 mg
- ❖ glomerulární filtrace
- ❖ oční pozadí a další vyšetření vznikajících cévních komplikací
- ❖ EKG



# Selfmonitoring

- optimální stav, malý, velký glykemický profil
- pacient je více angažován
- snadněji se orientuje v denním režimu fyzické aktivity a příjmu stravy
- časná diagnostika dekompenzace



# Akutní komplikace diabetu

- hypoglykémie – při vynechání porce jídla za aplikace inzulinu nebo PAD, alkohol, velká fyzická námaha
- hyperglykémie s ketoacidózou – porušení režimu, interkurentní onemocnění
- hyperglykémie hyperosmolární – horečnatá onemocnění s dehydratací
- laktátová acidóza – při léčbě biguanidy – metabolická acidóza bez hyperglykémie

# Jaké rady dáme nemocnému před odjezdem na hory?

- A) snížit dávky inzulinu nebo PAD
- B) jíst větší porce stravy
- C) snížit dávky inzulinu nebo PAD
- D) jíst menší porce stravy
- E) nezapomenout glukometr

# Jaké rady dáme nemocnému před odjezdem na hory?

- A) snížit dávky inzulinu nebo PAD
- B) jíst větší porce stravy
- C) snížit dávky inzulinu nebo PAD
- D) jíst menší porce stravy
- E) nezapomenout glukometr

# Chronické komplikace diabetu

- mikroangiopatie – dlouhodobě zvýšená hladina glukózy poškozuje endotel
- neuropatie – poškození vasa nervorum – periferní, viscerální
- retinopatie, katarakta
- nefropatie
- imunoalergické – alergie na inzulin, PAD lokální nebo celková




# Léčba diabetu II. typu

- dieta, režim
- PAD
- biguanidy – ovlivňují metabolismus v játrech, zvyšují hladinu laktátu – metformin (Siofor, Glucophage)
- sulfonylmočovina – podporuje uvolnění inzulinu a citlivost tkání k inzulinu – glibenclamid (Glucobene, Minidiab), gliclazid (Diaprel), glimepirid (Amaryl)
- tiazolidindiony – zvyšují citlivost tkání k inzulinu (pioglitazon – Actos)
- látky snižující resorpci glukózy ze střeva – acarbóza (Glucobay)


# Léčba diabetu II. typu – inkretinový systém

- DPP-4 inhibitory – blokují odbourávání inkretinů (GLP1), tím snižují hladinu glukózy – gliptiny – linagliptin (Trajenta), saxagliptin (Onglyza), sitagliptin (Januvia), vildagliptin (Eucreas)
- agonisté GLP1 – liraglutid (Victoza)



# Léčba diabetu II. typu - glukuretika

- blokátory SGLT2 – zvyšují odpady glukózy močí (glifloziny)
- dapagliflozin (Forxiga)
- empagliflozin (Jardiance)



# Léčba diabetu inzulinem

- inzulin – substituce - dnes rekombinantní humánní, rychlý (rapid), pomalý (lente), kombinace (mixované), 100j./ml
- možnosti
  - depotní podání jednou denně – dnes se upouští od úplných depotních režimů
  - podání depotního preparátu v menší dávce s dopichy rapidu dle příjmu potravy a aktuální glykémie – intenzifikované režimy
  - kombinované inzuliny pro podání perem
  - PAD v kombinaci s dopichy rapid inzulinu

# Inzulinová analoga

- krátkodobě působící
- aspart - Novorapid
- lispro – Humalog
- bazální
- detemir – Levemir – 2x denně
- glargin – Lantus – 1x denně

# Nedostatečné působení

- protilátky proti inzulinu nebo receptorům – lze zrušit steroidy
- posthypoglykemická hyperglykémie
- down-fenomen – hyperglykémie po vzestupu STH v noci

# Léčba komplikací diabetu

- hyperglykemické kóma s ketoacidózou – malé dávky rapid inzulinu – např. 2-4j/hod, dle vývoje glykémie další postup, masivní hydratace, hrazení K+, léčba acidózy pod pH 7,1 – má tendenci ke spontánní úpravě
- hyperglykemické hyperosmolární koma – inzulin, hydratace
- laktacidotické koma - bikarbonát

# Kasuistika

- žena 75 let, dlouhodobě léčena pro diabetes mellitus II. typu, dostavila se na pohotovost pro slabost a závratě, další den má odjíždět na zájezd do Prahy, 2 dny měla průjem
- objektivně slabá, zchvácená, při mluvení má výrazné sucho v ústech, lehce urinózní zápach dechu
- vyšetření? dle možností
- glykémie glukometrem, moč proužkem
- ionty, urea, kreatinin, glykémie, KO, Astrup

# Kasuistika

- glykémie 22,5, urea 18,5, Na 151, K 4,8, Cl 118, Astrup v normě
- diagnóza?
- hyperosmolární hyperglykémie bez ketoacidózy