





# Imunofluorescence

Peter Slanina (peter.slanina@fnusa.cz)  
Ústav klinické imunologie a alergologie  
FN u sv. Anny a Lékařská fakulta MU



### Imunoprecipitační křivka



## Serologické metódy

Reakcia antigénu (Ag) s protilátkou (Ab) = imunokomplex:

1. **Primárna** – rýchla, nepozorovateľná voľným okom  
fáza – tvorba imunokomplexov Ag + Ab  
– vznik väzby jednotlivých epitopov s väzbovými miestami protilátok
  
2. **Sekundárna** – pomalá, pozorovateľná voľným okom  
fáza – uplatňuje sa multivalencia Ag a polyvalencia Ab  
– vznik priestorového komplexu

Pokiaľ nedochádza k sekundárnej fáze reakcie, je nutné imunokomplexy vzniknuté v primárnej fáze vizualizovať – imunochemické metódy

# Serologické metódy

## 1. Klasické serologické metódy

- Aglutinácia (priama / nepriama)
- Precipitácia (v kvapaline, v géle)

## 2. Imunochemické metódy s následnou detekciou

- Imunofluorescencie (priama / nepriama)
- Imunoanalýza (EIA-ELISA, RIA, FIA, LIA)
- Imunoblot, imunodot

## 3. Metódy založené na efektorovom účinku protilátok (využívané v klinickej mikrobiológií)

- Komplement fixačné reakcie
- Inhibičné a neutralizačné testy

# Imunofluorescencie

- Luminiscencia

Jav, pri ktorom látka emituje žiarenie po absorpcii excitačného žiarenia (Fotoluminiscencia) alebo pri chemickej reakcii (Chemiluminiscencia),...



Zdroj:  
[www.chemiaasvetlo.sk/theoria/chemiluminiscencia/](http://www.chemiaasvetlo.sk/theoria/chemiluminiscencia/)



Zdroj: [www.infobiologia.net/2017/01/bioluminiscencia-animales-bacterias.html](http://www.infobiologia.net/2017/01/bioluminiscencia-animales-bacterias.html)



## Fotoluminiscencia

Fluorescencia  
emisia žiarenia krátko po excitácii ( $10^{-8}$  až  $10^{-5}$  s)

Fosforescencia  
emisia žiarenia trvá dlhšiu dobu ( $10^{-2}$  s až dni)


# Fluorescencia

látka po absorpcii excitačného žiarenia uvoľňuje emisné žiarenie o dlhšej vlnovej dĺžke (nižšej energii)





# Fluorescenčný mikroskop

- Zdroj svetla – ortuťová výbojka, **LED dioda**
- Excitačný filter – prepúšťa iba časť spektra potrebnú pre excitáciu fluorescencie a zabraňuje priechodu žiarenia v oblasti emisnej vlnovej dĺžky, ktorá by vytvárala pozadie
- Emisný (bariérový) filter – prepúšťa iba emisnú časť spektra a zabraňuje priechodu excitačného žiarenia






- **Binokulár/trinokulár**
- Jednoduché polarizované svetlo,  
Brightfield, Darkfield, **Fluorescencia**



# Schéma fluorescenčného mikroskopu



# Základný princíp



Inkubácia →  
Premytie →  
Krycie sklíčko



# Imunofluorescencia

## ➤ Priama IF

Slúži k detekcii antigénov – väzba konjugátu priamo na antigén

**Využitie:** histológia – preukázanie antigénu v tkanive  
mikrobiológia – rýchla detekcia patogénov v biologickom materiálu

## ➤ Nepriama IF


Používa sa k detekcii protilátok, väzba protilátok a konjugátu v 2 krokoch:

1. Na sklíčko sa naniesie vyšetrovaný materiál (sérum), pokial' sú v ňom prítomné hľadané protilátky, naviažu sa na antigénny substrát na sklíčku
2. Nanesie sa konjugát, ktorý sa viaže na protilátku príslušnej izotypovej triedy (IgG/IgA)


**Využite:** dôkaz špecifických protilátok, najčastejšie autoprotílátok


# Imunofluorescencia

PRIAMA



NEPRIAMA







# Imunofluorescencie

## Antigénne substráty používané pri nepriamej IF

- **Bunky HEp2 (Human Epithelial)** – detekcia **ANA**
  - odvodené od línie HeLa (karcinom děložního čípku)
  - rýchlo sa deliace bunky, v mitóze pozorovateľná chromatinová destička – dôležitý znak pre odlišenie jednotlivých typov ANA
- **Neutrofilné granulocyty** – detekcia **ANCA**
- **Crithidia luciliae** – prvok, detekcia protilátok proti **dsDNA**
- **Opičí jícen** – detekcia **EMA**
- **LKS (liver, kidney, stomach)** – detekcia **AMA, ASMA, GPC, RET, ...**
  - kombinácia 3 krysích tkanív

# Konjugát



- Protilátku s naviazaným fluorescenčným farbivom (fluorochromom)
- Najčastejšie používaný fluorochrom je **FITC** (fluoresceinizothiokyanát)
  - excitačná/emisná vlnová dĺžka 495/520 nm (zelené svetlo)
- Konjugát sa špecificky viaže len na imunoglobulíny určitej izotypovej triedy (**IgG/IgA**) – výberom konjugátu stanovíme protilátky len tejto triedy
- Pre niektoré autoimunitné ochorenia má klinický význam výskyt autoprotilátok v určitej izotypovej triede (napr. celiakia – IgA)


# ANA (Anti Nuclear Antibodies)




- Veľká skupina protilátok
- Viažu sa na rôzne antigény v jadre (DNA, RNA, centroméry, ...)
- Výskyt pri rôznych autoimunitných ochoreniach (systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoídna artritída, ...)



**Fluorescenčný obraz** v mikroskope môže vyzeráť rovnako alebo podobne u rôznych protilátok – keď vidíme určitý obraz, nevieme ešte o akú autoprotilátku ide (na aký antigén sa viaže), k jej bližšiemu určeniu môžu pomôcť iné metódy (ELISA, imunoblot)




ANA – typ homogénný  
(dsDNA, má Ch.d.)




ANA – typ granulárny, zrnitý

(nemá Ch.d., ENA)




ANA – typ nukleolárny (jadierkový)




ANA – typ centromerový (CREST syndrom)

---

V cytoplazme HEp2 buniek je možné pozorovať ďalšie typy fluorescencie – napr. mitochondriálny – AMA (anti-mitochondrial antibodies) – výskyt u ochorení primárna biliárna cirhóza





Zdroj: [www.mayoclinic.org/diseases-conditions/primary-biliary-cholangitis-pbc](http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/primary-biliary-cholangitis-pbc)




# ANCA (protilátky proti cytoplazme neutrofilov)

pANCA – perinukleárny – antigénom je MPO (myeloperoxidáza)

Atypická ANCA – rôzne antigény (elastáza, lysozym, katepsin)



A fluorescence micrograph showing numerous small, oval-shaped cells of Crithidia luciliae. The cells are stained green, indicating the presence of double-stranded DNA (dsDNA) within the kinetoplast. Some cells appear to be budding or dividing.

<dsDNA in the kinetoplast  
positively stained


<*Crithidia luciliae*

---

Prvok *Crithidia luciliae* – dsDNA neg/poz (↑špecifická, ↓senzitívna)


# EMA (protilátky proti endomysiu)

- Na reze opičieho jícnu
- Ag je TTG (tkanivová transglutamináza) – tiež ELISA
- Výskyt u *celiakie* (hlavne IgA)





# Substrát LKS

- Kombinácia 3 krysích tkanív
  - játra (Liver)
  - ledviny (Kidney)
  - žalúdok (Stomach)
- Pozorujeme protilátky:
  - AMA (antimitochondriálne) – primárna biliárna cirhóza
  - ASMA (proti hladkému svalu) – autoimunitné hepatitídy
  - GPC (proti parietálnym bunkám žaludku) – prim. perniciózne anémie
  - RET (proti retikulínu)



AMA (antimitochondriálne) – krysí žalúdok, ledviny, játra







ASMA  
(proti hladkému svalu)  
– krysí žalúdok

GPC

(proti parietálnym bunkám žaludku)

– krysí žalúdok





RET (proti retikulínu) – krysí žalúdok, ledviny, játra

---

# Imunofluorescencie

- Zlatý štandard
- Na prvom mieste – každé imun. lab. by malo poskytovať stanovenie autoprotílátok IF metódou
- Kombinácia s ELISA + Imuno-Blot
- Interpretácia výsledkov:
  - záleží na type
  - pozitívna/negatívna alebo titer Ab
  - autoimunitné protilátky sa ↑ s vekom (!! Deti !!)

# Imunofluorescencie

- Popis vzoriek + sklíčka
- Pracovný list – zoznam pacientov → zápis výsledkov
- Prepis do systému