

Pletysmografie

- měření průtoku krve předloktím -

Metody měření krevního průtoku I

• Radioizotopová metoda

- do těla pacienta je vpravena radioaktivní látka (= radiofarmakum) s krátkým poločasem rozpadu (= rychle se z těla eliminuje = malá zátěž pacienta)
- čím větší je průtok krve daným orgánem, tím více radiofarmaka je v této tkáni vychytáno a tím více radioaktivního záření (uvolněného rozpadem daného radiofarmaka) je zachyceno na detektoru


• Praktické využití:

• Scintigrafie plic

- využívá se v diagnostice plicní embolizace (= situace, kdy embolus (vmetek) ucpe část plicního řečiště a touto oblastí neprotéká krev (krevní průtok je nulový))




Zdravá plíce




Šipky = defekt průtoku = embolie

• Scintigrafie myokardu

- využívá se v diagnostice ischemické choroby srdeční při nejasném nálezu na EKG
- aplikované radiofarmakum se rozvrství v srdci a místa s nízkou koncentrací radiofarmaka odpovídají místům špatně prokrveným („hibernující myokard“, ischemická místa za zúžením tepny) nebo místům po již proběhlém infarktu myokardu (jizva tvorená vazivem je méně prokrvená než okolní pracovní myokard)



Zdravé srdce






Šipka = defekt průtoku = ischemie

Metody měření krevního průtoku II

- **Dopplerovské měření**
 - vychází z **Dopplerova jevu** (změna frekvence a vlnové délky vysílaného a přijímaného signálu při vzájemném pohybu vysílače a přijímače)
- **Praktické využití:**
 - **UZ žil a tepen končetin** (posouzení trombózy, míry ischémie, toků v končetinách)
 - **echokardiografie** (posouzení toků přes chlopně, chlopenní vady...)
 - **transkraniální doppler** (posouzení rychlosti toků v mozkových tepnách)



<http://thequantumtunnel.com/wp-content/uploads/2013/06/Sheldon-as-Doppler-Effect.png>



Metody měření krevního průtoku III

• Pletysmografie

- stanovuje **změny objemu končetiny** (čím větší je průtok krve končetinou, tím je rychlejší nárůst jejího objemu při uzavření odtoku)
- **venózní okluzivní pletysmografie** využívá dvou manžet:
 - **okluzivní manžetou (OM)** uzavíráme (=okludujeme) odtok krve vénami
 - **snímací manžetou (SM)** detekujeme změny objemu končetiny

• Praktické využití:

- **Hodnocení endotelové funkce a dysfunkce** (ve výzkumu tzv. metoda FMD = *flow-mediated dilation of brachial artery*, odráží zejména funkci endotelové NO-syntázy)
- **Hodnocení tíže ischemické choroby dolních končetin** (USA, zejména experimentálně nebo v podobě segmentálního měření krevního tlaku, který udává informaci o pozici okluzivní léze)




https://www.perimed-instruments.com/upl/images/377677_464_333_2_0_thumb/segmental-pressure-perimed.jpg

Regulace cévního tonu


- Funkční stav cévy se odvíjí od množství různých vazoaktivních působků působících jak **vazodilatačně** (např. NO, adenosin, histamin, nízké pH...) tak **vazokonstričně** (angiotensin II, adrenalin přes α -receptory, vazopresin, serotonin, kofein...) = výsledný funkční stav je dán jejich poměrem
- **Nervová regulace**
 - cévy jsou inervovány **sympatickým nervovým systémem**, který:
 - přes α -receptory vyvolává vazokonstrukci
 - přes β -receptory vyvolává vazodilataci (koronární řečiště, svalové arterie, plicní řečiště)
- **Myogenní autoregulace**
 - zvýšené napětí cévní stěny vede k vazokonstrukci („obrana před přílišným rozepnutím působením vysokého cévního tlaku“)
 - podkladem jsou stretch-receptory (receptory citlivé na protažení), které jsou spojeny s kationtovými kanály (Na^+ , Ca^{2+}) = vtok kationtů do buňky vede k depolarizaci a kontrakci
- **Metabolická autoregulace**
 - při nedostatečném prokrvení (ischemii) dochází ke vzniku řady různých zplodin metabolismu (laktát, adenosin, ADP, AMP, snižuje se pH), které společně vedou k vazodilataci („cílem je odplavení zplodin metabolismu a zvýšení průtoku“)
 - Metabolická regulace je úzce spojena s **funkční hyperémií**, ke které dochází **při fyzické zátěži** (vlivem zátěže dochází k střídání kontrakce a relaxace svalů a tím i průtoku cévami; v době relaxace dochází k zvýšení průtoku = hyperémii, která následně po zátěži přetravává)
 - dochází k tzv. **reaktivní hyperémii**

Průtok krve kosterním svalem

- V klidu dominuje nervová regulace cév – sympatická α -adrenergní vlákna udržují stálý tonus cév
- **Během svalové práce je průtok krve zajištěn dominantně metabolickou autoregulací**
- Průtok krve svalem se může zvýšit ještě před akcí pomocí sympatických cholinergních vazodilatačních vláken
- β_2 receptory v arteriolách – navázání adrenalinu → vazodilatace
- V pracujícím svalu může průtok krve vzrůst více jak 20x
- Izometrická kontrakce svalu může zastavit tok krve svalem
- Rytické kontrakce vedou k uzavření cév během stahu a uvolnění během relaxace, pomáhají tak pumpování venózní krve dál



Uspořádání experimentu




KALIBRACE (!)



Výsledky I

- **Klidový průtok**

1) VLASTNÍ MĚŘENÍ:



Do bloku označit
vzestupnou část křivky
→ počítač dopočítá
průtok v ml/s

ZOPAKOVAT 3X

2) VÝPOČET OBJEMU PAŽE

$$\text{Obvod předloktí: } o = 2 \cdot \pi \cdot r \rightarrow r^2 = \frac{o^2}{4 \cdot \pi^2}$$

↓

$$\text{Objem předloktí: } V = \pi \cdot r^2 \cdot l \rightarrow V = \frac{\pi \cdot o^2 \cdot l}{4 \cdot \pi^2} \rightarrow V = \frac{o^2 \cdot l}{4 \cdot \pi} \cdot k$$

3) PŘEPOČÍTAT VÝSLEDKY NA ml/min/100ml tkáně

4) SROVNAT S FYZIOLOGICKOU HODNOTOU:

KLIDOVÝ PRŮTOK KRVE VE SVALECH
2-4ml/min/100ml tkáně

Výsledky II

- Průtok krve vyšetřované končetiny během zátěže druhé končetiny
 - zahajte cvičení nevyšetřovanou končetinou, cvičte po dobu 2-3 minut a **během cvičení** zaznamenávejte hodnoty průtoku ve vyšetřované končetině
- Pracovní (funkční) hyperémie: zvýšení prokrvení způsobené zátěží
 - **po ukončení cvičení** vyšetřovanou končetinou změřte opakovaně průtok krve touto končetinou
- Reaktivní hyperémie: zvýšení prokrvení způsobené ischemií
 - vyvolejte ischemii vyšetřované končetiny dle daného postupu, **po jejím ukončení** změřte opakovaně průtok krve touto končetinou

→ **sestrojte grafy** zachycují průtok krve vyšetřovanou končetinou v jednotlivých situacích
→ **vypočítejte, kolikrát se průtok krve** vyšetřovanou končetinou **zvýšil** oproti klidovému průtoku a srovnejte s fyziologickými hodnotami:

Funkční hyperémie: zvýšení 10-20x

Reaktivní hyperémie: zvýšení 10x

Trvání: cca 140 s

Endoteliální funkce a dysfunkce

- **Funkce endotelu:**

- **bariérová funkce** (součást hematoencefalické bariéry, glomerulární filtrační membrány, podíl na tvorbě tkáňového moku apod.)
- **srážení krve** (subendotelový kolagen, tkáňový faktor, tPA...)
- **zánětlivá reakce** (selektiny, VCAM, ICAM...)
- **endokrinní funkce** (tvorba NO, tvorba angiotensin-konvertujícího enzymu...)

- **Endotelová dysfunkce**

- vzhledem k mnohočetným endoteliálním funkcím je **endoteliální dysfunkce komplexní patologický jev charakterizovaný zejména:**
 - **narušením poměru mezi vazodilatací a vazokonstrikcí** (připisováno zejména narušení produkce vazodilatačně působícího oxidu dusnatého - NO)
 - **narušením „nesmáčivosti“ endotelu**, tzv. **protrombogenní stav** (vyšší riziko vzniku krevní sraženiny a následného zánětu cévní stěny)
 - přechodem z klidového (*quiescent*) stádia do proliferativního stádia (porušený endotel začíná vytvářet různé růstové faktory, které vedou k jeho proliferaci, ale též k proliferaci hladkosvalových buněk médiu cévní stěny, čímž dochází k přestavbě cév a jejich dysfunkci)
- endotelová dysfunkce představuje iniciální stadium **aterosklerózy**, která ve svém konečném důsledku vede k ischemické chorobě srdeční (včetně infarktu myokardu), ischemické chorobě dolních končetin (včetně syndromu diabetické nohy, či nutnosti amputace končetiny), či k cévnímu onemocnění mozku (včetně mrtvice)

