

# Fyziologie dětského věku



# Věková období dítěte

věk	název období	charakteristika
0 – 28dnů	novorozenecké	období adaptace
0 – 1 rok	kojenecké	intenzivní růst
2. – 3. rok	batolecí	rozvoj řeči, myšlení
4. – 5. rok	předškolní	zmírnění tempa růstu
6. - 11.rok	mladší školní	
12. – 15. rok	starší školní	diferenciace dle pohlaví, zrychlení růstu a vývoje
15. –18.(19.) rok	dorostové	ukončeno rozkvětem tělesných a duševních sil
19 – 21 let	mladý dospělý	

# **Novorozeneč (0 – 28. den po narození)**

## **Klasifikace:**

### **Dle délky těhotenství:**


- Nedonošený      < 37. týden gestace
- Donošený            38. – 41. týden gestace
- Přenošený          > týden gestace

## Dle porodní hmotnosti

- Hypotrofický       $< 2\ 500\text{ g}$
- Eutrofický             $2\ 600 - 3\ 900\text{ g}$
- Hypertrofický         $> 4\ 000\text{ g}$


## Dle WHO:

- Novorozenecký s nízkou porodní hmotností  
(por.hm  $< 2\ 500\text{ g}$  bez ohledu na délku těhotenství)




A

36. týden



B

38. týden



C

40. týden

G e s t a č n í v ě k

(podle Ushera)

# APGAR skóre

- vyšetření novorozence dle speciálního bodovacího systému v 1., 5. a 10. minutě po narození
- Sledované parametry: srdeční frekvence, pravidelnost dýchání, barva kůže, svalový tonus, reakce na podráždění
- Udělují se : nula, jeden nebo dva body
- Napomáhá určení dalšího postupu péče o novorozence

Virginia Apgar

1909 - 1974



# Fetální oběh

**Má svá specifika ve srovnání s oběhem po narození:**

- Placenta
- 1 umbilikální žíla – vede okysličenou krev
- 2 umbilikální arterie odvádí odkysličenou krev
- Zkraty přes: foramen ovale
  - ductus arteriosus Botalli
  - ductus venosus





Figure 83-4. Organization of the fetal circulation. (Modified from Arey: Developmental Anatomy. 7th ed. Philadelphia, W. B. Saunders Company, 1974.)

# Vývojová pediatrie



2 mo. (fetal)

5 mo.


Newborn

2 yr.

6 yr.

12 yr.

25 yr.




**Figure 2–3.** Change with age in total body water and its major subdivisions. (Data from Friis-Hansen. From Winters, RW [ed]: The Body Fluids in Pediatrics. Boston, Little, Brown & Co Inc, 1973, p 100.)

# Růstová charakteristika období

- novorozeneč 50 cm 3000 - 4000g
- kojenec 75 cm 3 x porodní hmotnost
- 2.rok o 11 cm o 2-3 kg
- 3.rok o 9 cm o 2-3 kg
- dále o 4-6 cm
- puberta o 10-12cm/1rok o 5 kg i více


# Obvod hlavy - hrudníku

- novorozeneč 34 cm 32-34 cm
- 6.měsíc 43 cm
- 1.rok 46-47 cm 48 cm
- 5.-6.rok 51 cm 55 cm
- 11.rok 52-53 cm 63-64cm
- 14.rok 54 cm 68 cm



**Figure 1–9.** Weight by age percentiles for boys, ages birth to 36 mo, including highest and lowest values at each age. (From Pomerance HH: Growth Standards in Children. New York, Harper and Row, 1979, p 25.)

**Figure 1–8.** Length by age percentiles for boys, ages birth to 36 mo, including highest and lowest values at each age. (From Pomerance HH: Growth Standards in Children. New York, Harper and Row, 1979, p 29.)








Figure 83-8. Height of boys and girls from infancy to 20 years of age.



**Figure 1-14.** Changes in head circumference with age for boys and girls. (From Nellhaus G: Composite International and Interracial Graphs. Pediatrics 41:106, 1968.)



# KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

## Počet tepů podle věku

• novorozenecký	135-140	tepů/min
• 6 měsíců	130-135	
• 1 rok	120-125	
• 2 roky	110-115	
• 5 let	98-100	
• 8 let	80-85	
• 15 let	70-76	

# Elektrokardiografie

- obtížnější hodnocení než v dospělosti
- na definitivní tvar má vliv:
  - poměr svaloviny pravé a levé komory
  - postup aktivace síňového a komorového myokardu
  - proces repolarizace

**Hodnocení křivky je nutné provádět komplexně  
a individuálně – v součinnosti klinického  
a laboratorního nálezu**

- **obecně:**
  - u novorozence – převaha pravé komory
  - do 3 měsíců po narození – nárůst levostranných sil
  - ve 2 letech – pravá i levá komora v rovnováze
  - od 3 let – převaha levé komory


# Krevní tlak

- bezprostředně po narození je vysoký:
  - poporodní stres – vyplavení katecholaminů a kortizolu
- po 1.dnu se ustálí 70/50 mmHg:
  - otevření pulmonálního a intestinálního řečiště
- další mírný vzestup až k hodnotám pro dospělé v období puberty:
  - postupné dozrávání regulačních mechanismů
  - stimulace z vnějšího prostředí

- novorozeneč **80/46 mmHg** 10,6/6,1 kPa
- 3 roky **100/67** 13,3/8,9
- 10-11 let **111/58** 14,8/7,7
- 13-14 let **118/60** 15,7/8,0

# **Velikost tonometrické manžety vzhledem k obvodu paže**

<u>hmotnost</u>	<u>věk</u>	<u>minimální šířka manžety</u>
1 500 g	*	2,5 cm
5 kg	3 měsíc	4,5 cm
10 kg	15 měsíců	6 cm
30 kg	9 let	7,5 cm
30 a více kg	10 a více let	12 cm



Obr. 50. Súprava indikátora na ultrazvukové meranie tlaku krvi LUD-802 TESLA so sadou nafukovacích vložiek (CHIRANA) k tonometrickým manžetám pre deti


# KREV - složení

- Po narození:

- ✓ Erytrocyty =  $5-6 \times 10^{12}/l$
- ✓ Leukocyty =  $20-22 \times 10^9/l$
- ✓ Hemoglobin = 190 g/l


- Ve třech měsících života:

- ✓ Erytrocyty =  $4 \times 10^{12}/l$
- ✓ Leukocyty =  $10.5 \times 10^9/l$
- ✓ Hemoglobin = 110 g/l





**Figure 5–2.** Hemoglobin-oxygen dissociation curves. The position of the adult curve depends on the binding of adult hemoglobin to 2,3-diphosphoglycerate (DPG), temperature, carbon dioxide tension ( $p\text{CO}_2$ ), and hydrogen ion concentration (pH).


**Normal bilirubin metabolism**




**Bilirubin metabolism during phototherapy**









# TEPLOTA

- In utero je teplota fétu regulována přes placentu, která slouží jako výkonný tepelný výměník
- Teplota fétu je vyšší než teplota matky: přibližně kolem  $38.5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Po narození je novorozenecký situován do prostředí bez amniové tekutiny a tedy pro něho velmi chladného:  $20-25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Teplota dítěte rychle klesá:
  - kožní teplota rychlostí  $0,3\text{ }^{\circ}\text{C/min}$
  - teplota jádra (vnitřní, měřená např. rektálním teploměrem) pak rychlostí  $0,1\text{ }^{\circ}\text{C/min}$

- Protože u novorozence je povrch těla ve vztahu k tělesné hmotnosti relativně velký, převažují u něho **velké tepelné ztráty**
- Ideální teplota prostředí je nazývána jako **neutrální teplota prostředí**: jedná se o takovou teplotu zevního prostředí, ve které má novorozeneček nejmenší nejen tepelné ztráty, ale i nejmenší spotřebu kyslíku.
- 1 hodina po narození: 33-34 °C
- 1 den po narození: 31-33 °C
- 1 týden po narození: 27-33 °C






Figure 83–7. Fall in body temperature of the neonate immediately after birth, and instability of body temperature during the first few days of life.







# Imunitní systém


- **hlavní prenatální imunoglobulin IgG:**
  - prochází placentou
  - při \* je stejná koncentrace jako v těle matky
  - postupně klesá
  - ve 3.-10.týdnu dosahuje nejnižších hodnot
  - pak se opět hladiny zvyšují

- **IgM** tvoří novorozenci ve věku 1-2 týdnů
- **IgA** se objevuje ve věku 1 měsíce, pak se koncentrace pomalu zvyšuje  
(na IgA je bohaté kolostrum a mateřské mléko)

# VÝŽIVA

**Období výlučně mléčné výživy : \* - 6. měsíc**

- MATEŘSKÉ MLÉKO!!!!!!





© Foto: La Leche Liga Deutschland e. V.


**MATEŘSKÉ MLÉKO JE NEJLEPŠÍ -**





WHO / PAHO (19834)

- NA CELÉM SVĚTĚ








## Období nemléčných přídavků: 5. – 7.měsíc

- 5. měsíc: zeleninová polévka nebo maso-zeleninový příkrm (vařený vaječný žloutek 2 x týdně, rostlinný olej 5-10 g)
- SUNAR
- 6. měsíc – ovocno-mléčný přídavek (tvaroh, jogurt s mixovaným ovocem, NESLADIT)
- 7. měsíc – cereálie s lepkem (kaše, piškoty)



## Období plné kojenecké výživy: 8. – 12. měsíc

- výše uvedená strava
- + od 9. měsíce – kusovitá, zrnitá strava
- důležitá vláknina (ovocné šťávy, džusy, ovesné vločky...)
  - zvyšuje obsah vody ve střevním obsahu
  - zpomaluje dobu pasáže střevem
  - příznivě působí na mikrobiologii (mikroekologii) obsahu v tlustém střevě

# Mléčné zuby



# Trvalé zuby



Tab. 6.2. Vývin mliečneho chrupu

Zub	Založenie zárodkov	Mineralizácia koruniek	Prerezanie	Dokončenie vývinu	Eliminácia
I.	7. embr. týždeň	4.-5. embr. mes. 1,5-2,5 mes. živ.	6.-8. mes. živ.	1,5-2 roky	6.-7. rok
II.	7. embr. týždeň	4.-5. embr. mes. 2,5-3. mes. živ.	8.-10. mes. živ.	1,5-2 roky	7.-9. rok
III.	7., 5. embr. týždeň	5.-6. embr. mes. 9. mes. života	15.-20. mes. živ.	2,5-3 roky	9.-12. rok
IV.	8. embr. týždeň	5.-6. embr. mes. 6. mes. života	12.-16. mes. živ.	2,5-3 roky	9.-11. rok
V.	10. embr. týždeň	5.-8. embr. mes. 10. mes. života	20.-30. mes. živ.	3-3,5 roka	10.-12. rok
Mliečny chrup	7. embr. týždeň	4.-5. embr. mes.	6.-30. mes. živ.	3,5. roka	do 12. roka


# PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ

## novorozenecké reflexy:

- úchopový
- pátrací
- labiální – sací – polykací
- Mórův

## **ke konci 1.měsíce a v dalších obdobích**

- asymetrický tonický šíjový reflex  
(šermířská pozice)




Obr. 10. Dítě ve věku asi jednoho měsíce v typické poloze určené asymetrickým tonic-kým šíjovým reflexem („šermířská“ pozice). (Foto M. Langmeier.)



plod v koncepčním věku  
3 měsice



novorozeneček



kojenec - 5 měsíců






kojenec - 9 měsíců

Obr. 9. Princip střídání funkční symetrie a asymetrie na stále vyšší vývojové úrovni.  
(Upraveno podle A. Gesella.)

# PSYCHOMOTORICKÝ

něno dítěte:

	1 měsíc	2 měsice	3 měsice	4 měsice	5 měsíců	6 měsíců
I. Poloha na zádech	 Strabism. Facies symetr. ± Spont. hybn. symetr. Hyperab- dukce DK ± Reflexní úchopy ±	 Sledování očima Úsměv	 Brouká Reakce na zvuk (Orientační reflex nebo napak zklidnění) ±	 Obrací se za zvukem ± Hraje si s rukama ±	 Sahá po hračce ± Dá hračku do úst ±	 Najde zdroj zvuku očima ±
II. Osazování						
III. Poloha na břišku						  Převrátí se na břiško ±
V. Závěs pod břiškem Závěs v podpaži					  Střemhlavý reflex ±	
VI. Zpřímená poloha				  Neudrží hmotnost těla ±		  Udrží hmotnost těla (drženo v podpaži) ±
VI. Úleky	Moro I., II. ± symetrie ±	Moro	Moro ±	Moro Ø		

7 měsíců	8 měsíců	9 měsíců	10 měsíců	11 měsíců	12 měsíců
Hraje si s nohami Vyslovuje slabiky	Opakuje slabiky	Zdvojuje slabiky		Jedno smysluplné slovo	Užívá olespoň dvě smysluplná slova
	Samo se posadí Jí rohlík Tluče dvěma kostkami o sebe Otočí se na zavolání jménem	 Sebere drobek		Na výzvu provede pohyb (paci-paci, pá-pá, tik-tak) nebo podobně	Umi správně postavit hrniček na podložku Shazuje hračky Podá nebo ukáže přibližně 5 známých předmětů
 Dělá „letadlo“ (pivotuje)	 Udrží se v trakaři	 Plazi se	 Leze po čtyřech		 Vyleze na schod či jinou plochu 20 cm vysokou
					
Udrží hmotnost těla (drženo za ruce)	Stojí držíc se ohrádky	 Postavi se samo u nábytku	 Chodi kolem nábytku úkroky a drží se oběma rukama	Chodi kolem nábytku a drží se jednou rukou	 Staví se bez držení

# TEORIE STÁRNUTÍ



# TEORIE STÁRNUTÍ

- Teorie volných radikálů
  - primární příčinou stárnutí jsou poškození makromolekul a buněčných struktur vlivem volně radikálových reakcí

- **Neuroendokrinní teorie stárnutí**
  - vychází z předpokladu, že centrem řídícím stárnutí je epifýza, jejímž hlavním působkem je hormon melatonin (jeho produkce s věkem výrazně klesá)

- **Genetická teorie stárnutí**
- Teorie mutační – v somatických buňkách dochází během života k hromadění mutací. Mutace jsou brány jako prvotní příčina stárnutí.
- Teorie programovaného stárnutí vychází z předpokladu, že funkce jednotlivých genů či jejich skupin je časově ohraničena a předem naprogramována
- Stárnutí je tak výsledek uplatnění určitého genetického programu (Hayflick 1985)

# Příznaky stárnutí

- Snižování funkčních schopností jednotlivých systémů:
  - ubývá svalové síly
  - snižuje se kapacita plic, srdeční výdej a rezerva, funkce ledvin a jater, metabolizmus
  - snižuje se i počet neuronů v CNS

- Příznaky morfologické:
- Změna v ukládání tuku
- Změna ochlupení kůže
- Změna paměti – hlavně krátkodobé
- Změna chování

*„Každý je starý podle toho, jak se sám cítí být starý.“*

