

Reflexy

Praktické cvičení z fyziologie (podzimní semestr: 2. – 4. týden)

Studijní materiály byly vytvořeny za podpory projektu MUNI/FR/1474/2018


Reflexy

- **Reflex:** mimovolná standardní odpověď organismu vyvolaná podrážděním receptorů – základní funkční prvek nervové soustavy pracující na **principu negativní zpětné vazby**
- **Reflexní oblouk:** 1.-receptor, 2.- dostředivé (afferentní) dráhy, 3.- centrum (v míše nebo v mozkovém kmeli), 4.- odstředivé (efferentní) dráhy a 5.- výkonný orgán (efektor).
- Jednotlivé reflexy mají **přesně anatomicky definované reflexní oblouky**, tedy dráhu a centrum.
- Podle charakteru reflexní odpovědi na určitý podnět, lze **diagnostikovat** a určit **místo postižení** nervového systému.
- **Funkce reflexu:** korekce na změnu nebo ochrana před poškozením

Postup vyšetření

– Při vyšetřování reflexů sledujeme:

- Vybavitelnost reflexu – jestli lze reflex vyvolat
 - Kvantitativní změny odpovědi – jak silná je reflexní odpověď, symetrie u oboustranných reflexů
 - Kvalitativní změny odpovědi – jestli dostáváme očekávanou odpověď nebo úplně jinou
-
- U napínacích reflexů musí být vyšetřovaný sval uvolněný
 - Zlepšení vybavitelnosti tzv. zesilovacími manévrovy, spočívajícími ve zvýšení napětí antagonistů (např. Jendrassikův manévr - vyšetřovaný zaklesne ruce do sebe a snaží se je usilovně roztáhnout)
 - Někdy musíme odvést i pozornost vyšetřovaného (např. jednoduchý početní úkon během vyšetření)




Reflexy v praktiku

- **Reflexy proprioceptivní** (myotatické, napínací):
1- Reflex masseterový, 2- Reflex nasopalpebrální, 3- Reflex bicipitální,
4- Reflex styoradiální, 5- Reflex tricipitální, 6- Reflex patellární, 7-
Reflex šlachy Achillovy a 8- Reflex medioplantární.
- **Reflexy exteroceptivní** (kožní a slizniční):
1- Reflex korneální a konjuktivální, 2- Reflex patrový, 3- Reflex
epigastrický, mesogastrický, hypogastrický a 4- Reflex plantární.
- **Reflexy smyslové:**
1- Zornicové reakce: a- Reakce na světlo: přímá a nepřímá
(konsensuální) reakce, b- Reakce na konvergenci a c- Reakce na
bolest. 2- Mžikací reflex.

Proprioreceptory: Svalové vřeténko a Golgiho tělíska

Mezi proprioreceptory patří i receptory v kloubech informující o poloze kloubu



Napínací reflex – reflexní oblouk

(myotetický reflex: monosynaptický, proprioceptivní)


Receptor: svalové vřeténko

Hlavní funkce reflexu:

Regulace nechtěných změn délky svalu, korekce svalového tonu, udržení vzpřímeného postoje, odolávání gravitaci (např. udržení polohy brady)

Vyvolání reflexu:


Poklepem kladívka na šlachu dojde k pasivnímu (nechtěnému) natažení svalu. Podráždí se zakončení nervového vlákna I_a . Reakcí je reflexní zkrácení vlastního svalu.



Napínací reflex – regulace citlivosti pomocí γ -motoneuronu

γ -motoneurony

mění délku svalových vřetének – korekce citlivosti vřeténka na protažení (zkrácení kontraktilního konce vřeténka zvyšuje jeho citlivost)



Úmyslná kontrakce: Informace o kontrakci svalu z vyšších nervových center se dostává shodně k α -motoneuronům i γ -motoneuronům (α - γ -koaktivace) → kontrakce svalu i vřeténka,
→ citlivost svalového vřeténka zůstává konstantní

MUNI
MED


Inverzně napínací reflex

(bisynaptický, proprioreflektivní)

Funkce: regulace svalového napětí


(ochrana před poškozením šlachy)

Výrazně zvýšené svalové napětí vede k inhibici a-motoneuronu příslušných svalových vláken (zde extenzoru) a excitaci a-motoneuronu antagonistického svalu (zde flexoru)



Axonový reflex (extracentrální)


- Impulzy vznikající v sensorickém nervu se antidromně (protisměrně) přenáší do dalších větví sensorického vlákna
- Při podráždění kožních receptorů dochází k převedení impulzu k blízkým arteriolám, které jsou inervované stejným vlákном
- Z nervových zakončení je vyplavena substance P, která z dilatuje arterioli a zvyšuje propustnost cév (podstata červeného dermatografismu – zčervenání po škrábnutí)
- Kromě toho dochází k vylití histamINU z žírných buněk, který rovněž dilatuje cévy a zvyšuje jejich propustnost



Pupilární reflex

Zúžení zornic v reakci na osvit

- V reakci na osvit dojde symetricky ke zúžení osvícené i neosvícené zornice
- Symetrie odpovědi je daná křížením nervových drah
- Mióza – zúžení zornice, aktivace parasympatiku
Mydriáza – rozšíření zornice, aktivace sympatiku
- Centrum reflexu: mozkový kmen (mezimozek)



https://www.researchgate.net/figure/Schematic-drawing-of-the-pupillary-light-reflex-pathway-By-way-of-the-optic-tract-the_fig1_318593544

Registrace reflexu Achillovy šlachy

Registrace reflexu Achillovy šlachy

Cíl:

- Naučit se registrovat elektrickou a mechanickou odpověď reflexu Achillovy šlachy.
- Naměřením příslušných hodnot získat představu o časové postupnosti elektrofyziologických dějů reflexní odpovědi, které začínají podrážděním příslušných receptorů a končí relaxací svalu
- Zařazení reflexu Achillovy šlachy: monosynaptický, proreceptivní, somatický, napínací, nepodmíněný, míšní, monosegmentální reflex

Reflex Achillovy šlachy

- Spouští se úderem na šlachu, což způsobí protažení svalu a tím podráždění svalových vřetének v musculus triceps surae (lýtkový sv.).
- Dostředivá vlákna typu I.a se v míše (hlavně segment S1) přepojí na příslušné alfa motoneurony. Vzruch je veden odstředivými vlákny ke stejnemu svalu, z kterého informace o podráždění přišla. Reflexní odpověď je záškub chodidla.
- Vlastnímu stahu svalu předchází depolarizace membrán svalových vláken, tedy elektrická odpověď. Vzniká sumační akční svalový potenciál (CMAP), který je možno snímat povrchovými elektrodami (elektromyograficky). Hodnotí se trvání a zpoždění od stimulace (latence).

Reflex Achillovy šlachy: metoda a účel měření

- Mechanickou odpověď svalu, tj. jeho zkrácení a relaxaci, registrujeme pomocí kloubního goniometru, připevněného na lýtka a nohu. Pohyb v kloubu se převádí na elektrický signál na výstupu snímače. Derivací tohoto signálu získáme rychlosť kontrakce a relaxace.
- Elektrodami na lýtka se měří elektromyografický záznam
- Diagnostický význam:
 - Hodnocení mechanické odpovědi reflexu Achillovy šlachy (konkrétně okamžiku, kdy rychlosť relaxace svalu dosáhla maxima) se dříve využívalo v klinice při orientačním vyšetření funkce štítné žlázy.
 - Při hyperfunkci je maximální rychlosť relaxace svalu dosažena dříve, mechanická odpověď je zkrácena. Při hypofunkci je odpověď naopak prodloužena.
 - **Hypertyreóza → hyperreflexie, hypothyreóza → hyporeflexie**

Připevnění elektrod a goniometru

Zemnící elektroda (zelená)

(mezi aktivní elektrodou a
podkolenní jamkou)

Aktivní elektroda (žlutá)


(v polovině spojnice vnitřního
kotníku a jamky)

Referenční elektroda (černá)


(5 cm distálně a laterálně od aktivní
elektrody)

Goniometr

**(krabička s kabelem umístěná
na mediální straně lýtka)**



Polygrafický záznam reflexu Achillovy šlachy



Vyhodnocení

- Výsledky z pěti kvalitních záznamů zapište do tabulky

| záznam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | průměr | fyz. hodnoty (ms) |
|--------------|---|---|---|---|---|--------|-------------------|
| Δt_1 | | | | | | | 32 ± 3 |
| Δt_2 | | | | | | | |
| Δt_3 | | | | | | | 120 ± 20 |
| Δt_4 | | | | | | | |
| Δt_5 | | | | | | | 320 ± 50 |
| CAMP | | | | | | | $14,9 \pm 2,5$ |

- Průměrné hodnoty porovnejte s fyziologickými hodnotami
- Vyšší hodnoty Δt_5 mohou naznačovat podezření na sníženou funkci štítné žlázy

Zajímavé odkazy (dobrovolné)

Napínací reflexy <https://www.youtube.com/watch?v=0sqCIzuotWo>

Babinského a plantární reflex:

<https://www.youtube.com/watch?v=HnX4bH1WRHQ>

https://www.youtube.com/watch?v=iV_a2WSbdM8

Vyšetření mozkové smrti:

<https://www.youtube.com/watch?v=Nty6bICZlyA>

8:40 min <https://www.youtube.com/watch?v=qjZBGFWvv4E&t=524s>

Vestibulookulární reflex

https://www.youtube.com/watch?v=j_R0LcPnZ_w

Pupilární reflex 3:25 min

<https://www.youtube.com/watch?v=aM0ipmW3ikc>

Závrat' a nystagmus

Studijní materiály byly vytvořeny za podpory projektu MUNI/FR/1474/2018


Nystagmus

- Rytmický kmitavý pohyb očních bulbů
- Skládá se z rychlé (sakadické) a pomalé složky, které se pravidelně střídají
- Směr nystagmu se určuje podle směru rychlé složky (sakád)
- Spontánní (nevyprovokovaný) nystagmus je vždy patologický (poškození vestibulárního systému, nervových drah nebo mozkových center)




Vestibulární aparát

- Funkce vzhledem ke zraku:
vestibulookulární reflexy - stabilizace retinálního obrazu a udržení zrakové ostrosti při pohybu
- **Plokruhovité kanálky** (kinetické čidlo)
cristae ampullares, reakce na úhlové zrychlení (rotace hlavy)
- **Utriculus, sacculus** - maculae staticae (statické čidlo)
lineární akcelerace, poloha hlavy v gravitačním poli (registrace statické polohy hlavy)




Vestibulární aparát – polokruhovité kanálky

- Zrychlený pohyb hlavy vyvolá pohyb endolymfy (tekutiny) v kanálku
- Endolymfa ohne cílie – záznam pohybu hlavy
- Tři polokruhovité kanálky jsou na sebe kolmé, takže poskytují informaci o pohybu hlavy ve všech třech rozměrech



23



Vestibulookulární reflex

- Reflex mozkového kmene
- Funkce: stabilizace retinálního obrazu a udržení zrakové ostrosti při pohybu
- Každý kanál je spojen s tím párem okohybných svalů, které působí spřažení pohybů očí v jeho rovině
 - Např. pokud otočíme hlavu doleva, endolympfa v kanálku setrvačnosti půjde proti směru rotace – pohyb očí kopíruje pohyb endolympfy - oči tedy budou rotovat doprava, proti směru rotace

