

Úvod do intenzivní péče

Resuscitační a intenzivní medicína I.+II.

Jan Maláska

KARIM FN Brno a LF MU Brno

- 1x2 hodiny (září 2019)
- 2x2 hodiny (čtvrtok)
- 2x2 hodiny (leden 2019)
- na konci podzimního semestru test?
- na konci jarního semestru zkouška
- kontakt:

jan.malaska@gmail.com


723784101

1. Příjem pacienta na intenzivní péči, transport pacienta
2. Rozšířená neodkladná resuscitace (ALS)
3. Oxygenoterapie – pomůcky a aplikace, invazivní zajišťování dýchacích cest a ošetřovatelská péče
4. Základní a rozšířená monitorace pacienta na intenzivní péči (invazivní a neinvazivní)
5. Základy UPV, protektivní UPV, specifika ventilace u ARDS, COPD, astma
6. Neinvazivní ventilace, ukončování UPV
7. Extubace a její komplikace, prevence VAP (ventilátorové pneumonie)
8. Sedace a delirium v intenzivní péči, prevence a screening deliria, agitace pacienta
9. Šok – rozpoznání pacienta, iniciální zajištění a terapie, typy šoků a nejčastější příčiny
10. ABR – hodnocení, základní poruchy iontů a vody

11. Sepse, SIRS a MODS. Definice, příčiny, základy terapie.
12. Nutrice. Nutriční potřeby a monitoring. Parenterální a enterální výživa – přípravky a technické zajištění
13. Renální selhání, eleminační techniky
14. Neuromonitoring a neurointenzivní péče
15. Tekutinová terapie – krystaloidy, koloidy, hemoterapie u pacientů v intenzivní péči
16. Akutní intoxikace – obecné rozdělení, nejčastější intoxikace a jejich léčba, antidota
17. Významné infekce na intenzivní péči, mikrobiologické odběry, podávání ATB, bariérový režim.
18. Transplantační program a péče o potenciálního dárce orgánů
19. Polytrauma v intenzivní péči
20. Přechod z léčby intenzivní na paliativní. Komunikace na intenzivní péči. Principy a základní východiska.



WARNING



**DON'T TELL ME
HOW TO
DO MY JOB**

Serious injury may occur.



1. Intenzivní medicína – historie
2. Rozpoznání kriticky nemocného pacienta
3. Zhodnocení kriticky nemocného pacienta
4. Mnemotechnické pomůcky
5. Transport kriticky nemocného pacienta



KDY VZNIKLA INTENZIVNÍ MEDICÍNA?



Mortalita 90%



Monitorace ventilace:
pravidelné vzorky arteriální krve
pro měření pH, pomocí nové
elektrody, a celkového CO₂
metodou Van Slyke

Po výpočtu pCO₂ z Henderson-
Hasselbalchova rovnice

Poté dostali studenti pokyny, v případě
potřeby, o tom, jak změnit frekvenci a
intenzitu dechů

26.dubna 1952

dr. Bjorn Ibsen provedl
tracheotomii, 12-letá dívka s
poliomyelitidou

Zavedena kanyla s manžetou a
napojena na systém přetlakové
ventilace

315 pacientů celkem vyžadovalo
ventilační podporu

1500 mediků, celkem 165 000
hodin, směny á 6 hodin


Cca 2-3 měsíce, než došlo k
obnově dýchání

Mortalita pokles z 90% na 25%

Mechaničtí studenti

Carl-Gunnar Engström





V roce 1967, první japonský JIP monitor, ICU-80, instalovaný v
Tohoku University School of Medicine.

Intenzivní péče začíná před branami ICU!



- prevence je lepší jako léčba!
- časná identifikace rizikového pacienta – lepší management v dalším průběhu
- čas na diagnostiku a terapii
- čas na eventuelní diskuze stran EOL
- neidentifikovaný pacient.....**jste voláni až ke KPCR!**

Rozpoznání pacienta s rizikem rozvoje kritického pacienta

- rozpozнат kriticky nemocného pacienta není většinou těžké
- výzvou jsou pacienti s **rizikem** rozvojem kritického onemocnění
- možnost ovlivnění časné fáze onemocnění

Kdo vyvine symptomy později?

- mladí a zdraví pacienti
- imunosuprimovaní a oslabení

Pacientovy rezervy x akutnost onemocnění

METcall system

Kritéria pro aktivaci MET týmu (Medical emergency team):

1. zástava dechu či oběhu
2. akutní změna ve vitálních funkcích:
 - **ohrožení dýchacích cest**
 - **dechová frekvence <5 nebo >36**
 - **pulsová frekvence <40 nebo >120**
 - **systolický tlak (mmHg) <90**
 - **pokles v GCS o >2 body**
 - **opakované nebo protrahované křeče**
 - **pacient, který nesplňuje výše uvedená kritéria, ale o kterého máte vážné obavy! („divný pocit“)**

Early warning signs

A score of 3 or more results in referral

Score	3	2	1	0	1	2	3
HR		<40	41–50	51–100	101–110	111–130	130
SBP	<70	71–80	81–100	101–199		>200	
RR		<8		9–14	15–20	21–29	>30
TEMP		<35	35·1–36·5	36·6–37·4	>37·5		
CNS				A	V	P	U

A = alert; P = response to pain; V = response to verbal stimulus; U = unconscious; HR = heart rate; SBP = systolic blood pressure; RR = respiratory rate; TEMP = temperature; CNS = central nervous system.

(Morgan *et al.* 1997)

A: The senior ward nurse should contact the responsible doctor and inform them of a patient with:

Any three or more of the following:

- Respiratory rate ≥ 25 breaths/min (or < 10)
- Arterial systolic pressure < 90 mmHg
- Heart rate ≥ 110 beats/min (or < 55)
- Not FULLY alert and orientated
- Oxygen saturation $< 90\%$
- Urine output < 100 mL over last 4 hours

OR a patient not FULLY alert and orientated AND

respiratory rate ≥ 35 breaths/min OR heart rate ≥ 140 beats/minutes

Unless immediate management improves the patient, the doctor should consider calling the team.

Exceptionally (in emergency when responsible doctor not immediately available) the senior ward nurse may contact the team directly.

B: A doctor of registrar grade or above may call the team for any seriously ill patient causing acute concern. This will normally be carried out after discussion with the patient's consultant.

The consultant responsible for the patient must be informed as soon as practical that the team has been called.

Systém časné identifikace kritických hodnot dospělých

- Příznaky**
- TK systolický < 100 nebo > 170 mmHg
 - TK diastolický < 50 nebo > 100 mmHg
 - tepová frekvence > 100/min nebo < 50/min
 - SaO₂ < 90% při dýchání vzduchu
 - náhlá změna vědomí (kvalitativní, kvantitativní), porucha řeči nebo hybnosti
 - diuréza viz
 - laboratoř viz
 - krvácení do drénů viz

Reakce: 1 příznak → **VOLEJ OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE**

2 příznaky → **VOLEJ OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE
A RES**

Konzilium lékaře ARO:

A) Ponechání na místě, předpis léčebných opatření, stanovení časového limitu pro kontrolu

B) Překlad na RES

Kontrola lékařem ARO ve stanoveném časovém limitu:

A) Účinek léčebných opatření ponechat na místě

B) Účinek léčebných opatření překlad na RES

Vědomí

Volat vždy ošetřujícího lékaře:

- náhlá změna vědomí, porucha řeči nebo hybnosti
 - kvalitativní - náhlý neklid, zmatenosť, agrese
 - kvantitativní - pacient náhle neodpovídá na výzvu

Dýchání

Hodnocení dechové frekvence

	Dospělý	Dítě nad 12 let
bradypnoe	< 10 dechů/min	< 10 dechů/min
tachypnoe	> 25 dechů/min	> 25 dechů/min
	Dítě 3 - 12 let	Dítě 1 - 3 roky
bradypnoe	< 12 dechů/min	< 15 dechů/min
tachypnoe	> 25 dechů/min	> 30 dechů/min
	Kojenec	Novorozeneč
bradypnoe	< 20 dechů/min	< 20 dechů/min
tachypnoe	> 40 dechů/min	> 60 dechů/min

Volat vždy ošetřujícího lékaře:

- pokles SaO₂ pod 90% nebo o více než 10% hodnoty, kterou naposledy schválil lékař
- bradypnoe/tachypnoe viz tabulky, neordinuje-li OL jinak
- náhle vzniklá změna dýchacích pohybů

Oběh

Hodnocení tepové frekvence

Dospělý	
bradykardie	< 50/min
tachykardie	> 100/min

Volat vždy ošetřujícího lékaře:

- je-li tepová frekvence mimo uvedené meze a nestanovi-li OL jinak

Hodnocení krevního tlaku [mmHg]

Dospělý	
hypotenze	< 100 mmHg v systole nebo < 50 mmHg v diastole
hypertenze	> 170 mmHg v systole nebo > 100 mmHg v diastole

Volat vždy ošetřujícího lékaře:

- je-li hodnota TK mimo uvedené meze a nestanovi-li OL jinak

Rozmezí fyziologických hodnot tepové frekvence

[P/min]

Fyziologické hodnoty krevního tlaku

[mmHg]

		systolický	diastolický
nedonošenci	120 - 170	55 - 75	35 - 45
0 - 3 měsíce	100 - 150	65 - 85	45 - 55
3 - 6 měsíců	90 - 120	70 - 90	50 - 65
6 - 12 měsíců	80 - 120	80 - 100	55 - 65
1 - 3 roky	70 - 110	90 - 105	55 - 70
3 - 6 let	65 - 110	95 - 110	60 - 75
6 - 12 let	60 - 95	100 - 120	60 - 75
nad 12 let	55 - 85	110 - 135	65 - 85

Diuréza

Volat vždy ošetřujícího lékaře:

- nově vzniklá hematurie
- pokles diurézy pod 0,5 ml/kg/hod za poslední 3 hodiny, neordinuje-li OL jinak

Laboratoř

K⁺ > 6,5 mmol/l

INR > 5

Glykémie < 4 mmol/l

Krvácení do drénů


Volat vždy ošetřujícího lékaře:

- je-li hodnota výsledku vyšetření mimo uvedené meze a nestanovi-li OL jinak

Jaké jsou hlavní zásady pří příjmu na ICU?

1. zhodnocení pacienta
2. okamžitá terapie – resuscitace fyziologických funkcí
3. monitorace
4. vstupní vyšetření





- Immediate problem
- Physiological reserve
 - Exercise tolerance
 - Previous major illnesses
- Treatment
 - Definitive
 - Supportive



Zhodnocení A - airways

LOOK:

- cyanóza
- změna dechové frekvence a její charakter
- zapojení pomocných dýchacích svalů
- Cambell's sign (pohyb thyreoidní chrupavky dolů)
- úroveň vědomí

LISTEN:

- hlučné dýchání (chrčení, stridor, sípání, bublání)
- žádný zvuk – kompletní obstrukce

FEEL:

- snížené nebo nulový dýchání

Zhodnocení B - breathing

LOOK:

- cyanóza
- alterovaná dechová frekvence, vzorec, zástava
- hloubka a adekvátnost dýchání
- pocení
- zvýšená náplň krčních žil
- zapojení pomocných svalů
- pohyb trachey,
- porucha vědomí,
- periferní saturace O₂

LISTEN:

- dyspnoe
- nemožnost mluvení
- hlučné dýchání
- auskultace (poklep)

FEEL:

- symetrie a rozsah pohybu hrudníku
- pozice trachey
- krepitus
- distenze břicha



Zhodnocení C - circulation

LOOK :

- tepová frekvence
- krevní tlak
- periferní perfuze (bledá, studená kůže)
- vědomí
- anurie, oligurie

LISTEN:

- šelest, přídatné ozvy

FEEL:

- prekordiální pulsace
- periferní pulsový deficit
- kvalita, pravidelnost, symetrie pulsu



Zhodnocení C - circulation

NESTABILITA

- Makrocirkulace
- Mikrocirkulace

Zhodnocení D-disability

Zhodnocení vědomí:

AVPU škála:

- alert
- responds to voice
- responds to pain
- unresponsive


GCS skóre

Zornice a jejich reaktivita



- Depend on clinical presentation
- Useful “routine” investigations
 - Glucose
 - Electrolytes: Na, K, Ca, Mg, PO₄
 - Renal function tests
 - Liver function tests
 - Complete blood count
 - Clotting
 - ABG
 - CXR

	FÁZE I Iniciální kontakt – první minuty (primární zhodnocení) „Co je hlavní problém?“	FÁZE II Následné posouzení (sekundární zhodnocení) „Co je základní onemocnění?“
Anamnéza	Základní rysy událostí <ul style="list-style-type: none">• svědkové, personál, příbuzní• hlavní symptomy: bolest, dušnost, slabost• trauma?• operace?• léky/intoxikace?	Detailní informace <ul style="list-style-type: none">• současné potíže• chronické onemocnění, operace• léky a alergie• rodinná anamnéza• etické otázky (DNR)
Vyšetření	Look, Listen and Feel (ABCD) <ul style="list-style-type: none">• dýchací cesty• dýchání• oběh• vědomí	Strukurované zhodnocení orgánových systémů <ul style="list-style-type: none">• respirační• kardiovaskulární• břicho a urogenitální systém• CNS, muskuloskeletální• endokrinní, hematologický systém
Posouzení záznamů a dokumentace	Životní funkce <ul style="list-style-type: none">• tepová frekvence, rytmus• krevní tlak• dechová frekvence, pulzní oxymetrie• stav vědomí	Pacientova dokumentace <ul style="list-style-type: none">• pečlivě prostuduj záznamy• formulovat pracovní diagnózu• jasně formuluj a zaznamenej současný stav a události
Odběry a zobrazovací metody	<ul style="list-style-type: none">• Astrup (arteriální nebo venózní)• Glykémie• Laktát	<ul style="list-style-type: none">• Kompletní laboratoř dle případu• RTG• EKG• mikrobiologické odběry (pokud možno před ATB)
Léčba	Prováděj současně s předchozími kroky: <ul style="list-style-type: none">• O₂• intravenozní přístup +/- tekutiny• zhodnoť odpověď• ZEPTEJ SE NA RADU A POMOC!	Uprav terapii, zhodnoť odpověď a trend onemocnění <ul style="list-style-type: none">• specifická orgánová podpora dle potřeby• výběr vhodného umístění pacienta• konzilium



PARALELNÍ ČINNOST!



NEOPOUŠTEJ pacienta dokud není stabilní!

CLINICAL EXAMINATION OF THE CRITICALLY ILL PATIENT

1 Initial assessment

Airway

? Clear

Breathing

Distress

Rate

Chest movement

Auscultation

Circulation

Pulse:

Rate

Rhythm

Volume

Blood pressure:

Direct arterial
pressure

Peripheral perfusion:

Peripheral pulses

Temperature

Colour

Capillary refill


Disability

Conscious level:

Glasgow Coma Scale

Pupil responses

Localising signs



2 Immediate management

Airway:

Support, ? Intubate

Breathing:

Oxygen

Continuous positive airway
pressure (CPAP), non-invasive
ventilation (NIV)

Intubate and ventilate

Circulation:

Venous access

Fluids

Vasoactive drugs

3 Monitoring

Heart rate; ECG

Respiratory rate; SpO_2

BP—arterial line

Temperature

GCS; pupil size, reaction

Urine output

Central venous pressure

4 Initial investigations

Full blood count

Urea and electrolytes

Creatinine

Glucose

Arterial blood gas lactate

Coagulation

Cultures: blood, urine, sputum


Chest X-ray

ECG

Stanovení terapeutických cílů

1. Krátkodobé - fyziologické (v hodinách)

2. Dlouhodobé (nejčastěji ve dnech)



- Altered conscious state
- Hypotension
- Tachycardia
- Tachypnoea
- Cyanosis/hypoxia
- Oliguria
- Acidosis



MNEMOTECHNICKÉ POMŮCKY

FAST HUG

- Feeding/fluids
- Analgesia
- Sedation
- Thromboprophylaxis
- Head up position
- Ulcer prophylaxis
- Glycemic control

FAST HUGS BID

- Feeding/fluids
- Analgesia
- Sedation
- Thromboprophylaxis
- Head up position
- Ulcer prophylaxis
- Glycemic control
- Spontaneous breathing trial
- Bowel care
- Indwelling catheter removal
- Deescalation of antibiotics

Letters to the editor

Extend 'FAST HUG' with 'FAITH'

FAST HUG FAITH

FAITH

- Fluid balance
- Aperients
- Investigation and results
- Therapies
- Hydration.

Další modifikace FAST HUG

FAST HUG+S (S = Skin care, prevention of pressure ulcer)

FAST HUG(S) + BID OVER (S = Spontaneous breathing trial; B = bowel care; I= indewelling catheter removal; D= deescalation of antibiotics)

FAST HUG + EACH HOUR (E = Electrolytes; A = Airway; C = Catheters; H = Hematology; H = Hemodynamics; O = Oral care; U = Urine analysis; R = Relatives)

Abeceda

A – airway

B – breathing

C – circulation

D – disabilities

E – electrolytes

F – fluids

G – gut, glycaemic control

H – hematology

I – infections

L – lines

M – medication

N – nutrition

O – others

R – renal

Možné použití strukturované vizity:

- denní vizity
- ranní a odpolední „rounds“
- předávání pacienta (např. na sál)
- propouštění pacienta z ICU

ABC of late critical care

- **AWAKENING** – časné vysazení sedace
- **BREATHING** – SBT, tracheostomie, časné odpojování od UPV
- **COORDINATING/CHOICE** – rozhodování, koordinování péče – *Já jsem za pacient odpovědný!*
- **DELIRIUM MONITORING/MANAGEMENT** – prevence deliria + monitorace (CAM-ICU, ICDSC)
- **EARLY MOBILITY/EXERCISE** – radikální rehabilitace

Shrnutí

1. časná identifikace rizikového pacienta může minimalizovat rozvoj kritického onemocnění
2. hrozící kritické onemocnění má nespecifické příznaky – nejvýznamnější tachypnea!
3. resuscitace a snaha o stabilizaci fyziologických funkcí většinou předchází definitivní diagnózu a léčbu vyvolávajícího onemocnění
4. nepodceňovat anamnézu – odhad fyziologických rezerv a možné získání postoje k EOL otázkám
5. klíčové je klinické a laboratorní monitorování odpovědi na terapii!



Transport

Recommendations for the intra-hospital transport
of critically ill patients

Benoit Fanara, Cyril Manzon, Olivier Barbot, Thibaut Desmettre and Gilles Capellier*

Fanara et al. Critical Care 2010, 14:R87
<http://ccforum.com/content/14/3/R87>

Jedno z nejvíc „kritických“ míst
péče o kritického pacienta!!!



Cardiocirculatory:

- Severe hypotension or hypertension
- Arrhythmias
- Cardiac arrest
- Death

Respiratory:

- Severe hypoxia
- Bronchospasm
- Pneumothorax
- Extubation
- Selective intubation
- Patient-ventilator desynchronisation

CRITICALLY
ILL
PATIENT

Neurological:

- Agitation
- Intracranial hypertension

Hypothermia

Equipment malfunction:

electrical and/or oxygen failure

Human errors:

- Patient mix-up
- Unadapted emergency treatment

Co je nutné před transportem?

- Dokumentace a štítky
- Příprava a vybavení adaptované cíli transportu (MRI)
- dostatečné zásoby léků, O₂ a baterie!!!

A+B:

- pozice OTK a její fixace
- napojení pacienta na transportní ventilátor a nastavení terapie a alarmů s dostatečným předstihem
- s sebou: vše na intubaci, ambuvak + obličejobavá maska, přenosná odsávačka + katetry, spO₂, ETCO₂

C:

- samostatný intravaskulární přístup nebo větev (rychlé injekce, vasopresory):

Medikace (resucitační léky, sedace, analgetika, relaxancia, infuze)

- Nastavené a upravené alarmy na monitoru
- Vstupy a katetry (včetně hrudních drénů) nezaklemované, bezpečně zajištěné a nezapletené!

Co je nutné před transportem?

Transportní tým:

- minimálně tři osoby na doprovod, z toho jeden **zkušený** doktor, který pacienta **dobře** zná!

Organizace transportu:

- ověření časového harmonogramu vyšetření
- transportní cesta bez překážek, zajištění výtahů (telefon, karty)
- zjistit vybavení na cílovém místě (O_2 , elektrická síť, ventilátor, odsávačka)

Zajištění stability pacienta

Příprava upravená klinickému stavu konkrétního pacienta:

A+B - dýchání:

- elektivní intubace, zavedení hrudních drénů, synchronizace s UPV

C - oběh:

- optimalizace hemodynamiky (tekutiny, vasopresory)
- hemostáza

D – neurologický stav:

- kontrola zornic
- GCS
- ICP

S - Sedace:

- bolusy tlumení
- relaxace

Zkontroluj:

stabilizované fraktury, popáleniny a rány kryté

Zvýšená poloha hlavy (prevence nitrolení hypertenze a VAP)!

Co kontrolovat po příjezdu?

- A: Airways = ventilační systém (poloha OTK, insuflace manžety, okruh a funkce ventilátoru)
- B: Breathing = bilaterální auskultace, kontrola spO_2 , ETCO_2
- C: Circulation = kontrola TK a TF na monitoru
- D: Disconnect = přepoj O_2 a elektrické zařízení
- E: Eyes = na monitory vidí všichni členové týmu
- F: Fulcrum = kontrolní body

Předvídej a okamžitě jednej v případě nestability pacienta!

Take home message

- Tvá práce je týmová
- Nepotlačuj alternativní myšlení
- Bud' otevřený k lidem a myšlenkám
- Náš úkol je léčit, ne normalizovat laboratorní a fyziologické parametry
- Pamatuj, že léčíme konkrétního pacienta, jehož změněný stav vyžaduje úpravu strategie



Vyléčen. Ted už z Vás zůstalo opravdu jen zdravé jádro...

