

M U N I  
M E D

# Krevní tlak

Praktické cvičení z fyziologie (jarní semestr: 7. – 9. týden)

Studijní materiály byly vytvořeny za podpory projektu MUNI/FR/1474/2018

1 Fyziologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

# Křivka arteriálního krevního tlaku v průběhu tepového cyklu

## – Krevní tlak (TK): tlak krve na stěnu cévy

(arteriální TK: část energie systoly přeměněná na boční tlak působící na cévní stěnu)

## – Střední TK(stTK) : průměrná hodnota krevního tlaku v průběhu jednoho tepového cyklu (integrál tlakové křivky; **plocha nad stTK = plocha pod stTK** – viz křivka)

(stTK je dopočítávaná veličina, nejedná se o aritmetický průměr hodnot systolického (STK) a diastolického (DTK) tlaku, protože čas trvání systoly a diastoly v průběhu srdečního cyklu se liší)

$$\text{PTK} = \text{STK} - \text{DTK}; \text{stTK} \approx \text{DTK} + \frac{1}{3} \text{PTK}$$

## – Definice:


### – STK (systolický TK)

nejvyšší krevní tlak v průběhu tepového cyklu

### – DTK (diastolický TK)

nejnižší krevní tlak v průběhu tepového cyklu

– **Pozor:** hodnoty STK a DTK se liší v jednotlivých částech srdce a cévního systému




MUNI  
MED

# Krevní tlak

Krevní tlak je funkcí srdečního výdeje a periferního odporu

- STK je závislý především na SV
- DTK je závislý především na TPR




# Regulace krevního tlaku

- Krátkodobá – nejdůležitější zástupce: baroreflex
- Střednědobá – nejdůležitější zástupce: renin-angiotenzin-aldosteron systém (RAAS)
- Dlouhodobá – hormonální regulace objemu cirkulujících tekutin

# Regulace krevního tlaku – baroreflex

- Autonomní nervový systém: sympathicus ( $\uparrow$ TK, SF, SO a TPR) X parasympatikus ( $\downarrow$ TK, SF, SO a TPR)
- Funkce baroreflexu – regulace rychlých změn TK změnou SF a TPR
  - baroreceptory – sinus caroticus + sinus aorticus; afferentace: n.vagus, glosopharyngeus
- Srdeční větev baroreflexu:
  - Parasympatická eferentace: rami cardiaci nn. vagi inervující SA uzel
    - $\downarrow$  SF a tím i TK
  - Sympatická eferentace: nn. cardiaci - změny SF a kontraktility ( $\uparrow$ SF a tím i TK)
- Cévní větev baroreflexu:
  - eferentace: pouze sympatická inervace hladké svaloviny, především arterií
    - $\uparrow$  aktivity sympatiku  $\rightarrow$  vazokonstrikce a tím  $\uparrow$ TPR a naopak

(poznámka: vazokonstrikce malých arterií a arteriol, venokonstrikce -  
5 redistribuce objemu krve)



# Změny krevního tlaku

## – Krátkodobé vlivy

- množství krve - vliv na systolický objem/srdeční výdej (krvácení, dehydratace)
- vnější tlak na cévy – intratorakální a intraabdominální tlak (kašlání, defekace, porod, umělá ventilace)
- Poloha – ortostatická/klinostatická reakce (redistribuce krve v důsledku gravitace)
- CNS – emoce, stres, psychická zátěž,...
- fyzická zátěž – charakter zvýšení krevního tlaku závisí na intenzitě, délce a typu zátěže
- teplo (vazodilatace - pokles TPR), chlad (vazokonstrikce - nárůst TPR)
- alkohol, léky,...

## – Dlouhodobé vlivy

- vliv věku (nejrychlejší růst do ukončení puberty, v dospělosti lehký růst především STK)
- vliv pohlaví (muži mívají vyšší TK)
- Vrozené dispozice

# Metody měření arteriálního krevního tlaku

## v praktiku:

Palpační  
(tonometr)



Oscilometrická



Auskultační  
(tonometr a  
fonendoskop)



## další možnosti:

24-hodinové měření krevního tlaku

Fotopletysmografická (volume-clamp metoda, Peňázova)



# Základní princip: Laminární / turbulentní proudění

(Korotkovův fenomén detekovaný auskultačně, oscilace detekované oscilometricky)

laminární proudění  $Re < 2000$   
turbulentní proudění  $Re > 3000$

**Reynoldsovo číslo Re:** pravděpodobnost vzniku turbulentního proudění


$v$ : rychlosť toku krve

$S$ : plocha průřezu cévy ( $\pi \cdot r^2$ )

$\rho$ : hustota kapaliny

$\eta$ : viskozita kapaliny  
(nižší u anémie)

$$Re = \frac{v \cdot S \cdot \rho}{\eta}$$




situace těsně za zúžením arterie:

8

$$S_1 < S_2 \text{ a } v_1 \approx v_2 \rightarrow Re_1 < Re_2 \rightarrow \text{turbulentní proudění}$$

# Princip měření TK



# Zásady měření krevního tlaku

- Prostředí: příjemná teplota místnosti, klid
- Poloha: pacient sedí s opřenými zády, obě nohy spočívají na podlaze, předloktí spočívá na podložce, paže je ve výšce srdce
- Přiměřená velikost manžety, správné umístění
- Měření probíhá v klidu a začíná po 5 – 10 min klidu
- Měření auskultační metodou
  - Manžetu nafukujeme na tlak o 30 mmHg vyšší než je tlak, při kterém vymizel radiální pulz
  - Rychlosť snižování tlaku v manžetě je 2 – 3 mmHg/s
  - Tlak se odečítá s přesností na 2 mmHg
- Tlak má být měřen 3x v alespoň pětiminutových rozestupech a orientujeme se podle průměru ze dvou posledních měření

<b>metoda</b>	<b>výhody</b>	<b>nevýhody</b>	<b>měřená hodnota</b>
auskultační	<ul style="list-style-type: none"> <li>• přesnější odhad STK/DTK</li> <li>• jednoduchá, nevyžaduje el. napájení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• subjektivní, náročná na zkušenosť a hlučnost prostředí</li> <li>• STK/DTK z různého srdečního cyklu</li> </ul>	STK a DTK
osciloskopická	<ul style="list-style-type: none"> <li>• přesnější odhad stTK</li> <li>• automatická, rychlá</li> <li>• lze provádět laikem, levná (domácí měření)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DTK/STK je dopočítán (závislost na modelu pro výpočet, vliv tvaru pulzové křivky)</li> <li>• STK/DTK z různého srdečního cyklu</li> <li>• není možné použít u arytmie</li> </ul>	stTK, někdy také STK (dle typu přístroje)
24 – hodinový krevní tlak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• záznam TK v průběhu celého dne</li> <li>• vyloučení hypertenze bílého pláště</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rušivý vliv nafukující se manžety (hlavně během spánku)</li> <li>• STK/DTK z různého srdečního cyklu</li> </ul>	hodnoty měřené každých 15 – 60 min
fotopletysmografická (Peňázova)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kontinuální záznam TK</li> <li>• možnost výpočtu STK a DTK tep po tepu (analýza variability TK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obvykle měření z prstu, nutnost dopočítání brachiálního TK</li> <li>• dražý přístroj</li> </ul>	kontinuální záznam TK

# Diagnostika hypertenze

krevní tlak	STK [mmHg]	DTK [mmHg]	možné komplikace
normální	optimální	<120	<80
	normální	120 – 129	80 – 84
	vyšší normální	130 – 139	85 – 90
hypertenze	1. stupně	140 – 159	90 – 99 bez orgánových změn
	2. stupně	160 – 179	100 – 109 hypertrofie L komory, proteinurie, angiopatie,...
	3. stupně	> 180	> 110 morfologické a funkční změny některých orgánů, retinopatie, srdeční, renální nedostatečnost, ischemie CNS, krvácení do CNS,...

- izolovaná systolická hypertenze STK > 140 a DTK < 90
- vyšší normální tlak - doporučuje se každoroční sledování
- domácí měření pro vyloučení hypertenze bílého pláště


hypertenze je diagnostikována: průměrný TK ze 4 – 5 prohlídek je > 140/90; TK zjištěné během domácího měření opakovaně > 135/80; 24 – hodinové měření ukázalo průměrné TK > 130/80

# Změny krevního tlaku během fyzické zátěže

- nárůst krevního tlaku závisí na charakteru a velikosti a délce zátěže
- aktivace sympatiku: změny v kardiovaskulárním systému slouží pokrytí metabolických nároků pracujících svalů
- vliv dynamické zátěže na krevní tlak
- zvýšení srdečního výdeje → vzestup STK
- redistribuce krve v těle – metabolická vazodilatace ve svalu (zvýší průtok krve svalem), vazokonstrikce v GIT, kůži a ledvinách → zachování či lehká změna DTK (v závislosti na míře poklesu TPR)
- vazokonstrikce v kůži je dočasná, než převládnou termoregulační mechanismy
- DTK se zvyšuje při izometrické práci svalu (např. vzpírání)
- po zátěži dochází k poklesu TK na původní nebo lehce nižší hodnotu, průtok krve svalem do zotavení zůstává zvýšený
- rychlosť zotavení je daná tonem parasympatiku (lze zvýšit tréninkem)

# 24-hodinový tlakové měření krevního tlaku



Pokles krevního tlaku o 10 až 15% v nočních hodinách



M U N I  
M E D

## Doplňky ke krevnímu tlaku

## krevní tlak



# Arteriální oběh – zahradní analogie

## Srdce

Srdeční výdej

### Baroreflex

- Pokles arteriálního tlaku vede k aktivaci sympatiku → zvýšení srdeční frekvence (a celého srdečního výdeje) a cévní rezistence
- Nárůst arteriálního tlaku vede k aktivaci parasympatiku → snížení srdeční frekvence (a celého srdečního výdeje) a nepřímo cévní rezistence



Primární účel nervové regulace TK je udržení konstantního perfuzního tlaku v mozku.

# Změny kardiovaskulárního systému při zátěži

