

Imunologické laboratorní metody

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ IMUNOLOGICKÝCH LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

- **Serologická vyšetření**
 - základním materiélem pro vyšetření
 - **SÉRUM**
- **Buněčná vyšetření**
 - základním materiélem pro vyšetření
 - **PERIFERNÍ ŽILNÍ KREV**
- **Další zdroje materiálu pro imunologické vyšetření**
 - mozkomošní mok, lymfatické uzliny, bioptické vzorky orgánů, kostní dřeň, bronchoalveolární laváž

ODBĚR MATERIÁLU K IMUNOLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ

SEROLOGICKÁ VYŠETŘENÍ – proces získávání séra

1. odběr venózní srážlivé krve



2. centrifugace



3. přenesení séra do jiné zkumavky



4. uchování séra k dalšímu použití

- 2 týdny při teplotě 4 °C
- měsíce při teplotě -20 °C
- roky při teplotě -80 °C

ODBĚR MATERIÁLU K IMUNOLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ

BUNĚČNÁ VYŠETŘENÍ – proces získávání buněk


protisrážlivé činidlo EDTA



protisrážlivé činidlo heparin



Krev odebranou pro buněčná vyšetření není většinou možno skladovat delší dobu.



Vyšetření je nutné provést do několika desítek minut (vyšetření fagocytárních funkcí) až několika hodin (vyšetření počtu a funkce lymfocytů).

PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ FÁZE SEROLOGICKÉ REAKCE

Primární fáze serologické reakce

- *pokud je zkoumaná protilátka v séru přítomna, dochází k vazbě protilátky na antigen*
- ***není patrná pouhým okem***

Sekundární fáze serologické reakce

- *uplatňuje se multivalence antigenu a polyvalence protilátek*
- *vzniká prostorový komplex velkého počtu molekul antigenu a protilátek o vysoké molekulové hmotnosti*

PŘEHLED METOD PRO STANOVENÍ ANTIGENU NEBO PROTILÁTKY

- **vizualizace pomocí sekundární fáze reakce**
 - **AGLUTINACE** (*přímá, nepřímá*)
 - **PRECIPITACE** (*jednoduchá, v kombinaci s elektroforézou, imunofixace*)
- **vizualizace pomocí následné detekce**
 - **IMUNOFLUORESCENCE**
 - **IMUNOANALÝZA** (*RIA, EIA, řada modifikací*)
 - **IMUNOBLOT, IMUNODOT**

CITLIVOST METOD K PRŮKAZU PROTILÁTEK

precipitace

30 µg/ml

aglutinace

1 µg/ml

radioimunoassay a ELISA

1 pg/ml

POLYKLONÁLNÍ a MONOKLONÁLNÍ PROTIHLÁTKY

- **POLYKLONÁLNÍ PROTIHLÁTKY**
 - Směs imunoglobulinových molekul, jejichž vazebná místa nesou specifitu vůči různým epitopům na celé molekule antigenu
 - **Získávají se obvykle imunizací zvířat**
- **MONOKLONÁLNÍ PROTIHLÁTKY**
 - Produkt jednoho klonu B-lymfocytů, vykazují jedinečnou specifitu proti jednomu epitopu na molekule antigenu
 - **Získávají se obvykle metodikami *in vitro***

a g l u t i n a c e

a g l u t i n a c e


princip reakce

antigen KORPUSKULÁRNÍ POVAHY

Vazbou dvoj a vícevazebných protilátek na povrch antigenu dojde k překonání odpudivých, způsobených negativním nábojem na povrchu částic (zeta potenciál), a vytvoří se mezi nimi můstky ...

*... vzniká **AGLUTINÁT***

- ***snadná vizualizace proběhlé reakce***
 - díky velikosti antigenu
 - díky průběhu reakce v tekutině



a g l u t i n a c e

faktory ovlivňující kvalitu aglutinační reakce

- **dostatek protilátek**
 - příliš velké ředění protilátek → aglutinace neproběhne
- **přítomnost protilátek proti různým epitopům**
 - rozdíl v aglutinaci mezi monoklonálními a polyklonálními protilátkami
- **vzdálenost mezi jednotlivými antigenními částicemi**
 - odpudivé elektrické síly na povrchu částic klesají se čtvercem vzdálenosti

a g l u t i n a c e

přímá a nepřímá

přímá aglutinace

antigeny se nacházejí přímo na zkoumané částici

průkaz krevních skupin, přímý Coombsův test, určování izolovaných bakteriálních kmenů (zejména ze skupiny enterobaktérií), Widalova reakce, Weil-Felixova reakce, průkaz některých zoonoz, ...

nepřímá aglutinace

zkoumaný antigen je navázán na povrchu vhodných makromolekulárních částic

latex-fixační test, nepřímý Coombsův test, rychlé testy pro ambulantní vyšetření (ASLO), ...

a g l u t i n a c e

určování krevních skupin

ANTIGENY NA POVRCHU ERYTROCYTU

polysacharidové
skupinový systém AB0 (antigen A, antigen B)
skupinový systém Lewis, P a li

glykoproteinové
skupinový systém Rh (antigen D)
skupinový systém MNSs, Lutheran, Kell, Duffy, Diego

precipitace

precipitace

princip reakce


antigen NEKORPUSKULÁRNÍ POVAHY o nízké molekulové hmotnosti

Antigen o nízké molekulové hmotnosti je rozpustný v kapalině a tvoří pravý roztok a při optimálním poměru antigenu a protilátky dochází ke vzniku makroskopicky zřetelné prostorové mřížky tvořené imunokomplexy.

... vzniká **PRECIPITÁT** →


PRECIPITACE PROBÍHÁ ...

- v kapalinách (nefelometrie, turbidimetrie)
- v gelech (vstřícná a radiální imunodifuze)




precipitate

... v gelech



*antigen a protilátky difundují
gelem na podkladě koncentračního
gradientu*




*v místě ekvimolární koncentrace
antigenu a protilátky ...*

*... vzniká **precipitační linie***

precipitace

... v kapalinách



NEFELOMETRIE

*měření rozptylu
viditelného světla*

TURBIDIMETRIE

měření úbytku prošlého světla

E L I S A

E L I S A

enzyme-linked immunosorbent assay

princip reakce

ke zjištění koncentrace antigenu nebo protilátky

k detekci reakce mezi antigenem a protilátkou se používá **enzym**
(konjugát zvířecí protilátky proti lidské protilátkce IgG, IgA nebo IgM značené enzymem)

Použití v klinické praxi:

- v současnosti zřejmě nejvíce používaná laboratorní metoda v imunologických a klinických laboratořích
- průkaz protilátek (antibakteriálních, antivirových, autoprotilátek) nebo antigenů
- **vysoká citlivost testu umožňuje průkaz analytů o nízké koncentraci**
- ELISA není vhodná k detekci analytů o vyšší koncentraci (např. koncentrace sérových imunoglobulinů) – vzhledem k nutnosti vysokého ředění vzorků možnost velké chyby stanovení!

E L I S A


enzyme-linked immunosorbent assay

princip reakce

ke zjištění koncentrace antigenu nebo protilátky

- vazba **antigenu** na pevnou fázi (jamka mikrotitrační destičky)
 - inkubace a následné promytí destičky
- aplikace **séra s předpokládaným výskytem protilátek** proti vyšetřovanému antigenu (dojde k vazbě protilátky na antigen)
 - inkubace a následné promytí destičky
- aplikace **konjugátu** zvířecí (myší, králičí, ...) protilátky proti lidskému IgG, IgA nebo IgM konjugované s enzymem
 - inkubace a následné promytí destičky
- aplikace **substrátu** (bezbarvý substrát → enzym → barevný produkt)
 - inkubace
- zastavení probíhající enzymatické reakce
- změření absorbance jamek spektrofotometricky (intenzita výsledného zbarvení je v určitém rozmezí koncentrací přímo úměrná množství navázané protilátky)

Stanovení Ag metodou ELISA



◇ stanovovaný antigen

== primární vazebná protilátká

[E] enzym


sekundární vazebná protilátká

konjugát

oooo bezbarvý substrát

●●● barevný produkt

Stanovení Ab metodou ELISA



◇ antigen

== protílátka ze vzorku


□ enzym

—□— protílátka proti protílátkám (anti-Ig)

□—□— konjugát

oooo bezbarvý substrát

●●● barevný produkt



ELISA READER



i m u n o f l u o r e s c e n c e

imunofluorescence

princip reakce

zjištění přítomnosti antigenu nebo autoprotilátky

k detekci přítomnosti antigenu nebo protilátky se používá ***fluorochrom***
(konjugát zvířecí protilátky proti antigenu nebo proti lidské protilátkce ve třídě IgG, IgA nebo
IgM značené flourochromem)

PŘÍMÁ IMUNOFLUORESCENCE


- detekce přítomnosti ***antigenu nebo protilátky ve tkáních*** pomocí protilátek značených flourochromem
- diagnostika puchýřnatých chorob, SLE, porfyrií, vaskulitid, glomerulonefritid a podobně

NEPŘÍMÁ IMUNOFLUORESCENCE



- detekce přítomnosti specifických ***protilátek v séru*** tak, že protilátky přítomné v séru pacienta jsou po vazbě na antigen dárcovské tkáně označené zvířecí protilátkou proti lidským IgG, IgA a IgM imunoglobulinům značenou flourochromem
- detekce přítomnosti autoprotilátek

Přímá a nepřímá imunofluorescence


Přímá imunofluorescence




Nepřímá imunofluorescence



ANA
Positive granular type



ANA – homogenous type



e l e k t r o f o r é z a

e l e k t r o f o r é z a

princip metodiky


- nabité částice se pohybují v elektrickém poli
- rychlosť pohybu častic je závislá na velikosti celkového povrchového náboje, velikosti a tvaru molekuly a její koncentraci v roztoku

NATIVNÍ GELOVÁ ELEKTROFORÉZA BÍLKOVIN

- bez denaturačních činidel
- proteiny migrují gelem podle svého celkového náboje, velikosti a tvaru (citlivost elektroforézy je dána charakterem pórů gelu)
- **elektroforéza sérových bílkovin (rozdělení proteinů plazmy na 5-6 frakcí)**
- **Využití elektroforézy v klinické praxi:**
- analýza a dělení směsí bílkovin, charakterizace povrchů organismů (bakterií, virů a podobně), diagnostika monogenních chorob a podobně


elektroforéza

Aplikace séra
pacientů do
elektroforetických
dráh ...



... rozdělení
sérových
proteinů dle
náboje, proteinů
a velikosti ...

elektroforéza sérových bílkovin



albumin

alfa 1 globulin

alfa 2 globulin

beta 1 globulin
beta 2 globulin

gama globulin

Western blot

W e s t e r n b l o t

i m u n o b l o t

princip metodiky

elektroforetické dělení bílkovin a jejich následní přenesení na povrch membrány a typizace specifickými protilátkami

1. fáze

- rozdělení směsi antigenů elektroforézou na gelu

2. fáze

- přenos rozdělených antigenů na vhodnou matrici
- immobilizace antigenů a zablokování nespecifických vazebných míst
- vizualizace antigenů radiograficky, barevnou reakcí, fluorescenčně (specifické protilátky → immunoblotting)
- **Využití v klinické praxi:**
- testy na HIV pozitivitu, definitivní test pro BSE, konfirmační test pro hepatitidu B, diagnostika boreliových infekcí

výsledný protokol blotu ...

Date: Th 18. Jul 2013
Patient: 13711

Antigene: ANA
Antibodies: IgG

Positive Bands:

✓ La/SS-B45:	49 %	+
✓ RO/SS-A52:	75 %	++
✓ M2-74:	80 %	++

Cutoffs:
0 % - 14 % = negative
15 % - 24 % = (+) indeterminate
25 % - 49 % = + weakly positive
50 % - 99 % = ++ positive
100 % = +++ highly positive

control band
NuMA
Scl70
Ku86
ACA80
Ku76
M2-74
RNP70
RNP70
RNP70
RO/SS-A60
Jo1
RO/SS-A52
La/SS-B45
Histon1
rRNP38
RNP33
SmB'
PM/Scl
SmB

RNP22

SmD
ACA17

baseline

Buněčné laboratorní imunologické techniky

ZÁKLADNÍ SLOŽKY IMUNITNÍHO SYSTÉMU

Imunitní reakce je zajišťována různými druhy buněk a molekul a jejich vzájemnými interakcemi.

Buňky imunitního systému spolu s buňkami pojivovými a dalšími strukturami tvoří funkční a anatomické celky ...

- ***lymfatické tkáně a orgány***
- ***buňky imunitního systému***
- ***molekuly imunitního systému***

DIFERENCIÁLNÍ KREVNÍ OBRAZ

odběr nesrážlivé krve do EDTA

	<i>kojenci</i>	<i>děti</i>	<i>dospělí</i>
LEUKOCYTY	$9 - 15 \times 10^9/l$	$8 - 12 \times 10^9/l$	$4 - 9 \times 10^9/l$
GRANULOCYTY/POLYMORFONUKLEÁRY	%	%	%
<i>neutrofilní granulocyty</i>	25 - 65	35 - 70	55 - 70
• segmenty	22 - 65	25 - 65	50 - 70
• tyče	0 - 10	0 - 10	3 - 5
<i>eozinofilní granulocyty</i>	1 - 7	1 - 5	2 - 4
<i>basofilní granulocyty</i>	0 - 2	0 - 1	0 - 1
MONONUKLEÁRNÍ LEUKOCYTY	%	%	%
<i>lymfocyty</i>	20 - 70	25 - 50	25 - 40
<i>monocyty</i>	7 - 20	1 - 6	2 - 6

CD klasifikační systém (Paříž 1982)

CD znaky (CD = cluster of differentiation)

- molekuly buněčných membrán prokazované monoklonálními protilátkami (metodikou průtokové cytometrie)
- **dnes známých více než 350 CD znaků**

(9th International Conference on Human Leukocyte Differentiation Antigens (HLDA9), březen 2010)

- **Využití v klinické praxi:** vyšetření absolutního a relativního zastoupení buněčných subpopulací pomocí průtokové cytometrie (v imunologii rutinně vyšetření T-lymfocytárních, B-lymfocytárních subpopulací a NK buněk)
- **Odběr:** nesrážlivá krev (EDTA)

LYMFOCYTÁRNÍ SUBPOPULACE	CD ZNAKY	PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ Z LYMFOCYTU
T lymfocyty	CD3⁺	58 – 85 %
Th lymfocyty	CD3 ⁺ CD4 ⁺	30 – 60 % z CD3 ⁺
Tc lymfocyty	CD3 ⁺ CD8 ⁺	15 – 35 % z CD3 ⁺
B lymfocyty	CD19⁺	7 – 23 %
NK buňky	CD16⁺/56⁺	6 – 20 %

PŘEHLED BUNĚČNÝCH IMUNOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ

V rámci imunologického vyšetření buněčných subpopulací stanovujeme:

- **absolutní a relativní počty buněk imunitního systému**
 - *Vycházíme ze stanovení celkového počtu leukocytů a diferenciálního krevního obrazu (absolutní a relativní počet lymfocytů, monocytů, granulocytů)*
- **funkci buněk imunitního systému**

Vyšetření relativního a absolutního zastoupení lymfocytárních subpopulací


PRŮTOKOVÁ CYTOMETRY

- využívá principu **přímé imunofluorescence**
- buňky jsou inkubovány s protilátkou proti konkrétním CD znakům na povrchu buněk imunitního systému, která je označena fluorescenčním barvivem
- buňky laminárně proudí tryskou přístroje vystaveny laserovému paprsku světla


Průtokový cytometr




Průtoková cytometrie




(F1)[Ungated] Z0051674.LMD : SS/FS






(F1)[A] 20051674.LMD : FL4 LOG/FL3 LOG



(F1)[A] 20051674.LMD : FL4 LOG/FL3 LOG



Funkční vyšetření lymfocytárních subpopulací in vitro

PROLIFERAČNÍ SCHOPNOST LYMFOCYTŮ

jeden z fyziologických jevů buněčné aktivace

- Lymfocyty aktivovány
 - **Polyklonálními mitogeny**
 - pro B lymfocyty
 - pokeweed mitogen (PWM)
 - pro T lymfocyty
 - phytohemagglutinin (PHA)
 - konkanavalin A (ConA)
 - **Specifickými antigeny**
 - tuberkulin
 - tetanický toxoid