


# Praktikum 2

Velké slinné žlázy  
Tvrdé tkáně (přehled), TMJ




# Struktura slinných žláz

**Vazivo** – pouzdro, septa, řídké vazivo


**Parenchym** – lalůčky

- sekreční oddíly: serózní aciny, mucinózní tubuly nebo tubuly s Gianuzziho lunulami
- vývody: vsunuté, žíhané (interlobulární vývody v septech mezi lobuly)





## Serózní aciny

BM, myoepiteliové a serózní buňky





## Mucinózní tubuly

BM, myoepiteliové a mucinózní buňky




## Tubuly s Gianuzziho lunulami






# Myoepitelové buňky

- Schopné kontrakce
- Desmosomy
- Vegetativní řízení





# Žlázové vývody

- **Intercelulární** (*nemají vlastní stěnu, mezibuněčný prostor*)
- **Vsunuté** (*jednovrst. plochý ep., jen v serózních a smíšených žlázách*)
- **Žíhané** (*jednovrst. kubický ep.; bazální labyrinth → žíhání*)
- **Interlobulární** (*jednovrst. – vrst. cylindr. ep., probíhají v septech*)
- **Hlavní** (*dvouřadý nebo vrst. cylindrický. ep.*)




## Vsunuté vývody

Úzký a tenkostěnný kanálek, na preparátech kolabovaný


Stěna: bazální membrána, myoepitelové buňky a jednovrstevný plochý až nízce kubický epitel

Početné jsou u serózních žláz

(buňky vsunutých vývodů vylučují do sliny makromolekulární látky: lysozym + lactoferrin)



Copyright © 2003, Mosby, Inc., All rights reserved.




## Žíhané vývody

Širší než vsunuté vývody (v preparátech snadno nalézt), obvykle uprostřed lalůčku (i na okraji)

Stěna: Bazální membrána a jednovrstevný nízce cylindrický epitel



Buňky se intenzivně barví kyselými barvivy, **na apexech mikroklky, báze buněk vykazují radiální žíhání (bazolaterální labyrinth)**

V cytoplazmě cytokeratinová filamenta




Glandula submandibularis: SP-serózní aciny, ŽV-žíhaný vývod, E-erytrocyti v cévě. Massonův žlutý trichrom.

Buňky žíhaných vývodů upravují v sekretu obsah vody a elektrolytů ( $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ). Proti koncentračnímu gradientu resorbce  $\text{Na}^+$ , a  $\text{Cl}^-$ ; po spádu sekrece  $\text{K}^+$  a  $\text{HCO}_3^-$ - nervová kontrola




Copyright © 2003, Mosby, Inc. All rights reserved.


## Žíhaný vývod – bazální labyrinth



**Baze epitelové buňky:**  
Invaginace cytoplasmatické membrány,  
četné mitochondrie



epitelová buňka



## Interlobulární vývody a hlavní vývod

### Interlobulární vývody

probíhají ve vazivových septech mezi lalůčky (cylindrický event. dvouřadý cylindrický epitel)

Vznikají spojením několika žíhaných vývodů a jsou **vystlány vysokým jednovrstevným cylindrickým**, v terminálních úsecích i **dvouřadým nebo vrstevnatým cylindrickým epitelem**


### Hlavní vývody

Dvouřadý nebo vrstevnatý cylindrický epitel s pohárkovými buňkami

*Ductus parotideus*

*Ductus submandibularis*

*Ductus sublinguales (major et minores)*




## Hlavní vývody



Dvouřadý nebo vrstevnatý cylindrický epitel

V epitelu jsou pohárkové buňky


Stěna zesílena hustým kolagenním vazivem,  
popř. i hladkými svalovými buňkami




Ductus Rivini (V) s dvouřadým cylindrickým epitelem v septu *gl. sublingualis*. Massonův žlutý trichrom.




Copyright © 2003, Mosby, Inc., All rights reserved.







# Sialendoscopy





To help treat this problem obstructive stones can be removed from the parotid salivary duct. A miniature endoscope is introduced through the duct to locate the stone or stones in a procedure called sialendoscopy.



# Glandula parotis


- čistě serózní žláza
- 14 - 28 g
- pouzdro, septa a lalůčky
- serózní aciny, vývody zastoupeny všemi úseky – vsunuté vývody dlouhé a žíhané úseky početné
- ductus parotideus (Stenoni) - 2. horní molár (Steno/Stensen, Niels)
- adipocyty

















## Glandula submandibularis

- **SMÍŠENÁ** tuboalveolární žláza s převahou **SERÓZNÍ** složky
- 10-15 g, má vlastní vazivové pouzdro
- serózní aciny - asi 80 %, zbytek mucinózní tubuly s **Gianuzziho lunulami**
- vsunuté i žíhané vývody
- **ductus submandibularis** (Whartoni) - **frenulum linguae**











## Glandula sublingualis

- **SMÍŠENÁ** tuboalveolární žláza s převahou **MUCINÓZNÍ** složky
  - 2g
  - vpředu na dně ústní dutiny poblíž střední roviny na m. mylohyoideus
  - neúplné pouzdro
  - mucinózních tubuly, **serózní aciny vzácné**, místo nich tubuly s **Gianuzziho lunuly**
  - chybějí vsunuté vývody, žíhané ano, ale málo a krátké
  
  - **ductus sublingualis major** (Bartholini)
  - **ductus sublinguales minores** (Rivini)
- podél plica sublingualis








## **gl. sublingualis**



# gl. apicis lingue

10 mm





Lokalizace		Název	Typ	Velikost
Rty		gll. labiales sup. et inf.	smíšené, přev. mucinózní	malé
Tváře		gll. buccales	smíšené, přev. mucinózní	malé
		gll. molares (retromolares)	smíšené, přev. mucinózní	malé
		<b>GL. PAROTIS</b>	serózní	<b>VELKÁ</b>
Patro	<b>tvrdé</b>	gll. palatinae (žlázová zóna )	mucinózní	malé
	<b>měkké</b>	gll. palatinae	mucinózní	malé
Jazyk		gl. apicis lingue (Blandini-Nuhni)	smíšená, přev. mucinózní	malá/ velká
		žlázky Ebnerovy (gll. papillae vallatae)	serózní	malé
		žlázky Weberovy (gll. linguales post.)	mucinózní	malé
Dno dutiny ústní		<b>GL. SUBMANDIBULARIS</b>	smíšená, přev. serózní	<b>VELKÁ</b>
		<b>GL. SUBLINGUALIS</b>	smíšená, přev. mucinózní	<b>VELKÁ</b>

## Porovnání tvrdých zubních tkání (a lamelózní kosti)

	sklovina	zubovina	cement	lamelózní kost
<b>barva</b>	bílá (až namodralá)	slonová kost	žlutohnědá	žlutohnědá
<b>anorganická komp.</b> váh. % (obj. %)	96 (86)	70 (45)	61 (33)	45 (23)
<b>organická komp.</b>	1 (2)	20 (30)	27 (31)	30 (37)
<b>H<sub>2</sub>O</b>	3 (11)	10 (25)	12 (36)	25 (40)
<b>kolagenní vlákna</b>	nejsou	ano (kolmo na dentinové tubuly)	ano (plst')	ano (v lamele stejná orientace)
<b>buňky</b>	<b>Ameloblasty</b> (v dospělosti chybí)	<b>Odontoblasty</b> (na pulpárním povrchu dentinu)	<b>Cementoblasty</b> (cementocyty)	<b>Osteoblasty</b> (osteocyty)
<b>krevní cévy</b>	ne	ne	ne	<b>ano</b> (v Haversových kanálcích)
<b>nervy</b>	ne	<b>ano</b> (penetrují do dentinových tubulů)	ne	<b>ano</b> (v Haversových kanálcích)

# **Postupy užívané ke studiu mikroskopické stavby zubů**




ve světelné mikroskopii se užívají 2 způsoby zpracování:


- 1. zubní výbrusy**
- 2. obarvené řezy zhotovené z odvápněného zuba**

## **1. Zubní výbrusy**

50 - 70  $\mu\text{m}$  silné ploténky zhotovené broušením







## 2. Obarvené řezy z odvápněného zuba

Příprava: odvápnění zuba, zalití zuba, zhotovení a obarvení řezů

**Odvápnění - dekalcifikace zuba:** odvápňovací činidla převedou nerozpustné vápenaté soli (fosfát a karbonát) na soli ve vodě rozpustné  
doba potřebná k odvápnění závisí na velikosti objektu a na druhu dekalcifikační tekutiny a činí několik dnů, týdnů až měsíců

**dekalcifikační tekutiny:**

➤ **kyseliny** (např. 5 % kyselina dusičná, 5 % kyselina trichlórooctová a 22 - 23 % kyselina mravenčí) - **1 týden**

Ničí antigeny


➤ **komplexotvorné sloučeniny** - EDTA - etyléndiamintetraoctová kyselina (Chelaton, Komplexon) - **4 týdny – 3 měsíce**

velmi dobře zachovávají strukturu tkáně i její barvitelnost

**zalití** – „na zmrzlo“ nebo parafin

**krájení** – mikrotom nebo cryotomu

## Obarvený řez z odvápněného zubu




!

na výbrusech - nejsou zachovány  
měkké tkáně

na odvápněných zubech chybí  
sklovina

# Zub – kořen






**Sulcus gingivalis**


**Gingiva libera (1)**

Paramarginální rýha


**Gingiva affixa (2)**

**Gingivodentální uzávěra**  
(Gottliebova těsnící epitelová  
manžeta)








**Šíkmý řez dentinem s dentinovými kanálky. SEM, primární zvětšení 1 500x**



**Dentin na lomu: vlevo dentinové tubuly podélně, vpravo—dentinové tubuly příčně se i zbytky Tomesových vláken. SEM, primární zvětšení 1 500x**







# Preparáty

gl. parotis	8
gl. submandibularis	9
gl. sublingualis	10
gl. apicis linguae	2

## TMJ

Lokalizace		Název	Typ	Velikost
Rty		gll. labiales sup. et inf.	smíšené, přev. mucinózní	malé
Tváře		gll. buccales	smíšené, přev. mucinózní	malé
		gll. molares (retromolares)	smíšené, přev. mucinózní	malé
		GL. PAROTIS	serózní	VELKÁ
Patro	tvrdé	gll. Palatinae (žlázová zóna )	mucinózní	malé
	měkké	gll. palatinae	mucinózní	malé
Jazyk		gl. apicis lingue (Blandini-Nuhni)	smíšená, přev. mucinózní	malá/ velká
		žlázky Ebnerovy (gll. papillae vallatae)	serózní	malé
		žlázky Weberovy (gll. linguales post.)	mucinózní	malé
Dno dutiny ústní		GL. SUBMANDIBULARIS	smíšená, přev. serózní	VELKÁ
		GL. SUBLINGUALIS	smíšená, přev. mucinózní	VELKÁ