

Klasifikace parodontitidy (Tonetti et al. 2018)

Stadium		stadium I	stadium II	stadium III	stadium IV
závažnost	interdentální ztráta attachmentu v nejhorším místě	1 – 2 mm	3 – 4 mm	≥ 5 mm	
	rtg ztráta kosti	koronální třetina (≤ 15 %)	koronální třetina (15 – 30 %)	zasahuje do střední nebo apikální třetiny kořene	
	ztráta zubů v důsledku parodontitidy	bez ztráty zubů		≤ 4 zuby	≥ 5 zubů
komplexita	lokálně	max. hloubka sondáže ≤ 4 mm	max. hloubka sondáže ≤ 5 mm	stadium II + hloubka sondáže ≥ 6 mm vertikální ztráta kosti ≥ 3 mm F2 nebo F3 střední defekt alveolárního hřebene	stadium III + nutnost komplexní rehabilitace vzhledem k: <ul style="list-style-type: none"> ● dysfunkční mastikace ● sekundární okluzní trauma (viklavost 2-3 stupně) ● závažný defekt alv. hřebene ● zhroucení skusu, putování, rozestupování zubů ● méně než 20 zubů
		převážně horizontální ztráta kosti			
rozsah a rozmístění	přidat k popisu stadia	parodontitis lokalizovaná (≤ 30 % zubů), generalizovaná (≥ 30 % zubů)			
		vzorec řezáky/moláry			