


Koncept a klasifikace tkání

Petr Vaňhara



PROČ VŮBEC??



Jednou dokážeme
vytisknout lidské
srdce, věří zlinský
vědec



Zázračný sliz: Vědci pracují na
umělé tkáni, která má nahradit
lidskou



9th June 2022

**FRANKENSTEIN'S
MONSTER** Robots 'to
wear living skin' to
make human-like and
aid relations

ROBOTS of the future could be
coated in 'living skin' that makes
them look and feel human.

OBDIVUHODNÁ VARIABILITA BUNĚK





C57BL6 JAX lab


TKÁŇ

SOLUBILNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

BUŇKY






ECM



TKÁŇĚ A ORGÁNY

- 6×10^{13} **buněk** více než **200** různých typů
- **Tkáně**: funkční, trojrozměrné, organizované seskupení morfologicky podobných **buněk a jejich produktů a derivátů**
- **Orgány**: strukturní a funkční uspořádání tkání



Parenchym: vlastní funkční tkáň konkrétního orgánu
(jaterní, plicní, pankreatický, ledvinný parenchym)

Stroma: okolní podpůrná, intersticiální tkáň


Příklad: jaterní tkáň

Parenchym:
Funkční komponenta

- Hepatocyty
- Sinusoidy a přidružené struktury

Stroma:
Podpůrná komponenta


- Vazivo a s ním spojené struktury
- Cévy
- Nervy
- Žlučovody



SOUČASNÁ KLASIFIKACE ZÁKLADNÍCH TYPŮ TKÁNÍ

Na základě **morfologických** a **funkčních** znaků


Epitelová



Kontinuální, avaskulární vrstvy buněk s různou funkcí, **orientovaných do volného prostoru**, se specifickými mezibuněčnými spoji a minimem mezibuněčného prostoru a ECM

Deriváty všech tří zárodečných listů

Svalová




Obsahují myofibrily → **schopnost kontrakce**

Derivát mezodermu - KS, myokard, mezenchymu - HS

Výjimečně ektoderm (např. m. sphincter a m. dilatator pupillae)

Nervová




Neurony a neuroglie

Příjem a přenos **elektrického vzruchu**

Derivát ektodermu, výjimečně mezenchymu (mikroglie)

Pojivová



Dominantní přítomnost **extracelulární matrix**

Vazivo, chrupavka, kost, tuková tkáň



Derivát zejména mezenchymu

TKÁŇ A JEJÍ DEFINICE

Funkční, trojrozměrné, organizované seskupení **morfologicky podobných buněk a jejich produktů a derivátů**



**klasická histologická definice tkání je založena
na mikroskopické vizualizaci**



ZÁKLADNÍ PRINCIPY HISTOGENEZE

Proliferace

Diferenciace

Migrace

Apoptóza

Definice
tkáňových vzorů



KMENOVÉ BUŇKY V HISTOGENEZI


Hierarchie buněk:

Funkční buňky tkání diferencují z kmenových buněk

Sebeobnova


Diferenciace

Odpověď na
prostředí



Hierarchie buněk:

Funkční buňky tkání diferencují z kmenových buněk



KMENOVÉ BUŇKY SE LIŠÍ V DIFERENCIAČNÍ KAPACITĚ

Totipotence

- Všechny buňky těla včetně extraembryonálních tkání
- Zygota, blastomery a raná stadia embryogeneze




Pluripotence

- Všechny buňky těla s výjimkou trofoblastu
- Blastocysta – *Inner cell mass* - ICM (embryoblast)



Multipotence

- Různé buněčné typy v rámci tkáně
- Mesenchymální SC, hematopoietické SC






Oligo- a unipotence

- Jeden nebo několik buněčných typů – progenitory krevních řad, tkáňové prekursory (obnova epitelů apod.)


KMENOVÉ BUŇKY V ORGANISMU

Embryonální kmenové buňky (ESCs)

- odvozeny z embryoblastu (ICM) blastocysty
- pluripotentní
- model rané embryogeneze a histogeneze, význam pro regenerativní medicínu



hESCs
1998



J. Thompson

Aleš Hampl + Petr Dvořák



2003 first and only laboratory in the Czech Republic

[Institute of Experimental Medicine, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i.](#)


Aleš heads the Department of Molecular Embryology at the Institute of Experimental Medicine in the Czech Republic. Research in the department has focused on studying cells with pluripotent properties, including developing gametes and cells of embryonal origin – embryonal carcinoma cells and embryonic stem cells. The department is the first and only laboratory in the Czech Republic where cell lines (embryonic stem cells – ESC) were established from human blastocyst-stage embryos in 2003.

KMENOVÉ BUŇKY V ORGANISMU

Tkáňové (adultní) kmenové buňky

- regenerace a obnova tkání
- GIT, CNS, mesenchym
- regenerativní medicína, nádorová biologie

H. Clevers



Copyright © 2006 Nature Publishing Group
Nature Reviews | Genetics




The Organoid group, previously Clevers group, studies the molecular mechanisms of tissue development and cancer of various organs using organoids made from adult Lgr5 stem cells.




Nobel prize 2012

Indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSc)

- dospělá diferencovaná buňka (fibroblast) je dediferencovaná do pluripotentního stavu (reprogramována)
- diferenciace do žádaného buněčného typu
- regenerativní medicína, buněčná a genová terapie



S. Yamanaka



Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic and Adult Fibroblast Cultures by Defined Factors

Kazutoshi Takahashi¹ and Shinya Yamanaka^{1,2,*}

¹Department of Stem Cell Biology, Institute for Frontier Medical Sciences, Kyoto University, Kyoto 606-8507, Japan


²CREST, Japan Science and Technology Agency, Kawaguchi 332-0012, Japan

*Contact: yamanaka@frontier.kyoto-u.ac.jp


DOI 10.1016/j.cell.2006.07.024

iPSCs MAJÍ VLASTNOSTI EMBRYONÁLNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK


hESCs



hiPSCs




hiPSCs JSOU VÝZNAMNÝ BIOLOGICKÝ MODEL I NÁSTROJ




KMENOVÉ BUŇKY NEMUSÍ BÝT VŽDY PŘÁTELSKÉ

Nádorové kmenové buňky

- solidní tumor je vždy heterogenní
- malá populace buněk s charakterem CSC může znovu iniciovat růst tumoru a být příčinou selhání terapie



Tkáňová kmenová buňka






Nádorová kmenová buňka


DIFERENCIACE JE URČENA HIERARCHICKOU TRANSKRIPČÍ GENŮ

doi:10.1038/nrg3209


BUNĚČNÁ DIFERENCIACE URČUJE ROZDÍLY MEZI TKÁNĚMI



Nature Reviews | Genetics




TKÁŇ SE LIŠÍ SVÝM GENETICKÝM A EPIGENETICKÝM PROFILEM





Waddington, C.H. The Strategy of the Genes; a Discussion of Some Aspects of Theoretical Biology
Allen & Unwin, London, 1957

TKÁNĚ SE LIŠÍ SVÝM GENETICKÝM A EPIGENETICKÝM PROFILEM



Goldberg, Aaron D. et al.
Epigenetics: A Landscape Takes Shape
Cell, 128(4):635 - 638




TKÁŇĚ SE LIŠÍ SVÝM GENETICKÝM A EPIGENETICKÝM PROFILEM



Výslednou stavbu a funkci tkání určuje projev řady strukturních genů – různý v různých lokalizacích i časových úsecích

TKÁŇOVOU IDENTITU URČUJÍ I EXTRACELULÁRNÍ MOLEKULY


Příklad: krvetvorba v kostní dřeni



MIKROPROSTŘEDÍ URČUJE VLASTNOSTI I STAVBU TKÁNÍ


Do vlastní mikroskopické stavby tkání se promítá velké množství
biologických a fyzikálně-chemických parametrů

„Stem cell niche“




- Procesy embryonálního vývoje
- Mezibuněčné interakce
- Prostorové uspořádání (dimenzionalita)
- Gradienty morfogenů
- Epigenetický profil
- Dynamika genové exprese
- Parciální tlaky plynů
- Složení ECM
- Mechanická stimulace
- Perfuze a intersticiální toky
- Lokální imunitní odpověď
- Metabolity
- ...


MIKROPROSTŘEDÍ URČUJE VLASTNOSTI I STAVBU TKÁNÍ



MIKROPROSTŘEDÍ URČUJE VLASTNOSTI I STAVBU TKÁNÍ



MIKROPROSTŘEDÍ JE KLÍČOVÉ PRO TKÁŇOVOU HOMEOSTÁZU



Apoptóza

Regenerace

Senescence

Patologická
změna

MIKROPROSTŘEDÍ JE DŮLEŽITÉ TAKÉ V PATOGENEZI

Příklad: **játra**


Normální tkáňové mikroprostředí

Zdravá

Stroma  **Parenchym**

Infekce
Metabolické poruchy
Autoimunitní poruchy
Cholestáza
Alkohol
Dědičnost




Fibrotická

Stroma  **Parenchym**



Abnormální tkáňové mikroprostředí

Ztráta funkčního parenchymu
Depozice ECM
Aktivace (myo)fibroblastů
Dysplázie
Zánět


MIKROPROSTŘEDÍ JE DŮLEŽITÉ TAKÉ V PATOGENEZE



Tkáň =




ECM



+



Buňky

+



Signální molekuly

MOLEKULÁRNÍ PRINCIPY HISTOGENEZE




Wild type



Mutant



HOX KOMPLEX A MORFOGENETICKÉ POLE




Příklad: **Hox komplex**

Vysoce konzervovaná skupina transkripčních faktorů určujících základní stavbu a orientaci těla

Tkáňová diferenciace podél antero-posteriorní osy

doi:10.1038/sj.hdy.6800872




Člověk (39 genů)



Cluster	Chromozom	Počet Hox genů
HoxA	7	11
HoxB	17	10
HoxC	12	9
HoxD	2	9




„Genetic control of pattern formation“



mRNA Molecules



Expression patterns of gap and pair-rule genes in *Drosophila* embryos.
DOI: 10.1007/s10577-006-1068-z




Eric Francis Wieschaus is an American evolutionary developmental biologist and 1995 Nobel Prize-winner.



Three short lectures on embryonic patterning






HydePark



PROČ MAJÍ TYGŘI PRUHY?

Reakčně-difúzní systém



THE CHEMICAL BASIS OF MORPHOGENESIS

By A. M. TURING, F.R.S. *University of Manchester*

(Received 9 November 1951—Revised 15 March 1952)


It is suggested that a system of chemical substances, called morphogens, reacting together and diffusing through a tissue, is adequate to account for the main phenomena of morphogenesis. Such a system, although it may originally be quite homogeneous, may later develop a pattern or structure due to an instability of the homogeneous equilibrium, which is triggered off by random disturbances. Such reaction-diffusion systems are considered in some detail in the case of an isolated ring of cells, a mathematically convenient, though biologically unusual system. The investigation is chiefly concerned with the onset of instability. It is found that there are six essentially different forms which this may take. In the most interesting form stationary waves appear on the ring. It is suggested that this might account, for instance, for the tentacle patterns on *Hydra* and for whorled leaves. A system of reactions and diffusion on a sphere is also considered. Such a system appears to account for gastrulation. Another reaction system in two dimensions gives rise to patterns reminiscent of dappling. It is also suggested that stationary waves in two dimensions could account for the phenomena of phyllotaxis.

The purpose of this paper is to discuss a possible mechanism by which the genes of a zygote may determine the anatomical structure of the resulting organism. The theory does not make any new hypotheses; it merely suggests that certain well-known physical laws are sufficient to account for many of the facts. The full understanding of the paper requires a good knowledge of mathematics, some biology, and some elementary chemistry. Since readers cannot be expected to be experts in all of these subjects, a number of elementary facts are explained, which can be found in text-books, but whose omission would make the paper difficult reading.




1. A MODEL OF THE EMBRYO. MORPHOGENS

In this section a mathematical model of the growing embryo will be described. This model will be a simplification and an idealization, and consequently a falsification. It is to be hoped that the features retained for discussion are those of greatest importance in the present state of knowledge.

The model takes two slightly different forms. In one of them the cell theory is recognized but the cells are idealized into geometrical points. In the other the matter of the organism is imagined as continuously distributed. The cells are not, however, completely ignored, for various physical and physico-chemical characteristics of the matter as a whole are assumed to have values appropriate to the cellular matter.









ODPOVĚĎ NA MORFOGENY URČUJE TKÁŇOVÉ VZORY




Belousov-
Zabotinsky





TEMPORO-SPACIÁLNÍ EXPRESE RŮZNÝCH REGULÁTORŮ URČUJE FINÁLNÍ LOKALIZACI, ORIENTACI A MORFOLOGII TKÁNÍ A ORGÁNŮ



MANIPULACE S AER NEBO ZPA MĚNÍ VÝVOJOVÉ INSTRUKCE





RŮST KONČETIN DEFINUJÍ GRADIENTY MORFOGENŮ Z AER A ZPA



THALIDOMID



HOX



Proliferace

Vaskularizace


Thalidomid



Thalidomidová embryopatie


- fokomelie
- amelie
- anocie/mikrocie
- anoftalmie/mikroftalmie
- poškození ledvin, srdce, GIT, genitálu

Frances Oldham Kelsey,
FDA USA



VÝVOJ OSTATNÍCH TKÁNÍ SE ŘÍDÍ PODOBNÝMI INTERAKCEMI

Ektoderm



Entoderm

Mesoderm

VÝVOJ OSTATNÍCH TKÁNÍ SE ŘÍDÍ PODOBNÝMI INTERAKCEMI

Ektoderm

Povrchový ektoderm

- Epidermis a její deriváty
- Rohovka a epitel čočky
- Zubní sklovina
- Vnitřní ucho
- Adenohypofýza
- Epitel ústní dutiny a části análního kanálu

Neuroektoderm

- **Neurální trubice** a její deriváty:
 - CNS
 - Retina
 - Neurohypofýza
 - Epifýza
- **Neurální lišta** a její deriváty:
 - Kraniální, spinální, autonomní ganglia, PNS
 - Schwanovy buňky, gliální buňky,
 - Chromafinní buňky nadledviny
 - Enteroendokrinní buňky
 - Melanoblasty
 - Mesenchym hlavy a jeho deriváty – faryngeální oblouky
 - Odontoblasty

Mesoderm

Hlavový

- Pojivová tkáň hlavy, lebka, dentin

Paraxiální

- Kosterní svalovina hlavy, trupu a končetin
- Dermis
- Pojivová tkáň

Intermediální

- Urogenitální systém + vývody a přídatné žlázy

Laterální


- Viscerální pojivová tkáň
- Serózní membrány pleury, peritonea a perikardia
- Krevní buňky, leukocyty
- Kardiovaskulární a lymfatický systém
- Slezina
- Adrenální kortex

Entoderm


- Epitel GIT s výjimkou ústní dutiny a části análního kanálu

- Extramurální žlázy GIT
- Epitel močového měchýře a trubice
- Epitel respiračního systému
- Thyroidea, parathyreoidní tělíska, thymus
- Parenchym tonsil
- Epitel cavum tympani a Eustachovy trubice

COFFEEBREAK



Epitelová tkáň




20 μm

KLASIFIKACE TKÁNÍ

Na základě **morfologických** a **funkčních** znaků


Epitelová



Kontinuální, avaskulární vrstvy buněk s různou funkcí, **orientovaných do volného prostoru**, se specifickými mezibuněčnými spoji a minimem mezibuněčného prostoru a ECM

Deriváty všech tří zárodečných listů


Svalová



Obsahují myofibrily → **schopnost kontrakce**

Derivát mezodermu - KS, myokard, mezenchymu - HS

Nervová




Neurony a neuroglie

Přijem a přenos **elektrického vzruchu**

Derivát ektodermu

Pojivová







Dominantní přítomnost **extracelulární matrix**




Vazivo, chrupavka, kost, tuková tkáň

Derivát zejména mezenchymu

VARIABILITA EPITELOVÉ TKÁNĚ




SPOLEČNÉ ZNAKY



EPITELOVÁ TKÁŇ



Epitel dýchacích cest (trachea)



- uspořádání buněk
- specifická morfologie
- modifikace povrchů
- schopnost adheze
- tkáňová rozhraní

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA (KRYCÍ) EPITELOVÉ TKÁNĚ


- Avaskulární (bez přímého cévního zásobení) – výživa z pojivové tkáně (*lamina propria*)
- Apikobazální polarizace
- Minimum mezibuněčné hmoty
- Ukotvení do bazální membrány
- Typická morfologie a mezibuněčné spoje (těsné, adhezní, komunikační)




EPITEL

VS.


MEZENCHYM



POLARITA BUNĚK



Evoluce epitelu



Komplexita mezibuněčných spo





STAVBA TYPICKÉ EPITELOVÉ BUŇKY

Apikální

Laterální

Laterální

Bazální povrch




MODIFIKACE BUNĚČNÉHO POVRCHU

Apikální povrch	Laterální povrch	Bazální povrch
mikroklky nepravidelné kartáčový lem žíhaná kutikula řasinky stereocilie	zonula adherens macula adherens (desmosom) zonula occludens nexus interdigitace	hemidesmosomy bazální labyrint

Viz cytologické přednášky

BAZÁLNÍ MEMBRÁNA






Bazální membrána je pojem světelné mikroskopie

- Vrstva ECM, která připojuje epitelové buňky k pojivovým tkáním
- V mikroskopu je nezřetelná, ale lze histochemicky zviditelnit některé její složky (PAS)
- Společný produkt epitelů i fibroblastů
- Selektivní bariéra - transport
- Tkáňová integrita - soudržnost epitelu


PAS reakce (Periodic Acid Schiff)
Průkaz polysacharidů



Bazální membrána = lamina basalis + lamina fibroreticularis




BAZÁLNÍ MEMBRÁNA



BAZÁLNÍ MEMBRÁNA vs. BAZÁLNÍ LAMINA

Bazální lamina (lamina basalis)


- pojem elektronové mikroskopie
- dvě vrstvy: lamina densa a lamina rara
 - lamina rara (lucida) - GAGs (zviditelní se PAS reakcí) - připojení hemidesmosomů, světlá
 - lamina densa - zejména netypické kolageny (IV), tmavá
- produkt epitelových buněk
- 50-100nm






BAZÁLNÍ MEMBRÁNA vs. BAZÁLNÍ LAMINA

Lamina fibroreticularis



- pojem elektronové mikroskopie
- kolagen III a další netypické kolageny (IV, VI)
- fibrilin, elastin
- produkt vazivových buněk, navazuje na ECM vaziva




BAZÁLNÍ MEMBRÁNA JE NEOBYČEJNĚ SLOŽITÁ STRUKTURA



BAZÁLNÍ MEMBRÁNA JE NEOBYČEJNĚ SLOŽITÁ STRUKTURA





(a)



(b)

ARCHITEKTURA BAZÁLNÍ MEMBRÁNY

Epitelová buňka





Lamina
basalis

Lamina
(fibro)reticularis

Bazální
membrána


Fibroblast

PŘ. BAZÁLNÍ MEMBRÁNA V CORPUSCULUM RENIS







Bazální membrána v ledvinných těliscích je důležitou součástí filtrační bariéry

Moč





Krev

PŘ. BAZÁLNÍ MEMBRÁNA EPIDERMIS






PŘ. ALVEOLOKAPILÁRNÍ BARIÉRA



Alveolo-kapilární bariéra

BAZÁLNÍ MEMBRÁNA A POVRCHY PRO TKÁŇOVÉ INŽENÝRSTVÍ



EMBRYONÁLNÍ PŮVOD EPITELOVÝCH TKÁNÍ

Buňky s epiteliálním fenotypem vznikají ze všech tří zárodečných listů




Fig. 5-3. Digital photomicrograph of a 12-day human embryo (Carnegie No. 7700) taken just as implantation within the endometrium is completed.




Fig. 6-27. Flow chart showing the formation of the organs and tissues of the embryo from the fundamental germ layers. The arrows are color-coded according to the germ layer of origin of the structure (see Fig. 4-1 for color code).

EMBRYONÁLNÍ PŮVOD EPITELOVÝCH TKÁNÍ

**Buňky s epiteliálním fenotypem
vznikají ze všech tří zárodečných listů**

Zárodečný list	Epitelové deriváty
Ektoderm	1. Pokožka (vícevrstevný dlaždicový rohovějící) 2. Potní žlázy a jejich vývody (jednovrstevný a vícevrstevný kubický) 3. Výstelka ústní dutiny, pochvy a análního kanálu (vícevrstevný dlaždicový nerohovějící)
Mezoderm	1. Endotel vystýlající krevní cévy (jednovrstevný dlaždicový) 2. Mezotel vystýlající tělní dutiny (jednovrstevný dlaždicový) 3. Výstelky pohlavních a močových cest (přechodný, víceřadý cylindrický, jednovrstevný kubický, jednovrstevný cylindrický)
Entoderm	1. Výstelka jícnu (vícevrstevný dlaždicový nerohovějící) 2. Výstelka GIT (jednovrstevný cylindrický) 3. Výstelka žlučníku (jednovrstevný cylindrický) 4. GIT žlázy (játra, pankreas) 5. Výstelka dýchacího traktu (víceřadý cylindrický s řasinkami, jednovrstevný cylindrický s řasinkami, kubický, dlaždicový) 6. Část pohlavních a močových cest odvozená z kloaky


KLASIFIKACE

MORFOLOGIE


FUNKCE

KLASIFIKACE EPITELOVÝCH TKÁNÍ

- na základě **morfologie**: 1) krycí, 2) trabekulární, 3) retikulární
- na základě **funkce**: žláзовý, resorpční, smyslový, respirační atd.



p580102 [RM] © www.visualphotos.com



3 µm


Lung/epithelium.#80294-26

1/7/0 REMF

KLASIFIKACE EPITELOVÝCH TKÁNÍ

Klasifikace podle

1) morfologie



- krycí (plošné)
- trabekulární
- retikulární

2) funkce

- krycí
- žlázné
- resorpční
- smyslové
- respirační cesty
- alveolární
- zárodečný
- ...


Morfologie

- Tvar a uspořádání buněk
- Počet vrstev

1. Epitely krycí (plošné)
2. Trabekulární epitel
3. Retikulární epitel




KRYCÍ EPITELY

Kritérium	Termín	Rozlišení
Počet vrstev buněk	Jednovrstevný	Jedna vrstva buněk
	Vícevrstevný	Více vrstev buněk
	Víceřadý	Jádra zdánlivě ve více vrstvách, ale všechny buňky v kontaktu s bazální laminou
Tvar povrchových buněk	Dlaždicový	Ploché dlaždicové buňky, šířka >> výška
	Kubický	Polygonální buňky, šířka = výška
	Cylindrický	Polygonální buňky, šířka < výška



▲ **Schematic of nonkeratinized stratified squamous epithelium as seen with the light microscope.** The epithelium acts as a protective barrier and is typical of wet surfaces—linings of the oral cavity, esophagus, anal canal, part of the urethra, and vagina. It also covers the cornea.


- **Jednovrstevný dlaždicový epitel**



- **Semipermeabilní bariéra**
- **Endotel cév**
- **Parietální list Bowmanova pouzdra (corpusculum renis)**


KRYCÍ EPITELY

- **Jednovrstevný kubický epitel**



- Tubuly ledvin
- Vsunuté a interlobulární vývody žláz
- Povrch ovaria
- Vnitřní povrch pouzdra čočky

- Sekreční a exkreční kanálky
- Úprava koncentrací iontů a vody





KRYCÍ EPITELY

- **Jednovrstevný cylindrický epitel**


- Sekrece a absorpce
- Apikální povrch může být modifikovaný
- Ochranná bariéra

- Žaludek
- Střevo
- Žlučník
- Rectum
- Uterus
- Vejcovody
- Vývody větších žláz
- Ductus papillares ledvin



KRYCÍ EPITELY




- Jednovrstevný cylindrický epitel



KRYCÍ EPITELY



Víceřadý cylindrický epitel s řasinkami a pohárkovými buňkami

- Dýchací cesty





Víceřadý cylindrický epitel se stereociliemi

- Mužský reprodukční systém (epididymis)






▪ Vrstevnatý dlaždicový epitel nerohovějící



- Ústní dutina
- Jícen
- Pochva
- Anální kanál
- Hlasové valy

KRYCÍ EPITELY

- Vrstevnatý dlaždicový epitel rohovějící
 - Epidermis




KRYCÍ EPITELY



- Vrstevnatý kubický → cylindrický epitel



- Velké vývody žláz
- Spojivka



Přechodný epitel



- Ledvinná pánvička
- Ureter
- Močový měchýř






Morfologie

- Tvar a uspořádání buněk
- Počet vrstev

1. Epitely krycí (plošné)
2. **Trabekulární epitel**
3. Retikulární epitel


TRABEKULÁRNÍ EPITEL

- Buňky uspořádané do trámců, mezi kterými probíhají kapiláry nebo sinusoidy
- Adaptace ke zvýšení efektivního buněčného povrchu orientovaného k cévám
- Jaterní parenchym
- Endokrinní žlázy



TRABEKULÁRNÍ EPITEL

Uspořádání jaterních hepatocytů




TRABEKULÁRNÍ EPITEL

Uspořádání buněk endokrinních žláz

Nadledvina

Adenohypofýza






Morfologie

- **Tvar a uspořádání buněk**
- **Počet vrstev**



1. Epitely krycí (plošné)
2. Trabekulární epitel
3. **Retikulární epitel**

RETIKULÁRNÍ EPITEL

Thymus - cytoretikulum




p248250 [RM] © www.visualphotos.com





- Kompartmentalizace
- Hematothymová bariéra
- Mikroprostředí pro vývoj T-lymfocytů

RETIKULÁRNÍ EPITEL



Epiteliální retikulární buňky:
strukturní a funkční podpora vyvíjejícím
se T-lymfocytům






Epitel krycí



**Epitel
trabekulární**



**Epitel
retikulární**

FUNKCE

- **Tvorba bariér a ochrana tkání**
- **Transport a resorpce**
- **Sekrece - žlázy**
- **Příjem smyslových podnětů**





FUNKCE

Bariéry

Příklad: Vrstevnatý dlaždicový epitel rohovějící

Mechanická odolnost epidermis



- Konstantní abraze
→ neustálá sebeobnova
- Keratin
 - základní strukturní protein epitelů, polymer
 - cytoskelet – intermediární filamenta
 - 54 genů pro keratiny
 - specifické pro různé tkáně






Příklad: Přechodný epitel - urotel

Chemická odolnost
Strukturální flexibilita

- Buňky vytvářejí osmotickou bariéru
- Apikální membrána
 - Uroplakiny, lipidy
- Těsné spoje
- Subapikální vezikuly




Příklad: Přechodný epitel - urotel



Povrchové
buňky
Močový měchýř


Vazivo




Membránové vezikuly

VÝMĚNA PLYNŮ




- Výměna plynů mezi krví a atmosférickým vzduchem (O_2 , CO_2) – koncentrační gradient
- Bariéra – krev-vzduch
- Surfaktant
- Respirační oddíl plic – plicní sklípky respiračních bronchiolů, alveolárních chodbiček a váčků
- Membranózní (typ I) a granulární (typ II) pneumocyty




Copyright © 2003 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.



ALVEOLÁRNÍ EPITEL



ALVEOLÁRNÍ EPITEL



Granulární pneumocyt

Membranózní pneumocyt

Erytrocyt

Kapilára




Alveolo-kapilární bariéra

2 μ m

FUNKCE

Resorpce

RESORPTION





FUNKCE

Smyslový epitel

SMYSLOVÝ EPITEL A SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ

Podpůrné a vlastní smyslové buňky


- smyslové buňky konvertují signály z vnějšího prostředí na formu přístupnou pro CNS
- **primární smyslové buňky** (neurosmyslové)
 - modifikované unipolární neurony
 - generují přímo nervový vzruch
 - čichový epitel, retina




SMYSLOVÝ EPITEL A SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ

- sekundární smyslové buňky


- epitelie tvoří recepční úsek
- v kontaktu s terminálními zakončeními dendritů, které generují nervový vzruch
- vláskové buňky vnitřního ucha, buňky chuťových pohárků




(A)




(B)



(A)



(B)



FUNKCE

Žlázový epitel

Charakter žlázy

Jednobuněčné žlázy


- Pohárkové buňky
- Enteroendokrinní buňky

Mnohobuněčné žlázy

- Endokrinní
- Exokrinní
 - Endoepitelové
 - Exoepitelové

Charakter sekrece

Holokrinní × Merokrinní × Apokrinní







JEDNOBUNĚČNÉ ŽLÁZY



EXOKRINNÍ SEKRECE – JEDNOBUNĚČNÉ ŽLÁZY

■ Pohárkové buňky

- Cylindrické žlázové epiteliální buňky
- Apikální povrch - apokrinní/merokrinní sekrece mucinu
- Bazální část – RER, GA, jádro, mitochondrie
- Mucinogenní zrna – barvení mucinokarmínem






EXOKRINNÍ SEKRECE – JEDNOBUNĚČNÉ ŽLÁZY

■ Pohárkové buňky



- Zejména respirační a GI trakt
- Produkují **hlen** (mukus) = viskózní tekutina složená z elektrolytů a vysoce glykosylovaných proteinů (muciny)
- Chrání proti mechanickému i chemickému poškození
- Zachycení a eliminace pevných částic
- Sekrece konstitutivní nebo po stimulaci (kouř, prach, bakterie)
- Mukus po sekreci expanduje 500× během 20ms

• Klinické korelace:

- změny ve složení nebo množství hlenu
- **chronická bronchitida / cystická fibróza**




EXOKRINNÍ SEKRECE – JEDNOBUNĚČNÉ ŽLÁZY




Exokrinní

Endokrinní




VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÉ ŽLÁZY




KLASIFIKACE EXOKRINNÍCH MNOHOBUNĚČNÝCH ŽLÁZ

- **Endoepitelové** (neopouštějí epitel, např. endoepitelové žlázy uretry, konjunktiva)
- **Exoepitelové** (epitelové pupeny v okolním vazivu)
 - Podle tvaru sekreční komponenty
 - Alveolární (acinózní)
 - Tubulózní
 - Tuboalveolární (tubuloacinózní)
 - Podle větvení
 - Jednoduché (1 vývod, jedna sekreční část)
 - Větvené (1 vývod, více sekrečních částí)
 - Složená (systém vývodů)
 - Podle charakter sekrece
 - Mucinózní
 - Serózní
 - Smíšené




MUCINÓZNÍ ŽLÁZY




◀ **LM of part of a mixed seromucous gland in the trachea.** Several mucous acini with pale-stained mucous cells are seen. The basal nuclei are flat, and cells appear washed out because mucous droplets dissolved during specimen preparation. Darker stained serous cells in adjacent acini have more rounded basal nuclei. Serous cells are smaller than mucous cells. The square outlines the area of interest seen in the EM below. 295 $\times$. H&E.



▶ **EM of part of a mucous acinus in a mixed salivary gland.** Parts of three mucous cells line the acinus lumen (*). Euchromatic basal nuclei have prominent nucleoli. Basal cytoplasm contains many profiles of rough endoplasmic reticulum (RER). Many large, electron-lucent secretory vesicles (SV) dominating the remaining cytoplasm are discharged by exocytosis into the acinus lumen. 5400 $\times$.




MUCINÓZNÍ ŽLÁZY




SERÓZNÍ ŽLÁZY



◀ **LM of part of the exocrine pancreas.** The exocrine part of the gland consists of closely packed spherical or pear-shaped serous acini. Several columnar to pyramidal acinar cells, with round basal nuclei, face a small central lumen in each **serous acinus**. Basal cytoplasm is basophilic; apical cytoplasm is more eosinophilic. Small clear centroacinar cells (**CA**) in acini centers help distinguish this purely serous gland from others, such as the parotid salivary gland. A small **duct**, in the connective tissue stroma, conveys secretions from acini to larger pancreatic ducts. 385 $\times$. H&E.



▶ **LM of part of a mixed salivary gland.** Several pale **mucous acini** surround two round **serous acini**. Serous cells have conspicuous, dark-stained secretory vesicles; mucous cells look vacuolated and washed out. EM in 2.15 shows the area in the square in detail. 600 $\times$. Toluidine blue, plastic section.



Vývod


- Intralobulární

- Vsunutý

- Žíhaný

- Interlobulární (lobární)

- Hlavní





Výška epitelu a počet jeho vrstev se zvyšují směrem ústí žlázy

SLOŽENÉ ŽLÁZY

- mucinózní i serózní složka
- Gianuzziho lunuly (demiluny)



**Giuseppe Oronzo Giannuzzi
(1838-1876)**



GIANNUZZIHO LUNULY (SERÓZNÍ DEMILUNY)






ULTRASTRUKTURA



Pankreatický acinus – serózní žláza, sekreční váčky




BUŇKY SECERNUJÍCÍ PROTEINY

- velké světlé jádro, zřetelný euchromatin
- vyvinuté RER
- GA/sekreční vezikuly
- sekret nízké viskozity (serózní)
- pankreas, slinné žlázy




BUŇKY SECERNUJÍCÍ MUKUS

- RER, GA, exocytóza
- glykoproteiny, polysacharidy
- fibrogranulární vezikuly
- pohárkové buňky, mucinózní žlázy





BUŇKY SECERNUJÍCÍ STEROIDY

- vyvinuté sER a GA
- mitochondrie s tubulózními kristami
- lipidové kapénky
- steroidogenní buňky
- kůra nadledvin, Leydigovy buňky



BUŇKY TRANSPORTUJÍCÍ IONTY



- apikální a bazální modifikace
- membránové invaginace, bazální labyrint, mikrokylky
- acidofilní cytoplazma
- proximální tubuly ledvin, žíhané vývody slinných žláz



MYOEPITELOVÉ BUŇKY

- oploštělé, hvězdicovité, s prstovitými výběžky
- kontraktilní, obklopují acinus nebo vývod
- aktinová mikrofilamenta, myozin, tropomyozin, cytokeratin
- koordinace kontrakce - nexy
- slinné, slzné, potní mléčné žlázy, semenotvorné kanálky

Mléčná žláza




Potní žláza


Sekreční buňky (D, C)

Mezibuněčný vývod (IC)

Myoepitelové buňky




PROMĚNLIVOST EPITELIÁLNÍHO FENOTYPU



REGENERACE EPITELIÁLNÍ TKÁNĚ


- různé epitely mají různou schopnost regenerace (epidermis × smyslový e. vnitřního ucha)
- multi- a oligopotentní kmenové buňky
- mikroprostředí – *stem cell niche*

Příklad: Obnova střevního epitelu




REGENERACE EPITELIÁLNÍ TKÁNĚ

Příklad: Obnova střevního epitelu - 3-5 dnů




Abnormální plasticita:

▪ Metaplasie



- Diferencovaný epitel je nahrazený jiným typem diferencovaného epitelu
- Skvamózní metaplasie děložního krčku (jednovrstevný cylindrický - vrstevnatý dlaždicový)
- Respirační cesty (jednovrstevný cylindrický s řasinkami - vrstevnatý dlaždicový)
- Prekanceróza; obvykle v místech chronického poškození (kuřáci)


■ Hyperplasie a hypertrofie






Hypertrofie: roste velikost buněk

Hyperplasie: roste počet buněk

■ Dysplasie porucha diferenciacie




Prostat




Hyperplasie žlázového epitelu prostaty

Adenokarcinom prostaty

Epiteliální – mesenchymální tranzice (EMT)




Změna fenotypu z **epiteliálního**, soudržného, na **mesenchymální** – migrující a produkující ECM.



PLASTICITA EPITELIÁLNÍ TKÁNĚ – DISEMINACE NÁDORŮ



Buňky ztrácí adhezivní molekuly a získávají schopnost migrovat



PLASTICITA EPITELIÁLNÍ TKÁNĚ


Proces EMT je důležitý v embryonálním vývoji

Např. delaminace buněk neurální lišty z neuroektodermu (epitel)




EMT $\leftrightarrow$ MET

Jde to i naopak - proces EMT-MET je flexibilní, reverzibilní, a je v pozadí mnoha biologických dějů i onemocnění, např. fibróza a nádorů




PLASTICITA EPITELIÁLNÍ TKÁNĚ



PLASTICITA EPITELIÁLNÍ TKÁNĚ

U nádorových onemocnění hraje EMT roli v diseminaci primárního tumoru a tvorbě metastáz.




OTÁZKY, KOMENTÁŘE?

**MUNI
MED**

Ústav
histologie
a embryologie






Otázky? Komentáře?

pvanhara@med.muni.cz



**DĚKUJI ZA
POZORNOST**

DOPORUČENÁ LITERATURA




www.histology.med.muni.cz
pvanhara@med.muni.cz



Guide to General Histology and Microscopic Anatomy

Petr Vaňhara, Miroslava Sedláčková,
Irena Lauschová, Svatopluk Čech, Aleš Hampel



Masaryk University, Brno 2017

DĚKUJI ZA POZORNOST