

Malnutrice

Veronika Březková

malnutrice

- **Podle příčiny:**
 - primární (exogenní)
 - sekundární (endogenní) – poruchy: vstřebávání živin/ utilizace výživových faktorů/ zvýšené odbourávání živin
- **Podle typu:**
 - nedostatek živin (podvýživa)
 - nadbytek živin (nadvýživa)
- **Podle stupně:**
 - lehké
 - střední
 - těžké
- **Podle trvání:**
 - akutní
 - subakutní
 - chronické
- **Podle výsledku:**
 - zvrátané
 - nezvrátané

malnutrice

- Primární (exogenní)
- Sekundární

Primární malnutrice

- Chudí lidé
- Osaměle žijící staré osoby
- Bezdomovci
- Lidé stravující se alternativně
- Zvýšené ztráty výživových faktorů (↑pocení, ↑průjmech, ↑ztráty močí)
- Vyšší nároky v období růstu, puberty, těhotenství a kojení
- Pacienti, kteří přijímají nedostatečné množství potravy (PPP, bolesti apod.)

Sekundární malnutrice

Mohou vzniknout i při dostatečném příjmu jednotlivých nutrientů

- Při malabsorpci
- Při poruchách utilizace nutrientů (jaterní insuficience)
- Zvýšené odbourávání nutrientů při současné konzumaci antinutrientů, při užívání léků

Deficience v užívání léků

- Antacida – deficit thiaminu
- Perorální antikoncepce – vit.C, vit. sk. B
- Některá ATB – vit. K, B₁₂, kys. listová
- Klofibrát, neomycin, kolchicin – vit. B₁₂,
- Syntetická projímadla – ztráty K a Ca

malnutrice

- Z podvýživy (marasmus, kwashiorkor, marasmický kwashiorkor)
- Specifické deficiencie
- Nadvýživa

Protein-energetická malnutrice

= stav, kdy příjem základních energetických substrátů a bílkovin je menší než jejich potřeba, organismus čerpá energii z vlastních zásob

- Velký problém rozvojových zemí (1/2 lidí zemře před 5.rokem)
- Podvýživou trpí každý 12. člověk na Zemi
- Hospodářsky vyspělé země: cca 1/2 hospitalizovaných pac. chirurgického odd. má projevy PEM (hl.: ↑věku, ca, obezní držící nevhodné diety)

- Signifikanční ztráta hmotnosti:
 - o 5% za poslední měsíc
 - o 10% za 6 měsíců
- Během období evoluce došlo k vývoji adaptačních změn na hladovění. Lidský organismus se umí poměrně dobře postupně adaptovat na hladovění dlouhodobé i za kritických podmínek. Katabolická reakce probíhá odlišně u nekomplikovaného hladovění a v kritickém stavu.

Nekomplikované hladovění

= pokud není lidský organismus během malnutrice postižen jinými závažnými onemocněními (infekční nemoc, těžké poranění apod.), dochází k řadě adaptačních mechanismů, které podstatně snižují dopad hladovění na organismus .

- Na počátku
 - hladovění se poměrně rychle vyčerpávají zásoby jaterního i svalového glykogenu → okamžité ↑ tvorby glukózy z glukogenních AK a glycerolu v játrech → ↓ sekrece inzulínu a ↑ sekrece tzv. kontraregulačních hormonů (glukagon, hydrokortizon, katecholaminy) → stimulace lipolýzy v tukové tkáni, glukoneogeneze v játrech a stimulace proteosyntézy v kosterních svalech a viscerálních orgánech. V této době organismus katabolizuje asi 75g bílkovin denně
- 7 dní
 - ↓ bazální metabolismus + snížená tělesná aktivita → ↓ celkový energetický výdej až o 40%
 - ↓ tvorba trijodtyroninu, postupně se ↓ hladiny stresových kontraregulačních hormonů.
 - Lipolýza v tukové tkáni se postupně ↑ a ↑ uvolňování MK do krevního oběhu. ↓ proteolýza → redukce kosterní svaloviny a tukové tkáně, ↓ tělesné hmotnosti je již velmi pozvolný a ↓ ztráty dusíku v moči.

- Současně se ↑ tvorba ketoláték v játrech, ale játra je nejsou schopna využít (absence 3-oxoacyl-CoA-transferázy) → dostávají se do krevního oběhu a stávají se hlavním energetickým zdrojem pro mozek.
- Vzestup ketogeneze je zároveň spojen s výrazným poklesem katabolismu bílkovin, a to až na 20g denně. Tzn., že ketolátky mají během hladovění ochranný vliv na zásoby bílkovin.
- Přestože jsou ketolátky za hladovění hlavním zdrojem energie pro mozek, pro jejich využití je potřebné určité množství glukózy (metabolismus acetoacetátu a další metabolismus acetyl-CoA v Krebsově cyklu).
- Ztráta 40% celkových zásob bílkovin není slučitelná se životem a při dobré adaptaci na hladovění k ní dochází asi za 60 až 70 dní (bez adaptačních mechanismů by k takovému vyčerpání došlo již za 3 týdny).
- Adaptační mechanismy však požadavek organismu na glukoneogenezi výrazně snižují a bílkoviny tak přestávají být hlavním zdrojem energie a jsou ušetřeny pro svoje vlastní funkce.

- Zdravý organismus je schopen přežít z období normálního přívodu stravy až do stadia protrahovaného hladovění. Při dobré hydrataci organismu tak může hladovění trvat více než dva měsíce.
- Smrt nastává zřejmě v důsledku arytmie či srdečního selhání v důsledku deplece minerálních látek a ztrátě kritického množství bílkovin. Velmi častou příčinou smrti je i infekce.

Sekundární projevy

- Především jde o postižení těchto systémů:
 - Postižení imunitního systému
 - Poruchy hojení ran a regeneračních procesů
 - Potížení kardiovaskulárního systému
 - Plicní komplikace
 - Porucha termoregulace
 - Porušení gastrointestinálního traktu
 - Postižení krvevorbny
 - Elektrolytové dysbalance
 - Poruchy kostního metabolismu
 - Dehydratace
 - Renální komplikace
 - Neurologické změny

Nekomplikované hladovění

Proteinová malnutrice

- Hlavně u alkoholiků, lidí s těžkou depresí, starých lidí a lidí s odlišnými stravovacími návyky (makrobiotici, vegani).
- ↓ kvalitních proteinů (pod 0,5 g/kg/den) + dostatek energie → vážne proteosyntéza, která je závislá na limitující AK (často cystein, methionin nebo lysin) → postupný úbytku svalové tkáně, která se stává zdrojem es. AK, které chybí v dietě.
- Přestože AK uvolněné ze svalu jsou využívány pro syntézu plazmatických proteinů a jiných bílkovin v játrech, postupně dochází ke snížení jaterní proteosyntézy.
- Po určité době dochází k poklesu produkce plazmatických bílkovin (hlavně albuminu) s následným poklesem onkotického tlaku plasmy a vznikem otoků.

Stresové hladovění

Kwashiorkor-like malnutrice

- Nedochozí k rozvoji adaptačních mechanismů, ale prohlubuje se katabolismus, který je potencován sekrecí tzv. kontraregulačních hormonů.
- Tento typ malnutrice je kombinací hladovění a současně probíhajícího těžkého onemocnění. Jak je již uvedeno. Během těžkého stavu (trauma, infekční onemocnění, popáleniny, sepse) dochází totiž v organismu k poměrně uniformní reakci, která má za cíl:
 - zastavit krvácení
 - udržet cirkulující objem krve a ECT
 - zabránit invazi infekčního agens

Naopak anabolické reakce a reakce, které vyžadují delší časový interval (navození imunitní odpovědi, hojení ran) jsou v této akutní fázi potlačeny.

Důsledky stresového hladovění

- Úbytek svalstva (300g/24 hod.)
- Oslabení dechového svalstva, hypovolemie, hypoxie, energetický deficit,
- Bronchopneumonie
- Deplece albuminu pod 3,0g/l
- Poruchy rozložení tekutin v intersticiu a intravazálním prostoru, poruchy distribuce sodíku, zhoršení transportu mastných kyselin
- Deplece transportních proteinů (prealbumin, transferin)
- Poruchy transportu kortizolu

Endemická struma

struma = zvětšení štítné žlázy

endemická = postiženo více jak 10% obyvatelstva dané oblasti

- Příčina: JODOVÝ DEFICIT
- Zdroje jodu: ryby, měkkýši, chaluhy
- Strumigenní látky:
 - Strumigeny 1.řádu (dusičnany):
znemožňují vychytávání jódu štítnou žlázou
 - Strumigeny 2.řádu (látky obsahující síru)
nedovolí ŠŽ převést jód na aktivní formu

Hodnocené velikosti strumy


0... nezvětšená ŠŽ

1... ŠŽ je hmatná, ale není patrná při normální poloze hlavy

2... ŠŽ je viditelná již při normální poloze hlavy

3... velká ŠŽ, kterou je vidět až na vzdálenost 10 metrů

Zdroj: <http://rightnews.cz/index.php?id=54>



Jodurie

množství jodu v moči

- pomůcka k posuzování dostatečného zásobování obyvatelstva jodem

<u>Stupně závažnosti</u>	<u>jodurie (μg jodu/1moče)</u>
Normální zásobení	> 100
(novorozenci)	> 70
Lehký deficit	50-99
Střední deficit	20-49
Těžký deficit	< 19

Následky nedostatku jodu

- Ohrožení duševního a tělesného zdraví
- Hypothyreóza
 - projevy: zvýšená únavnost, spavost, zimomřivost
 - projevy: bledost, suchost kůže, suché vlasy, ztlustělé nehty, zácpa
- U těhotné:
 - riziko potratu či vážné poruchy vývoje plodu
- Postižené děti:
 - suchá, hrubá kůže i vlasy, nápadně odulé rty a zvětšený jazyk
 - poruchy sluchu, hluchota, hluchoněmota

prevence

- Konzumace mořských ryb
- Jodace soli (jodičnan draselný, 20-35 mg/1kg soli)
- Obohacování potravin jodem

JOD A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení

Podílí se na:

- normální činnosti nervové soustavy
- udržení normálního stavu pokožky
- normální činnosti štítné žlázy

Významné zdroje

Ryby a plody moře,
mléko a mléčné
výrobky

Nutriční anémie

- **Anémie z nedostatku železa**
(hemosiderická anémie/ hypochromní mikrocytární anémie)
 - častější u žen (menstruace)
 - často u těhotných žen (v 2. polovině těhotenství)
- **Anémie z nedostatku kobalaminu a k.listové**
(megaloblastická anémie/ ortochromní makrocytární anémie)
 - vegani

Příznaky anémie z nedostatku železa

- únava, malátnost, dušnost při námaze, bušení srdce
- Bledost kůže a sliznic, vypadávání vlasů
- *Angulární stomatidis*
Chronická atrofie papil jazyka
Koilonychie nehtů

Prevence anémie z nedostatku železa

- **Zdroje hemového železa** (využitelnost 10-30%)
 - červené maso a masné výrobky (jádrové paštiky, krevní tlačanky,...)
- **Zdroje nehemového železa** (využitelnost 1-5%)
 - rostlinné potraviny (luštěniny, mák, kakaový prášek)
 - živočišné potraviny (vaječné žloutky, maso)
 - absorpci podporují: např. bílkoviny masa, vitamin C, org. kyseliny
 - absorpci inhibují: kyselina fytová, šťavelová, vláknina

ŽELEZO A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení	Významné zdroje
<p data-bbox="176 581 478 646">Přispívá k:</p> <ul data-bbox="176 678 1081 933" style="list-style-type: none"><li data-bbox="176 678 1081 743">-normální krevtvorbě, přenosu kyslíku v těle<li data-bbox="176 873 1081 933">-snížení míry únavy a vyčerpání	<p data-bbox="1260 581 1848 738">Játra mladých zvířat, maso</p>

Anémie z nedostatku kobalaminu a kyseliny listové

- Kobalamin

- výhradně v živočišných zdrojích (játra, maso, ryby, vejce, mléko)
- zásoby v játrech vydrží až 5 let
- pro dobrou vstřebatelnost nutný tzv. „*vnitřní faktor*“
produkovaný žaludeční sliznicí

- Kyselina listová

- *zdroje: listová zelenina, chřest, burské oříšky, játra, nadledvinky*
- *nedostatek zejména u těhotných žen*
- *využití blokuje alkohol*

KOBALAMIN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení

- Prispívá k:
- normální činnosti nervové soustavy
 - tvorbě červených krvinek
 - normální funkci imunitního systému
 - látkové přeměně živin na energii

Významné zdroje

Játra mladých zvířat,
vejce, maso, mléčné
výrobky

FOLÁT A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení

- Podílí se na:
- normální krvetvorbě a funkci imunitního systému
 - normální psychické činnosti, snížení míry únavy a vyčerpání
 - přispívá k růstu zárodečných tkání během těhotenství

Významné zdroje

Játra mladých zvířat,
luštěniny, listová
zelenina

Nutriční osteopenie

- Křivice (dětský věk – nedostatek vitamínu D)
- Osteomalacie (dospělost – nedostatek vitamínu D)
- Osteoporóza




Figure 4.2 A rickety skeleton. From J. M. Delpech, *De l'Orthomorphie* (Paris: Gabon, 1828), atlas plate 32.





Figure 4.3 Deformities caused by severe rickets. From H. Bouvier, *Leçons cliniques sur les maladies chroniques de l'appareil locomoteur* (Paris: J. B. Baillière et Fils, 1858), atlas pl. 6.

Zdroj: <http://www.dinf.ne.jp/doc/english/global/david/dwe002/dwe00215.htm>



Zdroj: <http://www.osel.cz/tisk.php?clanek=1796>



Child with Rickets

VITAMIN D A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení

Přispívá k:
-normálnímu využití vápníku a fosforu
- udržení normálního stavu kostí a zubů, činnosti svalů, imunitního systému

Významné zdroje

Tresčí játra*, ryby, vejce
* Vybírejte si je dle původu – produkty ze znečištěných oblastí (např. Pobaltí) nejsou vhodným zdrojem

VÁPŇÍK A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení	Významné zdroje
<p>Potřebný pro:</p> <ul style="list-style-type: none">- udržení normálního stavu kostí a zubů- přispívá k normální srážlivosti krve, činnosti svalů, funkci nervových přenosů	<p>Mléko a mléčné výrobky, brukvovitá zelenina, sardinky s kostmi, mák</p>

FOSFOR A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení	Významné zdroje
<p>Přispívá k:</p> <ul style="list-style-type: none">- udržení normální látkové přeměně živin na energii- stavu kostí a zubů	<p>Mléko a mléčné výrobky, luštěniny, maso, vejce, olejnatá semena a ořechy</p>

Beri beri

avitaminóza thiaminu

- Dříve u obyvatelstva východní Asie živeného převážně loupanou rýží
- Dnes převážně u alkoholiků, sekundárně u karcinomu žaludku, či po dlouhotrvajícím zvracení
- 3 formy
 - vřká (kardiomyopatická) – otoky v obličeji, na těle, poruchy srdečního rytmu až zástava srdce
 - suchá (s periferní neuropatií) – bolesti končetin, úbytek svalstva, obtížnost až nemožnost chůze
 - dětská (kojenci 2.-5.)

Zdroj: <http://www.nlm.nih.gov/ihm/images/A/12/411.jpg>



THIAMIN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení

Podporuje:

- normální látkovou přeměnu živin na energii
- činnosti nervové soustavy, psychické činnosti a činnosti srdce

Významné zdroje

Kvasnice, maso, luštěniny, celozrnné obiloviny

Nedostatek riboflavinu

- *Angulární stomatitis*
- *Změny nosní sliznice, víček, jazyku*
- *Světloplachost, zvracení, průjemy*

- *Prevence:*
 - *mléko, mléčné výrobky, droždí, vnitřnosti, listová zelenina*

RIBOFLAVIN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ


Schválená tvrzení	Významné zdroje
<p>Přispívá k:</p> <ul style="list-style-type: none">- normální látkové přeměně živin na energii- činnosti nervové soustavy- udržení normálního stavu sliznic a pokožky, stavu zraku a metabolismu železa	<p>Kvasnice, játra mladých zvířat, vejce, mléčné výrobky</p>

Pelagra

deficit kyseliny nikotinové

- *Pelle* = kůže, *agra* = hrubá
- Nemoc tří D:
 - dermatitis (na kůži vystavené slunečnímu záření)
 - diarrhoea + postižení GIT
 - demence
- Prevence:
 - maso, vnitřnosti, ryby, droždí, mléko, vejce

Zroj: <http://www.fao.org/docrep/006/W0073S/w0073s08.gif>



NIACIN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení

Přispívá k:

- normální látkové přeměně živin na energii
- činnosti nervové soustavy, psychické činnosti
- udržení normálního stavu sliznic a pokožky
- přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Významné zdroje

Maso, celozrnné obiloviny, kvasnice

Kurděje

= avitaminóza C

- Dříve: nemoc námořníků
- Dnes: u osaměle žijících starých osob, alkoholiků...stres, výběr stravy
- Klinické příznaky:
 - zduřeké dásně (i infekce, intenzivní zápach z úst)
 - *perifolikulární a petechiální hemorrhagie, ekchymos*
 - nedostatečná syntéza kolagenu
- Prevence: zdroje vitamínu C (ovoce a zelenina)

VITAMIN C A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení

Přispívá k:

- udržení normální funkce imunitního systému
- tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí, chrupavek, dásní, kůže a zubů
- přispívá k normální látkové přeměně živin na energii, činnosti nervové soustavy, psychické činnosti, přispívá k ochraně buněk jako antioxidant, přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, zvyšuje vstřebávání železa

Významné zdroje

Černý rybíz,
paprika, citrusy,
brambory

Specifické deficiencie v ČR

- I – viz přednáška Dr. Ryšavé
- Ca- vysoký výskyt osteoporózy (ale! Osteoporóza není jen deficit Ca ve stravě)
- Fe – hemosiderická anemie – u nás 10% žen
- K. listová, vit. B₁₂, - megaloblastická anemie
- Vit. C – kojící ženy (pozor na ztráty zubů), kuřáci

Nadměrné dávky vitaminů

- Vitaminy - působí podpůrně a ochranně při velkých psychických nebo fyzických zátěžích
- nekontrolované užívání vitaminových přípravků vede k překračování DDD – nežádoucí účinky - toxicita - ukládání v játrech.
- Pozor – A, D, K, E
- Závislost na vitamínech – abstinence – relativní hypovitaminózy

Zvýšená potřeba

Kojenci	Vit. D, K, Fe, I, F
Děti	Vit. sk. B, C, k.listová, Ca, Fe, I, F
Těhotné ženy	Všechny vit., Ca, Mg, Fe, I, Zn
Dospělí lidé	Vit. sk. B, k. listová
Staří lidé	B ₆ , D, niacin, K, Ca, Fe, I, Zn
Vegetariáni	A, B ₁₂ , Ca, Fe, Zn
Kuřáci	Vit. C
Alkoholici	B ₁ , k. listová
Ženy v menopauze	Ca, I

VITAMIN A A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení

Přispívá k:
- udržení normálního stavu
pokožky a zraku
- funkci imunitního systému

Významné zdroje

Játra mladých zvířat, tuňák,
vejce, tvrdý sýr

VITAMIN E A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení

Pomáhá ochraně buněk jako
antioxidant

Významné zdroje

Ořechy, slunečnicová semena

VITAMIN K A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení

Přispívá k normální srážlivosti
krve a k udržení normálního
stavu kostí

Významné zdroje

Zelená listová zelenina,
brokolice, květák

PYRIDOXIN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení

Podílí se:

- při normální látkové přeměně živin na energii, metabolismu bílkovin a glykogenu
- na činnosti nervové soustavy, psychické činnosti
- na tvorbě červených krvinek, funkci imunitního systému, snížení míry únavy a vyčerpání
- přispívá k regulaci hormonální aktivity

Významné zdroje

Maso, luštěniny,
kvasnice

DRASLÍK A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení

Napomáhá normální činnosti nervové soustavy, svalů a udržení normální hladiny krevního tlaku

Významné zdroje

Luštěniny, ořechy, zelenina a ovoce

SODÍK A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení

Snížená konzumace přispívá k udržení normálního krevního tlaku

Významné zdroje

Sůl a potraviny obsahující sůl, přídatné látky se sodíkem či minerální vody obsahující vysoké množství sodíku

HOŘČÍK A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení

Podporuje:

- normální psychickou činnosti
- snížení míry únavy a vyčerpání
- udržení normálního stavu kostí a zubů
- činnosti svalů

Významné zdroje

Ořechy, olejnatá
semena, kakao,
celozrnné obiloviny

ZINEK A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení	Významné zdroje
Přispívá: <ul style="list-style-type: none">- k normální látkové přeměně živin- udržení normálního stavu pokožky, vlasů, nehtů, kostí, zraku	Maso, tvrdý sýr, vejce

SELEN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Schválená tvrzení	Významné zdroje
Podporuje : <ul style="list-style-type: none">- udržení normálního stavu vlasů, nehtů- funkci imunitního systému- činnosti štítné žlázy- ochranu buněk jako antioxidant- přispívá k normální spermatogenezi	Mořské ryby