


akomodace




Akomodace

proces, při němž oko přizpůsobuje svou mohutnost, aby zaostřilo na objekty v různých vzdálenostech

například emetrop:

- zobrazuje neakomodovaným (relaxovaným) okem vzdálené objekty na sítnici, přitom je vergence svazku dopadajícího na rohovku nulová
- pokud pozoruje bližší objekt ve vzdálenosti například 50 cm před okem, je vergence svazku dopadajícího na rohovku -2D
- mohutnost oka tedy musí být zvýšena o +2D vzhledem k vrcholu rohovky


Akomodace



možnosti přeostření z $A \rightarrow B$

1. změna optické mohutnosti φ'_o zobrazovací soustavy (u lidského oka převládá)
2. změna polohy optické soustavy nebo detektoru (jen v malé míře)

Akomodační interval a šíře




$$A_{\text{š}} = \varphi'_{o,max} - \varphi'_{o,min} \approx \frac{1}{a_R} - \frac{1}{a_P} = A_R - A_P$$

akomodační šíře (akomodační amplituda)

... rozdíl mohutností oka při maximální a minimální akomodaci
zanedbáme-li posun hlavních rovin oka při akomodaci: $a'_R \approx \text{konst}$, je přibližně
rovna rozdílu vergencí svazků (v místě rohovky) odpovídajících dalekému a
blízkému bodu oka

akomodace

předmětový bod X



$$A_{kX} = \varphi'_{o,X} - \varphi'_{o,min} = \frac{1}{a_R} - \frac{1}{a_X} = A_R - A_X$$

↑
akomodace

... rozdíl mohutností oka při pozorování bodu X ležícího v akomodačním intervalu a při minimální akomodaci odpovídající dalekému bodu
zanedbáme-li posun hlavních rovin oka při akomodaci: $a'_R \approx \text{konst}$, je přibližně rovna rozdílu vergencí svazků (v místě rohovky) odpovídajících oběma bodům


Mechanismus akomodace

- Jan Kepler (1571 – 1630): v r. 1611 si uvědomil, že různě vzdálené objekty jsou zobrazovány na sítnici, tudíž je akomodace nezbytná
- Christoph Scheiner (1573 – 1650): v r. 1619 demonstroval schopnost oka akomodovat pomocí tzv. *Scheinerova disku*
- René Descartes (1596 - 1650): poprvé navrhl, že by akomodaci mohla působit změna tvaru oční čočky
- Thomas Young (1773 – 1829): eliminoval vliv rohovky skleněnou čočkou připevněnou k oku s vodní imerzí a stále byl schopen akomodovat, tj. prokázal, že rohovka neodpovídá za akomodaci; ukázal také, že akomodace nenastává změnou délky oka
- Herman von Helmholtz (1821 – 1894): *relaxační teorie*: napjatá zonulární vlákna udržují čočku v oploštělém tvaru, při uvolnění (relaxaci) vláken nabývá čočka tvaru s vyšší křivostí ploch
- Marius Tscherning (1854 – 1939)
- Edgar F. Fincham 1937: modifikovaná Helmholtzova teorie, takřka odpovídající dnešním poznatkům a moderní teorii





A. Tunnacliffe: Introduction to Visual Optics, ABDO, Canterbury 1993.

Mechanismus akomodace: Purkyňův pokus



Jan Evangelista Purkyně
(1787 - 1869)



odraz na přední
lámové ploše
čočky (P III)

odraz na zadní
lámové ploše
čočky (P IV)

odraz na přední
lámové ploše
rohovky (P I)

Purkyňův pokus

oko:
neakomodované (R) – akomodované (A)




Table 12.3 The Purkinje images (calculated from Le Grand's schematic eye)


Image No.	Relative brightness	Unaccommodated eye				Eye accommodated 6.96 D (distant object)	
		Distant object		Object at 500 mm		Image position (mm)	Relative size
		Image position (mm)	Relative size	Image position (mm)	Relative size		
I	1	+3.900	1	+3.870	1	+3.900	1
II	0.010	+3.605	0.820	+3.585	0.821	+3.605	0.820
III	0.008	+10.726	1.971	+10.610	1.945	+6.200	1.102
IV	0.008	+4.625	-0.763	+4.325	-0.762	+5.237	-0.773

Image positions expressed as their distances from the anterior corneal vertex.


I, II ... lámavé plochy rohovky, III, IV ... lámavé plochy čočky

A. G. Bennett, R. B. Rabbetts: Clinical Visual Optics. Elsevier Health Sciences, 1998.

Mechanismus akomodace



$$A_k = 0$$



$$A_k > 0$$

1. Je-li ciliární sval relaxován, udržuje elastická tkáň ciliárního tělíska zonulární vlákna napjata, pouzdro udržuje čočku v oploštělém tvaru (poloměry křivosti vnějších ploch čočky: +10 mm, -6 mm), oko vidí do dálky.
2. Při akomodaci do blízka je ciliární sval stažen, ciliární tělísko se pohybuje vpřed a stahuje se ke středu, a tím je uvolněno napětí zonulárních vláken.
3. Elastický obal (kapsule) stlačuje čočku a za pomoci tlaku sklivce se první plocha čočky vydouvá do tvaru s vyšší křivostí – v místech, kde je kapsule nejtenčí (poloměry křivosti vnějších ploch čočky: +5,33 mm, -5,33 mm)
4. Při návratu k vidění do dálky ciliární sval relaxuje, elastická tkáň ciliárního tělíska napíná zonule a s pomocí elasticity čočky je čočka stažena do ploššího, tenčího tvaru.

A. Tunnacliffe: Introduction to Visual Optics, ABDO, Canterbury 1993.

Gullstrandovo oko – akomodační klid

plocha č.	1	2	3	4	5	6
n'	1,376	1,336	1,386	1,406	1,386	1,336
n	1	1,376	1,336	1,386	1,406	1,386
r	7,7	6,8	10	7,911	-5,76	-6
d	0,5	3,1	0,546	2,419	0,635	
x_1 plochy	0	0,5	3,6	4,146	6,565	7,2
x	nekon.	27,6787	27,3808	25,2193	22,0391	19,9691
n/x	0	0,04971	0,04879	0,05496	0,0638	0,06941
$\varphi = (n'-n)/r$	0,04883	-0,0059	0,005	0,00253	0,00347	0,00833
n'/x'	0,04883	0,04383	0,05379	0,05749	0,06727	0,07774
x'	28,1787	30,4808	25,7653	24,4581	20,6041	17,1854
$x'-d$	27,6787	27,3808	25,2193	22,0391	19,9691	
$x'/(x'-d)$	1,01806	1,11322	1,02165	1,10976	1,0318	
$f'_R = 31,0314$						

$$\begin{aligned}x'(F') &= 17,1854 \text{mm} \\x'(H') &= -5,5992 \text{mm} \\x'(N') &= 0,13106 \text{mm}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}x_1(F') &= 24,3854 \text{mm} \\x_1(H') &= 1,6008 \text{mm} \\x_1(N') &= 7,33106 \text{mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f' &= 22,7846 \text{mm} \\ \varphi'_c &= 58,6361 \text{D}\end{aligned}$$

6	5	4	3	2	1
1,386	1,406	1,386	1,336	1,376	1
1,336	1,386	1,406	1,386	1,336	1,376
6	5,76	-7,911	-10	-6,8	-7,7
0,635	2,419	0,546	3,1	0,5	
nekon.	165,685	116,356	94,3094	64,73	92,7424
0	0,00837	0,01208	0,0147	0,02064	0,01484
0,00833	0,00347	0,00253	0,005	-0,0059	0,04883
0,00833	0,01184	0,01461	0,0197	0,01476	0,06367
166,32	118,775	94,8554	67,83	93,2424	15,7065
165,685	116,356	94,3094	64,73	92,7424	
1,00383	1,02079	1,00579	1,04789	1,00539	

$$\begin{aligned}x(F) &= -15,706 \text{mm} \\x(H) &= 1,34786 \text{mm} \\x(N) &= 7,07811 \text{mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_1(F) &= -15,706 \text{mm} \\x_1(H) &= 1,34786 \text{mm} \\x_1(N) &= 7,07811 \text{mm}\end{aligned}$$



R - rohovka
M - komorová voda
Č - čočka
Sk - sklivec
S - sítnice
Z - žlutá skvrna
D - duhovka
T - ciliární sval
C - cévnatka
B - bělima
P - papila, slepá skvrna
N - oční nerv


Gullstrandovo oko – akomodační maximum

plocha č.	1	2	3	4	5	6
n'	1,376	1,336	1,386	1,406	1,386	1,336
n	1	1,376	1,336	1,386	1,406	1,386
r	7,7	6,8	5,33	2,655	-2,655	-5,33
d	0,5	2,7	0,6725	1,655	1,6725	
x ₁ plochy	0	0,5	3,2	3,8725	5,5275	7,2
x	nekon.	27,6787	27,7808	23,4437	19,4392	15,6827
n/x	0	0,04971	0,04809	0,05912	0,07233	0,08838
φ = (n'-n)/r	0,04883	-0,0059	0,00938	0,00753	0,00753	0,00938
n'/x'	0,04883	0,04383	0,05747	0,06665	0,07986	0,09776
x'	28,1787	30,4808	24,1162	21,0942	17,3552	13,6663
x'-d	27,6787	27,7808	23,4437	19,4392	15,6827	
x'/(x'-d)	1,01806	1,09719	1,02869	1,08514	1,10665	
f'_R = 31,0314						

$$\begin{aligned} x'(F') &= 13,6663 \text{ mm} \\ x'(H') &= -5,1912 \text{ mm} \\ x'(N') &= -0,4486 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1(F') &= 20,8663 \text{ mm} \\ x_1(H') &= 2,0088 \text{ mm} \\ x_1(N') &= 6,75141 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f' &= 18,8575 \text{ mm} \\ \varphi'_c &= 70,8471 \text{ D} \end{aligned}$$



6	5	4	3	2	1
1,386	1,406	1,386	1,336	1,376	1
1,336	1,386	1,406	1,386	1,336	1,376
5,33	2,655	-2,655	-5,33	-6,8	-7,7
1,6725	1,655	0,6725	2,7	0,5	
nekon.	146,075	80,9477	54,9853	35,9265	43,4551
	0	0,00949	0,01737	0,02521	0,03719
0,00938	0,00753	0,00753	0,00938	-0,0059	0,04883
0,00938	0,01702	0,0249	0,03459	0,0313	0,0805
147,748	82,6027	55,6578	38,6265	43,9551	12,423
146,075	80,9477	54,9853	35,9265	43,4551	
1,01145	1,02045	1,01223	1,07515	1,01151	

$$\begin{aligned} x(F) &= -12,423 \text{ mm} \\ x(H) &= 1,69193 \text{ mm} \\ x(N) &= 6,43454 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1(F) &= -12,423 \text{ mm} \\ x_1(H) &= 1,69193 \text{ mm} \\ x_1(N) &= 6,43454 \text{ mm} \end{aligned}$$

R - rohovka
M - komorová voda
Č - čočka
Sk - sklivec
S - sítnice
Z - žlutá skvrna
D - duhovka
T - ciliární sval
C - cévnatka
B - bělima
P - papila, slepá skvrna
N - oční nerv

Změna parametrů Gullstrandova oka při akomodaci

akomodační klid:

$$x_1(F) = -15,706 \text{ mm}$$

$$x_1(H) = 1,34786 \text{ mm}$$

$$x_1(N) = 7,07811 \text{ mm}$$


$$x_1(F') = 24,3854 \text{ mm}$$

$$x_1(H') = 1,6008 \text{ mm}$$

$$x_1(N') = 7,33106 \text{ mm}$$

$$f' = 22,7846 \text{ mm}$$

$$\varphi'_o = 58,6361 \text{ D}$$



čočka:

$$\varphi'_c = 19,1109 \text{ D}$$

akomodační maximum:

$$x_1(F) = -12,423 \text{ mm}$$


$$x_1(H) = 1,69193 \text{ mm}$$

$$x_1(N) = 6,43454 \text{ mm}$$

$$x_1(F') = 20,8663 \text{ mm}$$

$$x_1(H') = 2,0088 \text{ mm}$$

$$x_1(N') = 6,75141 \text{ mm}$$



čočka:


$$f' = 18,8575 \text{ mm}$$

$$\varphi'_o = 70,8471 \text{ D}$$

$$\varphi'_c = 33,1060 \text{ D}$$

- mohutnost oka se zvýší asi o +12,2 D (21 %)
- mohutnost čočky se zvýší asi o +14,0 D
- ohniskové vzdálenosti se zkrátí asi o 17 %
- hlavní roviny se posunou směrem od rohovky asi o 0,35-0,40 mm
- uzlové body se posunou směrem k rohovce asi o 0,6 mm

změna parametrů Gullstrandova oka při akomodaci



	akom. klid	akom. max.
Indexy lomu :		
rohovka	1,376	1,376
komorová voda a sklivec	1,336	1,336
čočka ekvivalentní	1,406	1,406
čočka	1,386	1,386
Místo :		
první lámová plocha rohovky	0	0
druhé lámové plochy rohovky	0,5	0,5
první lám. plochy čočky	3,6	3,2
první lám. pl. ekviv. čočky	4,146	3,8725
druhé lám. pl. ekviv. čočky	6,565	5,5275
druhé lám. pl. čočky	7,2	7,2
optické centrum čočky		
Poloměry zakřivení :		
první lám. p. rohovky	7,7	7,7
druhé lám. pl. rohovky	6,8	6,8
ekviv. pl. čočky		
první lám. pl. čočky	10,000	5,33
první lám. pl. ekviv. čočky	7,911	2,655
druhé lám. pl. ekviv. čočky	5,76	2,655
druhé lám. pl. čočky	6,000	5,33
Optická mohutnost :		
první lám. pl. rohovky	48,83	48,83
druhé lám. pl. rohovky	-5,88	-5,88
ekviv. pl.		
první lám. pl. čočky	5,000	9,375
jádra čočky	5,985	14,96
druhé lám. pl. čočky	8,33	9,375
Rohovkový systém :		
optická mohutnost	43,05	43,05
místo předmětového hl. bodu	-0,0496	-0,0496
místo obrazového hl. bodu	-0,0506	-0,0506
předmětová ohnisková vzdálenost	-23,227	-23,227
obrazová ohnisková vzdálenost	31,031	31,131
Čočkový systém :		
optická mohutnost	19,11	33,06
místo předmětového hl. bodu	5,678	5,145
místo obrazového hl. bodu	5,808	5,255
ohnisková vzdálenost	69,908	40,416
Celkový systém :		
optická mohutnost	58,64	70,57
místo předmětového hl. bodu	1,348	1,722
místo obrazového hl. bodu	1,602	2,086
místo předm. ohniska	-15,707	-12,397
místo obraz. ohniska	24,387	21,016
předm. ohnisk. vzdál.	-17,055	-14,169
obraz. ohnisk. vzdál.	22,785	18,030
místo fovey centralis	24,00	24,00
axiální refrakce	1,00	-9,6
místo blízkého bodu P		102,3
skutečný střed otáčení oka C'	13,0	13,0
místo předmětového uzlového bodu	7,078	6,533
místo obraz. uzlového bodu	7,332	6,847
místo vstupní pupily	3,047	2,668
místo výstupní pupily	3,667	3,212

Arizona Eye Model

Name	Radius	Conic	Index	Abbe	Thickness
Cornea	7.8 mm	-0.25			
	6.5 mm	-0.25	1.377	57.1	0.55 mm
Aqueous			1.337	61.3	t_{aq}
	R_{ant}	K_{ant}			
Lens			n_{lens}	51.9	t_{lens}
	R_{post}	K_{post}			
Vitreous			1.336	61.1	16.713 mm
Retina	-13.4 mm	0.00			

$$R_{ant} = 12.0 - 0.4A$$

$$R_{post} = -5.224557 + 0.2A$$

$$t_{aq} = 2.97 - 0.04A$$

$$n_{lens} = 1.42 + 0.00256A - 0.00022A^2$$

$$K_{ant} = -7.518749 + 1.285720A$$

$$K_{post} = -1.353971 - 0.431762A$$

$$t_{lens} = 3.767 + 0.04A$$

A ..
accommodation
in diopters

$$z = \frac{r^2 / R}{1 + \sqrt{1 - (K + 1) \frac{r^2}{R^2}}}$$

z = sag of surface

$$r^2 = x^2 + y^2$$

R = radius of curvature

K = conic constant

$K < -1$	Hyperboloid
$K = -1$	Paraboloid
$-1 < K < 0$	Prolate Spheroid (Ellipsoid)
$K = 0$	Sphere
$K > 0$	Oblate Spheroid (Ellipsoid)

Orientační měření akomodace

- nutný je (pseudo)emetropický stav oka
- testovací obrazec (Duaneův test, Glaserův test, zmenšená Snellenova tabule) se přibližuje až do rozmazání, nebo vzdaluje až do zaostření
- akomodační šíře je pak dána vergencí vzdálenosti blízkého bodu P od předmětové hlavní roviny oka

$$A_{\text{š}} = A_R - A_P = \frac{1}{a_R} - \frac{1}{a_P} = \left| \frac{1}{a_P} \right|$$



DUANEŮV TEST

5m 1,45 mm
1m 0,29 mm

GLASERŮV TEST



Relativní akomodace

- měříme schopnost oka kompenzovat vliv brýlové čočky
- pozitivní relativní akomodace (PRA) je absolutní hodnota nejnižší (záporné) vrcholové lámavosti *rozptylné* brýlové čočky, při níž je ještě předmět vnímán ostře
- negativní relativní akomodace (NRA) je absolutní hodnota nejvyšší vrcholové lámavosti *spojsné* brýlové čočky, při níž je ještě předmět vnímán ostře
- při korekci presbyopie by korekční čočka měla zaručit PRA = NRA při pohledu do standardní pracovní vzdálenosti – pak je interval ostrého vidění dioptricky centrován kolem bodu pozorování


Definice blízkého bodu

- akomodační šíře je pak dána vergencí vzdálenosti blízkého bodu P od předmětové hlavní roviny oka
- **Fyzikální – manifestní blízký bod** = skutečně dosažitelný blízký bod (jak jej chápeme my)
- odpovídá mu manifestní akomodační šíře (akomodační šíře, jak ji chápeme my)
- **Fyziologický – latentní blízký bod** = bod, který by oko zobrazilo ostře při maximální kontrakci ciliárního svalu, pokud by to připustila elastická schopnost čočky
- odpovídá mu totální akomodační šíře

Klidová (zbytková) akomodace

- při prázdném zorném poli nebo ve tmě je mohutnost emetropického oka o 1,0 D - 1,5 D větší, než minimální, což odpovídá ostrému zobrazení ze vzdálenosti 1,0 m - 2/3 m, tj. oko je efektivně myopické
- **noční myopie** je posun k myopii při nízkém osvětlení (cca o 1,5 D, ale i více) vlivem otvorové vady při zvětšené pupile, osové barevné vady, posuvu maximální spektrální citlivosti k 500 nm (Purkyňův posuv) a nadměrné akomodace
- **přístrojová myopie** je nadměrná akomodace po použití přístrojů s okuláry

Závislost akomodační šíře na věku



J. Schwiegerling: Field Guide to Visual and Ophthalmic Optics. SPIE, Bellingham 2004, str. 25.

TABLE 8-1. AMPLITUDE OF ACCOMMODATION AS A FUNCTION OF AGE

Age (years)	A_s	Typical Amplitude of Accommodation (diopters) ^a
10		12.50
20		9.75
30		7.25
40		4.00
50		2.50
60		1.25
70		0.50
75		0.00


^aExtrapolated from the data of Donders (1864) and Duane (1912).

S. H. Schwartz : Geometrical and Visual Optics – A Clinical Introduction. McGraw Hill, New York 2002, str. 97.

- výsledky měření značně záleží na použité metodě
- akomodační šíře se zmenšuje asi o 0,25 D ročně od 20 let věku
- příčinou je zejména:
 - ztráta elasticity kapsule
 - růst čočky s věkem
 - redukce prostoru mezi ciliárním těliskem a okrajem čočky (růst čočky, hypertrofie ciliárního svalu), která vede ke snížení napětí zonulí
- asi od 30 let věku začíná jádro čočky tuhnout

(Tunnacliffe)

Přesný optický rozbor



Gaussova rovnice:

$$A'_R = A_R + \varphi'_{oR}$$

$$A'_X = A_X + \varphi'_{oX}$$

$$A_R - A_X = \varphi'_{oX} - \varphi'_{oR} - (A'_X - A'_R) = A_{kX} - \Delta A'_X$$

(nezanedbáváme posun hlavních rovin oka při akomodaci: $a'_X \neq \text{konst}$)

předpokládejme:

$$\Delta A'_X \approx \text{konst} \cdot A_{kX}$$

Gullstr. oko, X .. blízký bod:

$$A_R - A_P \approx 11 \text{ D}$$

$$\varphi'_{oP} - \varphi'_{oR} \approx 12,2 \text{ D}$$

$$\Delta A'_P \approx 1,2 \text{ D}$$


$$\text{konst} \approx 0,1$$

$$A_R - A_X = A_{kX} - 0,1 A_{kX} = 0,9 A_{kX}$$

↑

Graeffův faktor

Akomodace s korekcí do dálky



Akomodační šíře:

$$A_{\check{S}} = A_R - A_P = \frac{1}{a_R} - \frac{1}{a_P}$$

Emetrop též akomodační šíře:

$$a_P^E = -\frac{1}{A_{\check{S}}}$$

Gaussova rovnice pro BČ:

$$\frac{1}{a_P + d} \approx \frac{1}{a_{PD} + d} + S'_D$$

a současně platí:

$$S'_D = \frac{A_R}{1 + A_R d}$$


$$a_{PD} = a_P^E \left[1 + A_R d \left(2 - \left| \frac{d}{a_P} \right| \right) \right] \approx a_P^E (1 + 2 A_R d)$$

Myop (**hypermetrop**) má s korekcí do dálky blízký bod blíže k oku (**dále od oka**) ve srovnání s emetropem též akomodační šíře.

Pro $d = 12$ mm platí $a_{PD} \approx a_P^E (1 + 0,024 A_R)$.

Vzdálenost blízkého bodu s korekcí do dálky (P_D) se tedy liší od případu emetropického oka se stejnou akomodační šíří o 2,4 % na každou dioptriю axiální refrakce.

Presbyopie



J. Schwiegerling: Field Guide to Visual and Ophthalmic Optics. SPIE, Bellingham 2004, str. 25.



- pokles akomodační šíře pod cca 3 dioptrie (Tunnacliffe)
- blízký bod je pak vzdálen o více než 33 cm od oka
- koriguje se tzv. přídavkem do blízka (adicí) Add, o něž se zvyšuje přirozená akomodace oka, tj. platí $A'_k \approx A_k + Add$
- v tomto případě postačuje přibližný výpočet, tj. nepřepočítáváme lámavost podle vzdálenosti brýlové čočky

Korekce presbyopie

Technické možnosti korekce presbyopie:

- spojná (pozitivní) čočka
- bifokální, trifokální brýle (pro ametropa, dolní část obsahuje přídavek do blízka)
- „monovision“ (brýlové, kontaktní nebo nitrooční čočky, na jednom oku na blízko, na druhém do dálky)
- progresivní čočky (brýlové čočky s mohutností proměnnou ve vertikálním směru)
- akomodující nitrooční čočky (změna tvaru)
- difraktivní kontaktní a nitrooční čočky (mají několik ohnisek, umožňují současné vidění do různých vzdáleností)
- multizonální refraktivní kontaktní a nitrooční čočky (mají několik oblastí, obvykle anulárních, s různými mohutnostmi pro současné vidění)

Korekce presbyopie pro emetropické oko



daleký bod R pozorujeme bez akomodace (emetrop)
 $A_{kR} = A_R - A_R = 0$

při pozorování bodu X v konečné vzdálenosti je
nutná akomodace ($A_R = 0$)

$$A_{kX} = -A_X = -1/a_X$$

pro blízký bod P je nutná maximální akomodace

$$A_{kP} = -A_P = -1/a_P = A_{\text{š}}$$

chceme-li pozorovat ještě bližší bod Y, potřebovali
bychom akomodaci $A_{kY} > A_{\text{š}}$; musíme tedy určitou
reálnou akomodaci $A_k \leq A_{\text{š}}$ uměle zvětšit o

přídavek do blízka Add

$$A_k + Add = A_{kY} = -A_Y = -1/a_Y > A_{\text{š}}$$

přídavek Add působí jako permanentní
akomodace; relaxované oko pozoruje ostře bod
odpovídající této umělé akomodaci, vzniká umělý
daleký bod R_B , pro nějž platí

$$Add = -A_{RB} = -1/a_{RB}$$

a také blízký bod se přesouvá blíže oku do pozice
 P_B odpovídající maximální akomodaci $A_{\text{š}}$ zvětšené
o přídavek Add

$$A_{\text{š}} + Add = -1/a_{PB}$$

interval ostrého vidění je pak

$$(a_{RB}, a_{PB}) = \left(-\frac{1}{Add}, -\frac{1}{Add + A_{\text{š}}} \right)$$

Vhodná volba adice

rozhoduje poloha hlavního pracovního bodu HPB, jeho vzdálenost h od oka

$$a_{RB} = -1/Add$$

$$a_{PB} = -1/(Add + A_S)$$

$$Add = -1/h \quad (\text{extrém})$$



$$Add = -1/h - A_S/2$$



$$Add = -1/h - 2A_S/3$$



$$Add = -1/h - A_S \quad (\text{extrém})$$

R_B



$$(h = -20 \text{ cm} \quad A_S = 3,0 \text{ D})$$

$$Add (\text{D}) \approx age/8 - 5,00 \pm 0,25$$

(pro zajímavost, za předpokladu pracovní vzdálenosti 40 cm
podle W. F. Longa 1992)