



ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY STRAVOVÁNÍ



Mgr. Jana Petrová




ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY STRAVOVÁNÍ

- Obecný pojem
- Způsoby stravování odlišující se od nutričních zvyklostí většiny společnosti i od doporučení odborníků na výživu
- Obvykle založeny na restrikci určitých potravinových skupin, nejčastěji potravin živočišného původu




JEDNOTLIVÉ TYPY A CHARAKTERISTIKA

- Vegetariánství
 - Makrobiotika
 - Okrajové směry
 - Paleodieta
 - Výživa dle pH
 - Dělená strava
 - Výživa podle krevních skupin
 - Biopotraviny
- 

VEGETARIÁNSTVÍ

- nejrozšířenější alternativní způsob stravování v ČR (asi 2 % populace – 200 000 osob)
- vegetarián – obecně člověk nekonzumující maso
- konkrétně několik typů dle omezení konzumace živočišných potravin
 - semivegetariáni (pulo-, pesco-)
 - laktoovovegetariáni
 - vegani („beegani“)
 - fruitariáni
 - vitariáni – RAW food
 - flexitariáni





VEGETARIÁNSTVÍ

- původ pravděpodobně ve východních náboženstvích buddhismu a hinduismu
- termín pochází z 19. století (vegetus – svěží, čilý, živý)
- vegetariánské společnosti
 - The Vegetarian Society (1847 Anglie)
 - IVU – Mezinárodní vegetariánská unie (1908 Drážďany)
 - EVU – Evropská vegetariánská unie
 - Česká společnost pro výživu a vegetariánství
 - Česká vegetariánská společnost
- životní styl – střídmost, nekuřáctví, vyhýbání se alkoholu, pravidelná fyzická aktivita
- vegetariánská pyramida, duha



LOGA NĚKTERÝCH VEGE SPOLEČNOSTÍ



Česká společnost pro výživu a vegetariánství



Mezinárodní vegetariánská unie



Evropská vegetariánská společnost



Oils

2-3 Teaspoons

Nuts & Seeds

1-2 servings

Dairy

Vegan: Fortified Non-dairy Substitutes

3 servings

Vegetables

2-4 servings

And

Green Leafy Vegetables

2-3 servings



Vegan:

B-12 : 2.4 ug/d Vit D : 200 IU/d Calcium : 600 mg/d

Beans & Protein Foods

2-3 servings

Fruits

1-2 servings

And


Dried Fruit

1-2 servings

Breads, Cereals,

Pasta, Rice

6-10 servings




The Traditional Healthy Vegetarian Diet Pyramid

Daily Beverage
Recommendations:

6 Glasses of Water



Alcohol in
moderation



VEGAN FOOD GUIDE

DAILY PLAN FOR HEALTHY EATING


Get at least 60 minutes of physical activity each day.



Fortified Soymilk & Alternates
6-8 SERVINGS

Vegetables
3 OR MORE SERVINGS

Grains
6-11 SERVINGS



Other Essentials -SOURCES OF:
Omega-3 Fatty Acids
Vitamin B12
Vitamin D

Beans & Bean Alternates
2-3 SERVINGS

Fruit
2 OR MORE SERVINGS

Artwork by Dave Brousseau

Eat a variety of foods from each of the food groups.
Drink 6-8 glasses of water and/or other fluids each day.
Limit intake of concentrated fats, oils, and added sugars, if used.





VYJÁDŘENÍ ODBORNÍKŮ K VEGETARIÁNSTVÍ

Stanovisko Americké dietetické asociace z r. 2009

Vhodně naplánovaná vegetariánská strava je

- zdravá, nutričně vyvážená a zdravotně přínosná v prevenci i léčbě některých onemocnění
- vhodná pro jedince během všech období života
 - dětství včetně kojeneckého věku
 - adolescence
 - těhotenství a laktace
 - stáří

The Journal of the American Dietetic Association, July 2009, Volume 109, Number 7, pg. 1266-1279. http://www.vrg.org/nutrition/2009_ADA_position_paper.pdf

PŘÍNOSY VEGETARIÁNSTVÍ



- obvykle častější konzumace ovoce, zeleniny, obilovin, klíčků, luštěnin, ořechů, semen, rostlinných olejů
- obvykle nižší příjmy nasycených tuků, cholesterolu, živočišných proteinů
- nižší příjem energie
- životní styl
- strava založená na převážné konzumaci potravin rostlinného původu může snižovat riziko vzniku některých onemocnění
- je třeba zdůraznit, že riziko vzniku onemocnění ovlivněných konzumací stravy je obecně nízké za předpokladu vyvážené stravy, bez ohledu na to, zda je vegetariánská nebo ne

RIZIKA VEGETARIÁNSTVÍ



- nesprávná skladba stravy (špatná informovanost)
 - v rostlinných potravinách chybí některé výživové složky, některé složky jsou zastoupeny v malém množství
 - v rostlinných potravinách jsou přítomny látky snižující absorpci některých vitaminů a minerálních látek
 - ostatní
- ⇒ nedostatečný příjem některých výživových složek a z toho vyplývající rizika



SESTAVENÍ VHODNÉHO JÍDELNÍČKU

- dodržovat pestrost a vyváženost
- potravinové skupiny, které by neměly v jídelníčku chybět:
 - obiloviny a pseudoobiloviny
 - zelenina, ovoce
 - luštěniny a výrobky z nich
 - mléko, mléčné výrobky
 - vejce
 - ořechy, semena
 - rostlinné oleje
 - případně přídavek mořských řas



SESTAVENÍ VHODNÉHO JÍDELNÍČKU

- v jednotlivých pokrmech i v pokrmech během dne kombinovat různé zdroje bílkovin
 - obiloviny s luštěninami (fazolový guláš s pečivem, luštěninové polévky s vložkou z obilovin, šoulet atd.)
 - luštěniny s bramborami
 - rostlinné zdroje bílkovin s živočišnými (obiloviny s mléčnými výrobky – mléčné obilné kaše atd.)
- nenahrazovat masové pokrmy sladkými a smaženými pokrmy

PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU



- SN: ovesná kaše s ořechy a hroznovým vínem
- PŘ: chléb s ředkvičkovou pomazánkou
- OB: polévka cizrnový krém, lasagne se špenátem a mozarellou
- SV: banánový koktejl
- VČ: květákový mozeček, brambory, rajčatový salát

PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU



- SN: chléb s vaječnou pomazánkou, obložený paprikou
- PŘ: jablko
- OB: polévka zeleninová s drožd'ovými knedlíčky, mexické fazole
v tortille s jogurtovým dresinkem
- SV: pudink s ovocem
- VČ: pohankové rizoto se zeleninou, sýpané sý



RAW FOOD



- v současné době velice populární
- vitariánství, konzumace syrové (živé) stravy
- forma stravování bez tepelné úpravy, v co nejpřirozenější formě
- úprava stravy teplotou max. 42-45 °C
- dle zastánců nedochází k snižování nutriční hodnoty stravy, k ničení enzymů, vitaminů apod.
- syrové ovoce a zelenina, syrové ořechy a semínka, různé obiloviny, klíčky
- neklíčková masa, vnitřní orgány, vejce, mléko, sýry

RAW FOOD PYRAMID

Sea Weed
Nutritional yeast



MEDICINAL FOODS
EAT SPARINGLY

Herbs, Microgreens
& Wheat Grass Juice



Nuts & Seeds
Flex, Hemp Seeds



PROTEINS, AMINO ACIDS
EAT MODERATELY

Sprouts & Legumes



Fruits & Vegetables



FOUNDATION FOODS
EAT GENEROUSLY

Leafy Greens





PŘÍKLAD POKRMŮ




- banánová ovesná kaše s vlašskými ořechy
- miso polévka s houbami
- okurková polévka s bazalkou
- nudle z máslové dýně se šalvějovou omáčkou
- zeleninové závitky
- guacamole s kari a zeleninou
- chia pudink
- šťávy, koktejly, smoothie



MAKROBIOTIKA

- celosvětově rozšířený životní styl, úzce spjatý s výživou
- „umění dlouhého života“
- původ v zen-budhismu, prvky z taoismu
- snaha o návrat k přirozenému způsobu života
- zakladatel George Ohsawa (1893-1966, Japonsko, koncepce makrobiotického učení)
- makrobiotické učení dále rozvinuli Ohsawovi žáci



MAKROBIOTIKA - výživa

- podle makrobiotiky se potraviny odlišují rozdílným obsahem dvou protichůdných a vzájemně se doplňujících sil JIN, JANG

JIN TENDENCE = odstředivá síla (expanze), povrch, studené klima, chlad, zima, měsíc, pasivita, žena, rostliny, krátce vařené, lehkost, měkkost, vlhkost

JIN POTRAVINY = rychle rostoucí rostliny, rostliny rostoucí v horkém podnebí nebo za teplého počasí a ty, které obsahují více vody

JANG TENDENCE = dostředivá síla (kontrakce), nitro, teplé klima, léto, slunce, den, aktivita, muž, lidé a zvířata, déle vařené, větší hmotnost, tvrdost, suchost

JANG POTRAVINY = červené maso, drůbež, tvrdý sýr a vejce (vznikají koncentrací rostlin, konzumovaných živočichy), kořenová zelenina, semena, pozemní rostliny (rostoucí do země, kompaktní, hustší, menší obsah vody)

- poměr jin a jang tvoří „hodnotu“ každé potraviny
- harmonická strava – jin a jang v rovnováze
- energeticky nejvíce vyvážené – obiloviny

STUPEŇ	7	6	5	4	3	2	1	-1	-2	-3
CELOZRNNÉ PRODUKTY	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
ZELENINA		10	20	20	30	30	30	30	30	30
POLÉVKY				10	10	10	10	10	10	10
ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY						10	20	25	25	30
SALÁTY A OVOCE							10	10	10	15
SLADKÉ POKRMY								5	5	5
NÁPOJE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tab. 1: Stupňová klasifikace vyživovacího



MAKROBIOTIKA - výživa

- Jako základní pravidlo makrobiotické výživy je **konzumovat stravu pomalu, velmi dobře ji rozžvýkat.**
- Teorie tzv. biologické transmutace
- **Důraz dále kladen na:**
 - přirozenou stravu z lokálních zdrojů nebo alespoň ze stejného klimatického pásma, která odpovídá ročnímu období,
 - vyhýbání se konzumaci masa, mléka, mléčných výrobků, tropického ovoce, rafinovaného cukru, vajec, brambor, bílé mouky,
 - odmítání konzumace konzervovaných, chemicky ošetřených, uměle přibarvených, zmražených nebo ozářených potravin,
 - odmítání užívání léků, konzumace alkoholu

Makrobiotická výživa podle Kushiho pro mírné klima

- základ tvoří obiloviny, zelenina, luštěniny, fermentované potraviny
- menší část zastupují mořské řasy, semena, ořechy, ovoce mírného pásma a ryby
- makrobiotický talíř

Důležité zásady:

- Jez jen při pocitu hladu
- Důkladně kousej (50 x a více jedno sousto)
- Jez v sedě, v klidu, uvolněně
- Jez pravidelně 2-3 x denně množství podle potřeby, od stolu odcházej uspokojený, ne plný
- Tekutiny pij střídmdě, pouze při pocitu žízně





Makrobiotická výživa podle Kushiho

- **50 – 60 % celozrnné obiloviny a produkty z celozrnné mouky**
 - Denně - hnědá rýže, ječmen, jáhly, pšenice, oves, žito, kukuřice, pohanka
 - Občas celozrnné těstoviny, celozrnný kváskový chléb, celozrnný žitný chléb, bulgur, kuskus, polenta
- **25-30 % zelenina – v každém jídle**
- **2/3 vařená, opečená na malém množství rostlinného oleje, 1/3 syrové saláty, pickles (kvašená)**
 - Denně - zelí, čínské zelí, kapusta, pórek, brokolice, květák, mrkev, cibule, dýně, ředkvičky, kedluben, řeřicha, petržel, pampeliška...
 - 2-3 x týdně – okurky, celer, houby, bylinky
 - Nevhodné – brambory, špenát, červená řepa, papriky, rajčata
- **5-10 % luštěniny (ne více jak jednou denně), mořské řasy**
- **5-10 % (1-2 šálky denně) polévky**




Makrobiotická výživa podle Kushiho

- **Občas:** 2-3 x týdně rybí maso; 2-3 x týdně čerstvé nebo sušené sezónní ovoce mírného pásma; 1-2 šálky týdně semínka (sezamová, dýňová, slunečnicová) a ořechy (mandle, vlašské ořechy, pekanové ořechy, kaštiny, arašídy, kokos); na slazení – rýžový sirup, ječný slad; olej nejlépe nerafinovaný kukuřičný nebo sezamový
- **Nápoje:** čistá voda, vhodné druhy čaje
- **Vyhýbat se:** maso, mléko, živočišný tuk, vejce, mléko a ml. výrobky, rafinovaný cukr, med, melasa, čokoláda, jednoduché cukry a jimi slazené potraviny, tropické ovoce, umělé nápoje, aromatické a stimulující čaje, přibarvený čaj, opracovaná obilná zrna, bílá mouka a výrobky z ní, pálivé koření, kofeín, stimulační potraviny, umělé sladidla, kukuřičný škrob, kukuřičný


MAKROBIOTICKÝ TALÍŘ

- 40% to 60% cereal grains
- 1 to 2 bowls of soup
- 20% to 30% vegetables
- 5% to 10% beans and sea vegetables
- Other foods revolving around the main ones, including condiments, seasonings, nuts, seeds, fruits, sweets, desserts, white-meat fish and beverages



Great Life Pyramid


Macrobiotic Dietary Guidelines for a Temperate Climate



MAKROBIOTICKÝ TALÍŘ


Graf č. 2

Letní talíř



Graf č. 3

Zimní talíř





VÝŽIVA PODLE PH

- Princip – udržení rovnováhy mezi kyselinami a zásadami v lidském těle
- Překyselení – základ pro vznik poruch a onemocnění
- Alkalizující versus okyselující potraviny
- **Potraviny zvyšující pH - a tedy zásaditost (od nejučinnějších k těm méně):**
 - jedlá soda,
 - rozinky, sušené figy, okurky, špenát, zázvor, celer, brokolice, kapusta, petržel,
 - mrkev, pampelišky, zeleninová nať, kedluben, černý rybíz, citrón,
 - čistý lecitin, houby, květák, meloun, mango,
 - řepa, ředkev, ředkvička, česnek,
 - hlávkový salát, černá melasa, olivy, jablečný ocet, rajčata,
 - sojové boby, pomeranče, cibule, zelené fazole (lusky)

• ~~černý rybíz, meloun, mango, květák, houby, lecitin, zeleninová nať, ředkvička, ředkev, řepa, okurky, sušené figy, rozinky, jedlá soda~~

•



VÝŽIVA PODLE PH

- Potraviny snižující pH a způsobující kyselost (v pořadí od těch nejvíc okyselujících k těm méně):
 - vepřové, telecí, rýže tmavá, králík, mořští raci, hovězí, ústřice, uzeniny, soft drinks
 - ryby, jiné maso, vajíčka, likéry, čokoláda, tvrdý a uleželý sýr, krocán, kuře,
 - oves, čaj černý, perlivé nápoje,
 - chléb, margarín, vlašské, burské a kešu ořechy, další obilniny, těstoviny, bílá rýže
 - pitná voda při spodní hranici normy (norma 6,5 -9,5 pH) nebo pod ní
 - tvaroh a čerstvý měkký sýr, kokosový ořech, mandle, máslo a smetana,
 - sýrovátka, luskoviny a kozi mléko, přezle

PALEOLITICKÁ STRAVA


- Snaha přiblížit se stravě, kterou člověk konzumoval v období paleolitu, výběr zdrojů ze současných potravin

Základ stravy

- Libové maso, ryby
- Vejce
- Ovoce, lesní plody
- Zelenina, zejména kořenová
- Ořechy

Omezit

- Obiloviny
- Luštěniny
- Brambory
- Rafinované oleje
- Cukr, sůl



OKRAJOVÉ SMĚRY – DĚLENÁ STRAVA

- William Howard Hay – lékař z New Yorku
- Hlavní zásada – oddělená konzumace potravin bohatých na bílkoviny a potravin bohatých na sacharidy
- Neutrální potraviny – tuky, zakysané mléčné výrobky, čerstvé sýry, tvaroh, některé druhy zeleniny, bylinky, ořechy a semena

Později připojené zásady

- Nekombinovat potraviny bílkovinné s ovocem
- Ovoce nekombinovat se zeleninou
- Dodržovat pitný režim (2-3 l tekutin denně)
- Jíst v klidu



VÝŽIVA DLE KREVNÍCH SKUPIN

- Kniha Výživa a krevní skupiny autora Petera J.D. Adama
- Stravování jedince podle typu jeho krevní skupiny
- Seznam potravin pro každou krevní skupinu
- 3 kategorie potravin
 - Velmi prospěšné
 - Neutrální
 - Zakázané
- Důvodem tohoto způsobu stravování je podle autora výskyt lektinů v potravinách a reakce imunitního systému člověka na tyto látky, která je ovlivněna krevní skupinou.



VÝŽIVA PODLE ÁJURVÉDY



- Ájurvéda je tradiční indická medicína stará přes 5000 let
- Cílem je dosažení rovnováhy mezi tělem člověka, jeho duší, smysly a okolním prostředím
- Hlavním principem je poměr 3 základních typů energie Váta, Pitta a Kapha – odlišný u každého člověka
 - Konstituční typ
 - Činnost organismu člověka
 - Výběr vhodných potravin pro každý typ

Další doporučení


- Upřednostňování rostlinné stravy v co nejčerstvějším stavu
- Vyhýbání se potravinám obsahujícím konzervanty a jiné aditivní látky
- Přizpůsobení stravy ročnímu období, klimatu, věku

BIOPOTRAVINY



K alternativním způsobům stravování je někdy řazeno i konzumování tzv. organické výživy, neboli biopotravin pocházejících z ekologických farem, které v posledních letech přerůstá v životní styl, který se snaží nejen o zdravější způsob života, ale i o šetrnější přístup k přírodě a zvířatům.

PROČ ALTERNATIVNÍ STRAVOVÁNÍ



- Zdravotní důvody
- Morální a etické důvody
- Ekologické hledisko
- Ekonomické důvody
- Náboženství
- Sociální faktory
- Chuťová preference



NUTRIČNÍ A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY

- Závisí na stupni omezení potravin živočišného původu a na skladbě konzumovaných potravin.
- **Co přináší možná rizika alternativních způsobů stravování**
 - Špatná informovanost
 - Nesprávná skladba stravy
 - V rostlinných potravinách chybí některé nutriční složky, některé složky jsou zastoupeny v malém množství
 - Přítomnost inhibitorů absorpce některých nutrientů
 - Ostatní
- **Přínosy alternativních způsobů stravování**
 - Vyšší konzumace ovoce, zeleniny, obilovin, klíčků, luštěnin, ořechů, semen, rostlinných olejů
 - Nižší příjmy nasycených tuků, cholesterolu, živočišných proteinů
 - Nižší energetická hustota
 -



OBECNÉ ZHODNOCENÍ

- Převážná většina epidemiologických studií se zabývá vegetariánstvím a jeho podskupinami

Vegetariáni částečně konzumující potraviny živ. původu

- Při správné kombinaci potravin obvykle problémy s nedostatkem životně důležitých nutrientů nemají
- Potenciální rizika nejčastěji vycházejí ze špatné skladby stravy

Veganství

- Dodržování mnoha pravidel
- Svoji stravu musí obohacovat o chybějící složky formou doplňků stravy nebo fortifikovaných potravin – vitamin B12, B2, D, Ca, I

Vitariáství

- Určité kladné stránky
- Negativa - ↑ obsah přírodních toxických a antinutričních látek, hygienická jakost, stravitelnost
- Nelze zajistit dostatek všech esenciálních nutrientů v potravě



OBECNÉ ZHODNOCENÍ

Makrobiotika

- Nižší stupně mohou uspokojit nutriční potřeby dospělého člověka
- Vyšší restriktivní stupně – nedostatečné jak z hlediska nutričního, tak energetického
- Nedostatek – hodnotných bílkovin, Ca, Fe, PUFA, vitaminů A, C, D a B12

Dělená strava

- Při dodržování pestrosti a pravidelnosti může zajistit dostatečné množství všech potřebných nutrientů
- Principy oddělené konzumace sacharidových a bílkovinných potravin jsou neopodstatnělé a vědecky nepodložené

Výživa podle krevních skupin

- Teoretické předpoklady této výživy nejsou seriózní
- Při striktním dodržování doporučovaných pravidel by mohlo u nositelů některých krevních skupin dojít k deficitu životně důležitých nutrientů

Ájurvéda

-
-



VYBRANÉ RIZIKOVÉ NUTRIČNÍ SLOŽKY

- Bílkoviny
- Nenasycené mastné kyseliny
- Železo
- Vápník
- Zinek
- Jód
- Vitamin B12
- Vitamin D
- Karnitin
- Toxické kovy - kadmium
- Konečné produkty pokročilé glykace 111

BÍLKOVINY



- Nižší biologická hodnota rostlinných bílkovin
- Nedostatek esenciálních AMK (methionin a lysin)
- Nižší celkový % podíl esenciálních AMK
- Horší stravitelnost

- K příjmu všech esenciálních AMK je nutné konzumovat rozmanité zdroje rostlinných bílkovin během dne
- Kvalita rostlinných bílkovin se zvyšuje, pokud se vzájemně kombinují, nebo se kombinují s mlékem, mléčnými produkty či s vejci
- Optimální je kombinovat luštěniny s obilovinami a hrachem

PUFA



- Vegetariánská, obzvláště veganská výživa se vyznačuje
 - Nízkým příjmem nenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem – EPA, DHA, AA
 - Vysokým příjmem kyseliny linolové
- Vegetariáni a vegani jsou odkázáni na tvorbu EPA a DHA z kyseliny α -linolenové
 - Tato konverze však není příliš účinná: < 5-10 % EPA a 2-5 % DHA
 - Konverzi navíc inhibuje \uparrow obsah PUFA ω -6 ve stravě (až o 40 %), nedostatek energie, proteinů, deficit pyridoxinu, biotinu, vápníku, mědi, hořčíku a zinku a podílet se může nadměrný příjem trans-nenasycených mastných kyselin
 - Negativní vliv má i deficit železa

⇒ Zvýšit příjem kyseliny α -linolenové, zahrnutím do stravy nízkým poměrem ω -6: ω -3 jako jsou vlněnec, lněný olej, lněná semínka, lněná



ŽELEZO

- V rostlinách v nehemové formě, vstřebatelnost asi 3-5 %, velmi závisí na celkovém složení stravy
- **Absorpci negativně ovlivňují**
 - inhibitory vstřebávání - kyselina fytová, polyfenoly, kyselina šťavelová (?), vláknina
 - současný vysoký příjem vápníku, zinku, hořčíku a draslíku
 - rostlinné bílkoviny v sóje a ořechách
- **Absorpci zlepšuje**
 - vitamin C a organické kyseliny v ovoci a zelenině
 - přítomnost AMK
 - máčení a klíčení semen, fermentační procesy
- Předpoklad adaptace nízkým příjmům železa cestou zvýšené absorpce
- Dospělí vegetariáni mají nižší zásoby železa oproti konzumentům masa
sérové hodnoty feritinu jsou obvykle v normě

VÁPŇÍK



- V potravinách rostlinného původu dostupnost snížena
 - Přítomností fytátů, kyseliny šťavelové, většího množství vlákniny
- Správně naplánovaná vegetariánská strava dokáže zajistit dostatečné množství vápníku ve stravě, i když v případě veganství je někdy snazší používat fortifikované potraviny nebo suplementa.

ZINEK

- Absorpci negativně ovlivňují inhibitory vstřebávání, stejné jako v případě železa - ↑ kyselina fytová
- Sója, sójové produkty, ostatní luštěniny, zrna, ořechy, sýry
- Při srovnání obilovin a luštěnin jsou luštěniny lepším zdrojem zinku

• Absorpci zvyšují vitamíny B6 a B12, vitamín C, kyselina askorbová, vitamín E, vitamín K, vitamín P, vitamín U, vitamín Y, vitamín Z, vitamín AA, vitamín AB, vitamín AC, vitamín AD, vitamín AE, vitamín AF, vitamín AG, vitamín AH, vitamín AI, vitamín AJ, vitamín AK, vitamín AL, vitamín AM, vitamín AN, vitamín AO, vitamín AP, vitamín AQ, vitamín AR, vitamín AS, vitamín AT, vitamín AU, vitamín AV, vitamín AW, vitamín AX, vitamín AY, vitamín AZ, vitamín BA, vitamín BB, vitamín BC, vitamín BD, vitamín BE, vitamín BF, vitamín BG, vitamín BH, vitamín BI, vitamín BJ, vitamín BK, vitamín BL, vitamín BM, vitamín BN, vitamín BO, vitamín BP, vitamín BQ, vitamín BR, vitamín BS, vitamín BT, vitamín BU, vitamín BV, vitamín BW, vitamín BX, vitamín BY, vitamín BZ, vitamín CA, vitamín CB, vitamín CC, vitamín CD, vitamín CE, vitamín CF, vitamín CG, vitamín CH, vitamín CI, vitamín CJ, vitamín CK, vitamín CL, vitamín CM, vitamín CN, vitamín CO, vitamín CP, vitamín CQ, vitamín CR, vitamín CS, vitamín CT, vitamín CU, vitamín CV, vitamín CW, vitamín CX, vitamín CY, vitamín CZ, vitamín DA, vitamín DB, vitamín DC, vitamín DD, vitamín DE, vitamín DF, vitamín DG, vitamín DH, vitamín DI, vitamín DJ, vitamín DK, vitamín DL, vitamín DM, vitamín DN, vitamín DO, vitamín DP, vitamín DQ, vitamín DR, vitamín DS, vitamín DT, vitamín DU, vitamín DV, vitamín DW, vitamín DX, vitamín DY, vitamín DZ, vitamín EA, vitamín EB, vitamín EC, vitamín ED, vitamín EE, vitamín EF, vitamín EG, vitamín EH, vitamín EI, vitamín EJ, vitamín EK, vitamín EL, vitamín EM, vitamín EN, vitamín EO, vitamín EP, vitamín EQ, vitamín ER, vitamín ES, vitamín ET, vitamín EU, vitamín EV, vitamín EW, vitamín EX, vitamín EY, vitamín EZ, vitamín FA, vitamín FB, vitamín FC, vitamín FD, vitamín FE, vitamín FF, vitamín FG, vitamín FH, vitamín FI, vitamín FJ, vitamín FK, vitamín FL, vitamín FM, vitamín FN, vitamín FO, vitamín FP, vitamín FQ, vitamín FR, vitamín FS, vitamín FT, vitamín FU, vitamín FV, vitamín FW, vitamín FX, vitamín FY, vitamín FZ, vitamín GA, vitamín GB, vitamín GC, vitamín GD, vitamín GE, vitamín GF, vitamín GG, vitamín GH, vitamín GI, vitamín GJ, vitamín GK, vitamín GL, vitamín GM, vitamín GN, vitamín GO, vitamín GP, vitamín GQ, vitamín GR, vitamín GS, vitamín GT, vitamín GU, vitamín GV, vitamín GW, vitamín GX, vitamín GY, vitamín GZ, vitamín HA, vitamín HB, vitamín HC, vitamín HD, vitamín HE, vitamín HF, vitamín HG, vitamín HH, vitamín HI, vitamín HJ, vitamín HK, vitamín HL, vitamín HM, vitamín HN, vitamín HO, vitamín HP, vitamín HQ, vitamín HR, vitamín HS, vitamín HT, vitamín HU, vitamín HV, vitamín HW, vitamín HX, vitamín HY, vitamín HZ, vitamín IA, vitamín IB, vitamín IC, vitamín ID, vitamín IE, vitamín IF, vitamín IG, vitamín IH, vitamín II, vitamín IJ, vitamín IK, vitamín IL, vitamín IM, vitamín IN, vitamín IO, vitamín IP, vitamín IQ, vitamín IR, vitamín IS, vitamín IT, vitamín IU, vitamín IV, vitamín IW, vitamín IX, vitamín IY, vitamín IZ, vitamín JA, vitamín JB, vitamín JC, vitamín JD, vitamín JE, vitamín JF, vitamín JG, vitamín JH, vitamín JI, vitamín JJ, vitamín JK, vitamín JL, vitamín JM, vitamín JN, vitamín JO, vitamín JP, vitamín JQ, vitamín JR, vitamín JS, vitamín JT, vitamín JU, vitamín JV, vitamín JW, vitamín JX, vitamín JY, vitamín JZ, vitamín KA, vitamín KB, vitamín KC, vitamín KD, vitamín KE, vitamín KF, vitamín KG, vitamín KH, vitamín KI, vitamín KJ, vitamín KK, vitamín KL, vitamín KM, vitamín KN, vitamín KO, vitamín KP, vitamín KQ, vitamín KR, vitamín KS, vitamín KT, vitamín KU, vitamín KV, vitamín KW, vitamín KX, vitamín KY, vitamín KZ, vitamín LA, vitamín LB, vitamín LC, vitamín LD, vitamín LE, vitamín LF, vitamín LG, vitamín LH, vitamín LI, vitamín LJ, vitamín LK, vitamín LL, vitamín LM, vitamín LN, vitamín LO, vitamín LP, vitamín LQ, vitamín LR, vitamín LS, vitamín LT, vitamín LU, vitamín LV, vitamín LW, vitamín LX, vitamín LY, vitamín LZ, vitamín MA, vitamín MB, vitamín MC, vitamín MD, vitamín ME, vitamín MF, vitamín MG, vitamín MH, vitamín MI, vitamín MJ, vitamín MK, vitamín ML, vitamín MM, vitamín MN, vitamín MO, vitamín MP, vitamín MQ, vitamín MR, vitamín MS, vitamín MT, vitamín MU, vitamín MV, vitamín MW, vitamín MX, vitamín MY, vitamín MZ, vitamín NA, vitamín NB, vitamín NC, vitamín ND, vitamín NE, vitamín NF, vitamín NG, vitamín NH, vitamín NI, vitamín NJ, vitamín NK, vitamín NL, vitamín NM, vitamín NN, vitamín NO, vitamín NP, vitamín NQ, vitamín NR, vitamín NS, vitamín NT, vitamín NU, vitamín NV, vitamín NW, vitamín NX, vitamín NY, vitamín NZ, vitamín OA, vitamín OB, vitamín OC, vitamín OD, vitamín OE, vitamín OF, vitamín OG, vitamín OH, vitamín OI, vitamín OJ, vitamín OK, vitamín OL, vitamín OM, vitamín ON, vitamín OO, vitamín OP, vitamín OQ, vitamín OR, vitamín OS, vitamín OT, vitamín OU, vitamín OV, vitamín OW, vitamín OX, vitamín OY, vitamín OZ, vitamín PA, vitamín PB, vitamín PC, vitamín PD, vitamín PE, vitamín PF, vitamín PG, vitamín PH, vitamín PI, vitamín PJ, vitamín PK, vitamín PL, vitamín PM, vitamín PN, vitamín PO, vitamín PP, vitamín PQ, vitamín PR, vitamín PS, vitamín PT, vitamín PU, vitamín PV, vitamín PW, vitamín PX, vitamín PY, vitamín PZ, vitamín QA, vitamín QB, vitamín QC, vitamín QD, vitamín QE, vitamín QF, vitamín QG, vitamín QH, vitamín QI, vitamín QJ, vitamín QK, vitamín QL, vitamín QM, vitamín QN, vitamín QO, vitamín QP, vitamín QQ, vitamín QR, vitamín QS, vitamín QT, vitamín QU, vitamín QV, vitamín QW, vitamín QX, vitamín QY, vitamín QZ, vitamín RA, vitamín RB, vitamín RC, vitamín RD, vitamín RE, vitamín RF, vitamín RG, vitamín RH, vitamín RI, vitamín RJ, vitamín RK, vitamín RL, vitamín RM, vitamín RN, vitamín RO, vitamín RP, vitamín RQ, vitamín RR, vitamín RS, vitamín RT, vitamín RU, vitamín RV, vitamín RW, vitamín RX, vitamín RY, vitamín RZ, vitamín SA, vitamín SB, vitamín SC, vitamín SD, vitamín SE, vitamín SF, vitamín SG, vitamín SH, vitamín SI, vitamín SJ, vitamín SK, vitamín SL, vitamín SM, vitamín SN, vitamín SO, vitamín SP, vitamín SQ, vitamín SR, vitamín SS, vitamín ST, vitamín SU, vitamín SV, vitamín SW, vitamín SX, vitamín SY, vitamín SZ, vitamín TA, vitamín TB, vitamín TC, vitamín TD, vitamín TE, vitamín TF, vitamín TG, vitamín TH, vitamín TI, vitamín TJ, vitamín TK, vitamín TL, vitamín TM, vitamín TN, vitamín TO, vitamín TP, vitamín TQ, vitamín TR, vitamín TS, vitamín TT, vitamín TU, vitamín TV, vitamín TW, vitamín TX, vitamín TY, vitamín TZ, vitamín UA, vitamín UB, vitamín UC, vitamín UD, vitamín UE, vitamín UF, vitamín UG, vitamín UH, vitamín UI, vitamín UJ, vitamín UK, vitamín UL, vitamín UM, vitamín UN, vitamín UO, vitamín UP, vitamín UQ, vitamín UR, vitamín US, vitamín UT, vitamín UU, vitamín UV, vitamín UW, vitamín UX, vitamín UY, vitamín UZ, vitamín VA, vitamín VB, vitamín VC, vitamín VD, vitamín VE, vitamín VF, vitamín VG, vitamín VH, vitamín VI, vitamín VJ, vitamín VK, vitamín VL, vitamín VM, vitamín VN, vitamín VO, vitamín VP, vitamín VQ, vitamín VR, vitamín VS, vitamín VT, vitamín VU, vitamín VV, vitamín VW, vitamín VX, vitamín VY, vitamín VZ, vitamín WA, vitamín WB, vitamín WC, vitamín WD, vitamín WE, vitamín WF, vitamín WG, vitamín WH, vitamín WI, vitamín WJ, vitamín WK, vitamín WL, vitamín WM, vitamín WN, vitamín WO, vitamín WP, vitamín WQ, vitamín WR, vitamín WS, vitamín WT, vitamín WU, vitamín WV, vitamín WW, vitamín WX, vitamín WY, vitamín WZ, vitamín XA, vitamín XB, vitamín XC, vitamín XD, vitamín XE, vitamín XF, vitamín XG, vitamín XH, vitamín XI, vitamín XJ, vitamín XK, vitamín XL, vitamín XM, vitamín XN, vitamín XO, vitamín XP, vitamín XQ, vitamín XR, vitamín XS, vitamín XT, vitamín XU, vitamín XV, vitamín XW, vitamín XX, vitamín XY, vitamín XZ, vitamín YA, vitamín YB, vitamín YC, vitamín YD, vitamín YE, vitamín YF, vitamín YG, vitamín YH, vitamín YI, vitamín YJ, vitamín YK, vitamín YL, vitamín YM, vitamín YN, vitamín YO, vitamín YP, vitamín YQ, vitamín YR, vitamín YS, vitamín YT, vitamín YU, vitamín YV, vitamín YW, vitamín YX, vitamín YY, vitamín YZ, vitamín ZA, vitamín ZB, vitamín ZC, vitamín ZD, vitamín ZE, vitamín ZF, vitamín ZG, vitamín ZH, vitamín ZI, vitamín ZJ, vitamín ZK, vitamín ZL, vitamín ZM, vitamín ZN, vitamín ZO, vitamín ZP, vitamín ZQ, vitamín ZR, vitamín ZS, vitamín ZT, vitamín ZU, vitamín ZV, vitamín ZW, vitamín ZX, vitamín ZY, vitamín ZZ



JÓD

- Obsah jódu v potravinách rostlinného původu u nás je nízký v závislosti na jeho nízké koncentraci v půdě
- Vegetariáni (↑ vegani) jsou ve zvýšeném riziku deficitu jódu
- Vyšší riziko mentálních, psychomotorických a růstových abnormalit
- Nejcitlivější na nedostatek jódu jsou novorozenci, kojenci, dospívající dívky, těhotné a kojící ženy
- Riziko deficitu zvyšují strumigenní látky tzv. goitrogeny obsažené převážně v košťálové zelenině dále v sojových bobech a sladkých bramborách
- ⇒ Konzumace mořských řas, minerálních vod s obsahem jódu
používání jodizované kuchyňské soli



VITAMIN B₁₂

- Rostlinné zdroje potravin vitamin B₁₂ neobsahují, pokud nejsou kontaminovány MIO, které tento vitamin produkují
- Hlavními potravními zdroji - maso, ryby, vejce, mléčné výrobky, kvasnice, vitamin také obsahují fortifikované potraviny (některé druhy sójových náhražek mlék, snídaňové cereálie)
- Sójové výrobky jako miso, tempeh, tamari, shoyu a některé produkty z řas obsahují pouze korinoidy, analoga vitaminu B₁₂, která zpravidla nemají fyziologické účinky srovnatelné s účinkem vitaminu B₁₂
- Deficit vitaminu B₁₂ u dospělých hrozí většinou až po dlouhodobém omezení konzumace potravin živočišného původu, → bohaté endogenní zásoby činící až 3 mg, narozdíl od novorozenců → zásoba jen asi 25 µg
 - Deficit - megaloblastická anémie, metabolické a neurologické poruchy
 - Negativní ovlivnění vývoje mozku u dětí
 - Deficit - megaloblastická anémie



VITAMIN D

- Vitamin D3 – cholekalciferol → výskyt v živočišných potravinách
- Vitamin D2 - ergokalciferol - v rostlinných zdrojích, vstřebávání dle některých studií méně účinné (?)
- Absorpci negativně ovlivňuje vysoký obsah fytátů ve stravě
- Fortifikace potravin, suplementa
- Nejvíce ohroženi jsou jedinci konzumující výhradně potraviny rostlinného původu, odmítající příjem suplement a fortifikovaných potravin, obzvláště v zimních měsících
- Více ohroženi děti a senioři u nichž je syntéza vitamínu D méně účinná
- U makrobioticky krmených dětí – vyšší prevalence křivice



KARNITIN

- Nezbytný pro metabolismus MK s dlouhým řetězcem
- Hodnota karnitinu v krvi je částečně závislá na příjmu potravy, asi 1/3 denní potřeby vzniká endogenní syntézou
- Vysoký obsah karnitinu se nachází v mase, nižší obsah je v mléčných produktech, potraviny rostlinného původu obsahují karnitinu velmi málo nebo žádný
- Jedinci omezující konzumaci masa nebo všech potravin živočišného původu mohou být v riziku nedostatku karnitinu
 - z hlediska jeho nedostatečného množství v potravě
 - možným snížením endogenní tvorby karnitinu z důvodu nízkých příjmů esenciálních AMK methioninu a lysinu a možného výskytu defektního železa



KADMIUM

- Toxický kov (↑ ledviny, játra) s dlouhým biologickým poločasem
- Kumulace v rostlinách
- Vyšší obsah v obilovinách (obaly zrn, klíčky), semenech, luštěninách a listové zelenině
- Zvýšené hladiny kadmia u vegetariánů, obzvláště veganů, korelace s délkou praktikování
- ↓ toxického vlivu – přítomnost selenu, vysoká saturace organismu železem, vápníkem, zinkem
- Úlohu při detoxikaci – glutathion



KONEČNÉ PRODUKTY POKROČILÉ GLYKACE BÍLKOVIN (AGEs)

- Vznik neenzymatickou reakcí redukujících cukrů s volnou aminoskupinou
- Vznikají při tepelné úpravě potravin
- Negativně ovlivňují funkční vlastnosti bílkovin, tuků, DNA
- Hrají důležitou roli v procesu aterosklerózy, v komplikacích diabetu, při stárnutí a chronické renální insuficienci
- U vegetariánů naměřeny vyšší hodnoty – příčinou je vyšší příjem potravin s převahou fruktózy, která je oproti glukóze reaktivnější díky vyššímu podílu acyklické formy
- AGEs mohou představovat určité riziko, avšak ochranný efekt dostatečné konzumace ovoce a zeleniny je z nutričního hlediska dominantní




ZDRAVOTNÍ ASPEKTY

- Způsob výživy spolu se zdravotním stylem sehrávají významnou úlohu v ochraně zdraví a prevenci chronických degenerativních onemocnění a metabolických poruch.
- Mortalita - u vegetariánů nižší míra úmrtnosti z ICHS
- Kardiovaskulární onemocnění
- ↓ hodnoty krevního tlaku o 5-10 mmHg, ↓ výskyt hypertenze
- ↓ hmotnost, BMI o 1-2kg/m² nižší
- nižší hodnoty celkového cholesterolu, LDL a TAG, TNMK, vyšší hodnoty HDL
- Diabetes mellitus 2. typu
- Nádorová onemocnění - kolorekta, prostaty a prsu (?)
- Další onemocnění - protilátky, zácpa, HIV/AIDS



VYBRANÉ RIZIKOVÉ POPULAČNÍ SKUPINY

- DĚTI
 - DOSPÍVAJÍCÍ
 - TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY
 - SPORTOVCI
 - SENIOŘI
- 



ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY

**STRAVOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH
STUDENTŮ V BRNĚ**



ÚVOD

➤ **Práce se zabývala:**

- rozšířením jednotlivých forem alternativního stravování mezi studenty vysokých škol v Brně
- postoji a znalostmi studentů o této problematice
- srovnáním stravovacích zvyklostí studentů stravujících se alternativním způsobem a konvenčně

CÍLE PRÁCE

- **1.** Zjistit **výskyt** alternativních způsobů stravování u studentů VŠ v Brně, zjistit nejčastěji zastoupený alternativní způsob stravování.
- **2.** Posoudit **stravovací zvyklosti** alternativně se stravujících studentů a porovnat je se studenty stravujícími se konvenčním způsobem.
- **3.** Zjistit **důvody**, které studenty k alternativnímu způsobu stravování vedou.
- **4.** Zjistit **postoje** studentů k alternativním způsobům stravování.

HYPOTÉZY

➤ **I. Nulová hypotéza H_0 :**

Frekvence výskytu alternativních způsobů stravování se mezi ženami a muži neliší.

Alternativní hypotéza H_A :

Frekvence výskytu alternativních způsobů stravování se mezi ženami a muži liší.

➤ **II. Nulová hypotéza H_0 :**

Frekvence výskytu alternativních způsobů v závislosti na zaměření studia se neliší.

Alternativní hypotéza H_A :

Frekvence výskytu alternativních způsobů v závislosti na zaměření studia se liší.

➤ **III. Alternativně se stravující studenti do svého jídelníčku častěji zařazují ovoce a zeleninu než konzumenti konvenční smíšené stravy.**

➤ **IV. Studenti alternativně se stravující se více vyhýbají slaným pochutinám než konzumenti smíšené stravy.**

➤ **V. Alternativně se stravující studenti méně často konzumují pokrmy rychlého občerstvení než konzumenti smíšené stravy.**

METODIKA

1) Vyšetřované osoby

- 527 studentů ve věku 19-31 let
- MU, VFU, VUT, MZLU
- z důvodu neadekvátního početního zastoupení studentů z jednotlivých fakult byli studenti rozděleni do tří skupin podle celkového studijního zaměření:
 - Humanitní zaměření (H): PdF, FSS, FF, PrF
 - Přírodovědné zaměření (P): LF, VFU, PřF, AF, FSpS
 - Technické zaměření (T): FI, fakulty VUT, ESF, PEF

METODIKA

2) Metody a prostředky šetření

- dotazníkové šetření (17 otázek, frekvenční dotazník)
- z celkem oslovených 527 studentů nikdo dotazník neodmítl odevzdat
- 11 dotazníků muselo být z šetření vyřazeno z důvodu nedostatečného či neadekvátního vyplnění požadovaných údajů

3) Metody zpracování


- Epi Info verze 3.4.3
- Microsoft Excel



VÝSLEDKY


Věkové rozložení souboru

VĚK	19	20	21	22	23	24	≥ 25	CELKEM
POČET STUDENTŮ	48	101	83	71	94	67	52	516




Charakteristika souboru podle typu vysoké školy a pohlaví

POHLAVÍ	MU	MZLU	VFU	VUT	CELKEM
ŽENY	204	67	37	18	326
MUŽI	116	15	16	43	190
CELKEM	320	82	53	61	516




Charakteristika souboru podle pohlaví a studijního zaměření

ZAMĚŘENÍ	MUŽI	ŽENY	CELKEM
H	46	116	162
P	72	149	221
T	72	61	133
CELKEM	190	326	516




Výskyt alternativních způsobů stravování

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ	POČET	% PODÍL
ALTERNATIVNÍ	83	16,1
KONVENČNÍ SMÍŠENÉ	433	83,9
CELKEM	516	100,0



Zastoupení jednotlivých alternativních způsobů stravování

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ	POČET	% PODÍL	% PODÍL CELKU (516)
SEMIVEGE	57	70	11,0
LAKTOOVO	16	19	3,1
LAKTOVEGE	2	2	0,4
DĚLENÁ S.	5	6	1,0
MAKROBIO	1	1	0,2
JINÉ	2	2	0,4
CELKEM	83	100	16,1




- Výskyt alternativních způsobů stravování byl v této práci zaznamenán u 16,1 % respondentů. Po vyjmutí skupiny semivegetariánů z kategorie alternativních způsobů stravování by se pak celkové procento alternativně se stravujících respondentů v této práci snížilo na 5,1 %.
- Při rozlišení jednotlivých forem převládá semivegetariánství (11 %) následované méně striktními formami vegetariánství (3,1 % laktoovovegetariánství a 0,4 % laktovegetariánství).
- Z celkového počtu 57 semivegetariánů (ve frekvenčním dotazníku konzumace vepřového a hovězího masa zřídka nebo vůbec) se 35 respondentů v otázce číslo 6 zařadilo do skupiny semivegetarián, ale zbývajících 22 do skupiny konzumentů smíšené stravy.

H1: Výskyt alternativních způsobů stravování v závislosti na pohlaví

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ	ŽENY	MUŽI
ALTERNATIVNÍ	73	10

Statisticky významné $p < 0.01$

Frekvence výskytu alternativních způsobů stravování je významně vyšší u žen




H2: Výskyt alternativních způsobů v závislosti na zaměření studia


ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ	ZAMĚŘENÍ STUDIA			
	HUMANITNÍ	PŘÍRODOVĚDNÉ	TECHNICKÉ	CELKEM
ALTERNATIVNÍ	45	23	15	83
KONVENČNÍ	117	198	118	433

Statisticky významné $p < 0,01$

Frekvence výskytu alternativních způsobů se v závislosti na zaměření studia liší. Statisticky významná je vyšší frekvence pozorovaná u humanitního zaměření a nižší frekvence výskytu alternativních způsobů stravování u studentů přírodovědného a technického zaměření.




Důvody vedoucí ke změně způsobu výživy



- 1. Zdravotní hledisko**
- 2. Konvenční smíšená strava mi nechutná**
- 3. Soucit se zvířaty**
4. Strach z onemocnění zvířat (zoonózy)
5. Ekologické hledisko
6. Filozofické přesvědčení
7. Chuť vyzkoušet něco nového
8. Náboženské důvody
9. Je způsobem redukce hmotnosti
10. Ekonomicky méně náročné
11. Nesmysl
12. Jiné

Názory respondentů na alternativní způsoby stravování



- | | |
|---|---|
| 1. Je prospěšné zdraví | 7. Souvisí s náboženským přesvědčením |
| 2. Ohrožuje zdraví | 8. Je formou protestu |
| 3. Méně zatěžuje životní prostředí | 9. Je způsobem redukce hmotnosti |
| 4. Je součástí filozofického přesvědčení | 10. Ekonomicky méně náročné |
| 5. Je módní záležitostí | 11. Nesmysl |
| 6. Vyjadřuje touhu vyzkoušet něco nového | 12. Jiné |

H3: Konzumace ovoce a zeleniny

POTRAVINA	FREKVENCE	ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ		CELKEM
		ALTERNATIVNÍ	KONVENČNÍ	
ČERSTVÁ ZELENINA	≥ denně	52 (62,7 %)	141 (32,6 %)	193
	2-6x týdně	29 (34,9 %)	202 (46,6 %)	231
	≤1 týdně	2 (2,4 %)	90 (20,8 %)	92
TEPELNĚ UPRAVENÁ ZELENINA	≥ denně	30 (36,1 %)	26 (6,0 %)	56
	2-6x týdně	31 (37,4 %)	177 (40,9 %)	208
	≤ 1 týdně	22 (26,5 %)	230 (53,1 %)	252
OVOCE	≥ denně	44 (53,0 %)	176 (40,6 %)	220
	2-6x týdně	32 (38,6 %)	204 (47,1 %)	236
	≤ 1 týdně	7 (8,4 %)	53 (12,3 %)	60

Čerstvá zelenina: statisticky významné $p < 0,01$

Tepelně upravená zelenina: statisticky významné $p < 0,01$

Ovoce: statisticky nevýznamné $p > 0,05$

Podle výsledků, alternativně se stravující studenti do svého jídelníčku významně častěji zařazují zeleninu, tepelně upravenou zeleninu. Rozdíl v konzumaci ovoce je mezi skupinami statisticky nevýznamný.

H4: Konzumace slaných pochutin

POTRAVINA	FREKVENCE	ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ		CELKEM
		ALTERNATIVNÍ	KONVENČNÍ	
SLANÉ POCHUTINY	≥ denně	1 (1,2 %)	11 (2,5 %)	12
	2-6x týdně	7 (8,4 %)	94 (21,7 %)	101
	≤1 týdně	75 (90,4 %)	328 (75,8 %)	403

Slané pochutiny: statisticky významné $p < 0,05$

H5: Konzumace pokrmů rychlého občerstvení

POTRAVINA	FREKVENCE	ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ		CELKEM
		ALTERNATIVNÍ	KONVENČNÍ	
POKRMY RYCHLÉHO OBČERSVENÍ	≥ denně	0 (0,0 %)	4 (0,9 %)	4
	2-6x týdně	4 (4,8 %)	59 (13,6 %)	63
	≤1 týdně	79 (95,2 %)	370 (85,5 %)	449

Pokrmů rychlého občerstvení: statisticky nevýznamné $p > 0,05$

Podle výsledků, alternativně se stravující studenti do svého jídelníčku významně méně často zařazují slané pochutiny. Rozdíly v konzumaci pokrmů rychlého občerstvení nejsou statisticky významné.

Konzumace alkoholických nápojů

NÁPOJ	FREKVENCE	ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ		CELKEM
		ALTERNATIVNÍ	KONVENČNÍ	
PIVO	≥ denně	1 (1,2 %)	13 (3,0 %)	14
	2-6x týdně	20 (24,1 %)	111 (25,6 %)	131
	≤ 1 týdně	28 (33,7 %)	182 (42,0 %)	210
	zřídka nebo vůbec	34 (41,0 %)	127 (29,3 %)	161
VÍNO	≥ denně	3 (3,6 %)	6 (1,4 %)	9
	2-6x týdně	9 (10,8 %)	51 (11,8 %)	60
	≤ 1 týdně	55 (66,3 %)	265 (61,2 %)	320
	zřídka nebo vůbec	16 (19,3 %)	111 (25,6 %)	127
TVRDÝ ALKOHOL	≥ denně	1 (1,2 %)	2 (0,5 %)	3
	2-6x týdně	6 (7,2 %)	21 (4,8 %)	27
	≤ 1 týdně	39 (47,0 %)	267 (61,7 %)	306
	zřídka nebo vůbec	37 (44,6 %)	143 (33,0 %)	180

Pivo: statisticky nevýznamné $p > 0,05$

Víno: statisticky nevýznamné $p > 0,05$

Tvrký alkohol: statisticky nevýznamné $p > 0,05$

Konzumace alkoholických nápojů (semivegetariáni + ostatní alternativní)

NÁPOJ	FREKVENCE	ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ		CELKEM
		SEMIVEGE	ALTERNATIVNÍ	
PIVO	≥ denně	1 (1,8 %)	0 (0,0 %)	1
	2-6x týdně	10 (17,5 %)	10 (38,5 %)	20
	≤ 1 týdně	46 (80,7 %)	16 (61,5 %)	62
VÍNO	≥ denně	2 (3,5 %)	1 (3,8 %)	3
	2-6x týdně	6 (10,5 %)	3 (11,5 %)	9
	≤ 1 týdně	49 (86,0 %)	22 (84,6 %)	71
TVRDÝ ALKOHOL	≥ denně	1 (1,8 %)	0 (0,0 %)	1
	2-6x týdně	4 (7,0 %)	2 (7,7 %)	6
	≤ 1 týdně	52 (91,2 %)	24 (92,3 %)	76

Pivo: statisticky nevýznamné $p > 0,05$

Víno: statisticky nevýznamné $p > 0,05$

Tvrký alkohol: statisticky nevýznamné $p > 0,05$

ZÁVĚR

- Alternativním způsobům stravování v České republice i přes udávaný zvyšující se zájem v populaci není po odborné stránce věnováno dostatečné množství pozornosti, a to jak z hlediska epidemiologického, tak nutričního.
- Podklady pro odbornou veřejnost u nás chybí, pocházejí pouze ze zahraničních zdrojů, k dispozici nejsou ani aktuální údaje o celkovém počtu osob stravujících se alternativním způsobem.
- Budoucí výzkum v této oblasti je značně potřebný z důvodu
 - v současnosti se zvyšujícímu zájmu populace o výživu
 - nezanedbatelnému počtu jedinců zastávajících různé alternativní výživové směry
 - stále nejednoznačným závěrům, které se týkají nutričních a zdravotních hledisek
 - snahám zavést vegetariánství do stravovacích zařízení základních škol

 **DĚKUJI ZA POZORNOST**

