

# Očkovací kalendář pro dospělé - podle věku

Nemoc	Věková kategorie					Přeočkování	Poznámka	Vakcíny
	18–26 let	27–49 let	50–59 let	60–64 let	65+ let			
<b>Tetanus</b>	booster po 10–15 letech		booster po 10 letech			po 10–15 letech	očkovaní také v rámci úrazů a poranění	<b>TETANOL PUR, TETAVAX</b>
<b>Pertuse</b>	minimálně 1 dávka 1x za život					po 10–15 letech	zejména rodinné kontakty dětí do 1 roku věku, těhotné ženy, možné v rámci očkování proti tetanu	<b>BOOSTRIX, ADACEL</b>
<b>Varicella</b>	2 dávky					nestanoveno	pro vnímavé (bez historie nemoci nebo séronegativní) + práce v riziku + rizikové skupiny	<b>VARILRIX</b>
<b>VHA</b>	2 dávky					nestanoveno	pro vnímavé a neočkované v dětství + práce v riziku + rizikové chování; možné aplikovat kombinovanou VHA/VHB vakcínu	<b>VAQTA, AVAXIM, HAVRIX, TWINRIX</b>
<b>VHB</b>	3 dávky					nestanoveno	pro vnímavé a neočkované v dětství + rizikové skupiny + rizikové chování; možné aplikovat kombinovanou VHA/VHB vakcínu	<b>ENGERIX-B, FENDRIX, TWINRIX</b>
<b>HPV</b>	3 dávky					nestanoveno	pro ženy i muže neočkované v dětství	<b>SILGARD - muži i ženy, CERVARIX - pouze ženy</b>
<b>Herpes zoster</b>			1 dávka			nestanoveno	očkovaní se doporučuje zahájit co nejdříve	<b>ZOSTAVAX</b>
<b>Klíšťová encefalitida</b>	3 dávky, přeočkování po 5 letech		3 dávky, přeočkování po 3 letech			po 3–5 letech	rizikové skupiny + práce v riziku; první přeočkování po 3 letech	<b>FSME-IMMUN, ENCEPUR</b>
<b>Pneumokokové nákazy</b>	1 dávka PCV nebo PPV		1 dávka PPV nebo PCV	1 dávka PCV + 1 dávka PPV23		PPV: po 5 letech pouze 1 x	u kombinovaných schémat se zahajuje PCV	<b>PREVENAR 13, PNEUMO 23</b>
<b>Meningokokové nákazy</b>	1–2 dávky MCV4, menB					MCV4 po 5 letech	rizikové skupiny + práce v riziku + cestovatelé; přeočkování pouze pro osoby s přetrvávajícím rizikem infekce	<b>BEXSERO, MENVEO, NIMENRIX</b>
<b>Chřipka</b>	1 dávka					každoročně	očkovaní se týká zdravých osob + osob s rizikovými faktory + osob pracujících v riziku nad 18 let	<b>IDFlu, INFLUVAC, VAXIGRIP, OPTAFLU</b>
<b>Hib</b>	1 dávka					nestanoveno	rizikové skupiny	<b>HIBERIX</b>
<b>Vzteklina</b>	5 dávek postexpozičně / 3 dávky preexpozičně					po 2–5 letech pouze při práci v riziku	od roku 2002 se v ČR vzteklina nevyskytuje	<b>VERORAB</b>

## Vysvětlivky:

PPV pneumokoková polysacharidová vakcína  
menB meningokoková vakcína proti séro skupině B  
MCV4 meningokoková konjugovaná tetravalentní vakcína proti séro skupině A, C, Y, W135  
HPV lidský papillomavirus

VHA virová hepatitida typu A  
VHB virová hepatitida typu B  
Hib Haemophilus influenzae typ b  
PCV pneumokoková konjugovaná vakcína

 **doporučeno všem dané věkové kategorie**

 **doporučeno v případě rizikových faktorů**