

SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ RŮSTU DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Vignerová Jana

**Státní zdravotní ústav v Praze
Národní laktiční centrum**



- 1. Antropologické výzkumy dětské a dospívající populace (0-18 let)**
- 2. Dlouhodobé změny**
- 3. Sledování individuálního růstu (růstové grafy)**
- 4. Prevalence nízké hmotnosti, nadváhy a obezity (metody, výsledky)**
- 5. Používané růstové reference**
- 6. Hodnocení přiměřenosti výživy dětí výlučně a dlouhodobě kojených**
- 7. Metodika měření tělesných charakteristik**

Růst a vývoj dítěte je ovlivněn interakcí genotypu a prostředí :

- **rodinné prostředí**
- **úroveň zdravotní péče**
- **výživová situace**
- **sociálně-ekonomické podmínky aj.**


Vice versa:

Změny růstu jedince i celé populace ukazují citlivě na změny prostředí (zejména socio-ekonomických podmínek).

SLEDOVÁNÍ RŮSTU

*základních tělesných charakteristik
dětí a dospívajících*

**je nejjednodušším prostředkem pro
sledování a hodnocení
zdravotního a výživového stavu**



**SKUPIN
POPULACE**


*Antropologické
výzkumy*

JEDINCŮ

*Pravidelné sledování a
hodnocení růstu v
pediatrické praxi
(růstové grafy)*

1) ANTROPOLOGICKÉ VÝZKUMY DĚTÍ A MLÁDEŽE

- **1790: Čeští chlapci z Vojenské akademie ve Vídni. Čeští chlapci byli větší o 2,7 cm než průměr Habsburské monarchie.**
- **1895: Český lékař a antropolog Matiegka – 100 000 školních dětí**
- **1951 – 2001:**
6 výzkumů v desetiletých intervalech, věk 0 - 19 roků,
reprezentativní soubory: 3 až 5 % populace
- **2011 ???**



Další výzkumy:

- **Rozměry hlavy**
- **Prevalence obezity**
- **Semilongitudinální sledování tělesného růstu**
- **Růst dlouhodobě kojených dětí**

SLEDOVANÉ TĚLESNÉ ROZMĚRY

- Tělesná výška, do 2 let věku dítěte tělesná délka
 - Hmotnost → hmotnost/TV, BMI
 - Obvod hlavy
-
- Obvod levé paže
 - Obvod břicha
 - Obvod boků
 - Tloušťka kožních řas

Nutná znalost metodiky měření, metodika sběru dat.

CELOSTÁTNÍ ANTROPOLOGICKÉ VÝZKUMY

Metodika

Předškolní děti

- u praktických dětských lékařů
- studenti - podrobnější měření v jeslích a školkách

Školní děti

- učitelé tělesné výchovy a biologie
- studenti antropologie ve školách
- Nutný souhlas rodičů → nízká respondence
- Proto **do budoucna sběr dat přes pediatriy**, ideálně v elektronické podobě

Při vyplňování otázek uveďte buď číselný údaj - např. v rodině žijí 3 děti, na předepsané místo napište číslo 3, nebo označte správnou odpověď křížkem. - Údaje ve dvojitém rámečku vyplňte prosím více dmy.		PRO UČITELE: / Číslo archu / číslo dítěte
Příklad kladné odpovědi:		ano X (1) ne (2)
Adresa školy:		PSC:
Datum naroz. dítěte: Třída:		Okres:
den:	měsíc:	rok:
Pohlaví: chlapec		(1)
dívka		(2)
Národnost dítěte: česká		(1)
jiná		(2)
Otázky 1 – 10 vyplňte pouze, jedná-li se o vlastního rodiče dítěte:		
1	Tělesná výška otce	cm
2	Hmotnost otce	kg
3	Věk otce	roků
4	Vzdělání otce	základní (1)
		vyučen (2)
		maturita (3)
		vysoká škola (4)
5	Kolik hodin týdně věnuje otec aktivnímu tělesnému pohybu (sportu)?	hodin
6	Tělesná výška matky	cm
7	Hmotnost matky	kg
8	Věk matky	roků
9	Vzdělání matky	základní (1)
		vyučena (2)
		maturita (3)
		vysoká škola (4)
10	Kolik hodin týdně věnuje matka aktivnímu tělesnému pohybu (sportu)?	hodin
11	Počet dětí v rodině - včetně nevlastních sourozenců (uveďte počet číslem)	-
12	Pořadí narození dítěte vlastního matce (udejte pořadí číslem)	-
13	Velikost obce, ve které dítě žije	do 5 000 obyvatel (1)
		do 10 000 obyvatel (2)
		do 100 000 obyvatel (3)
		do 1 000 000 obyvatel (4)
		nad 1 000 000 obyvatel (5)
14	Porodní hmotnost dítěte	kg
15	Porodní délka dítěte	cm
16	Délka kojení dítěte (Součet tří políček v otázce 17 by neměl přesáhnout dobu označenou v otázce 16. Pokud si údaje nepamätujete, otázku 17 nevyplňujte). U dětí mladších 6 měsíců, dosud kojenných, označte i.5. U dětí mladších 6 měsíců, dosud kojenných, označte i.5. délce než 6 měsíců	nekojeno (1)
		do 1 měsíce (2)
		do 3 měsíců (3)
		do 6 měsíců (4)
		déle než 6 měsíců (5)
17	Z toho délka kojení bez čaje a jiných tekutin s dokmem (kojení a čaj, kojení a umělá výživa) s příkrmem (kojení a polévka, ovoce)	měs. (1)
		měs. (2)
		měs. (3)
18	Trpí dítě závažným onemocněním?	cukrovka (1)
		onemocnění srdce (2)
		astma (3)
		těžší alergická onemocnění (4)
		onemoc. pohybového ústrojí (5)
		jiné, jaké (6)
19	Od jakého věku?	roků
20	Prodělalo dítě vážný úraz?	ano (1)
		Jaký ne (2)
21	V jakém věku?	roků
22	Má úraz trvalé následky?	ano (1)
		ne (2)
23	Chlapec je před mutací hlasu	(1) Dívka ještě nemá měsíčky (3)
		(2) Dívka již má měsíčky, odlet (4)

6. Celostátní antropologický výzkum 2001 - DOTAZNÍK PRO DĚTI

Číslo SOUBORNÉHO ARCHU / Číslo dítěte (sloupec 0 SOUBORNÉHO ARCHU) ____/____

Zaškrtni křížkem správnou odpověď. Pokud platí odpověď „občas“, zaškrtni odpověď, která je častěji pravdivá. Údaje ve dvojitém rámečku vyplň prosím všechny.		Příklad kladné odpovědi:	ano X (1) ne (2)
Adresa školy:		PSC:	Okres:
Datum naroz. dítěte: Třída:		Pohlaví: chlapec	(1)
den:		měsíc:	rok:
dívka		(2)	(2)
Národnost dítěte: česká		(1)	(1)
jiná		(2)	(2)
24	Jaký sport provozuješ? (zaškrtni správnou odpověď)	osvobozen od školní tělesné výchovy pouze ve škole ve škole a pohyb s kamarády, s rodinou ve škole a v klubu (Sokol, Skaut atp.) ve škole a závodní sportovní příprava	(1) (2) (3) (4) (5)
25	Kolik hodin týdně věnuješ sportu?		hodin (1)
26	Kolik hodin týdně sleduješ televizi?	0 až 3 hodiny (1)	
		4 až 7 hodin (2)	
		8 až 14 hodin (3)	
		14 a více hodin (4)	
27	Kolik hodin týdně pracuješ s počítačem a hraješ počítačové hry?	0 až 3 hodiny (1)	
		4 až 7 hodin (2)	
		8 až 14 hodin (3)	
		14 a více hodin (4)	
28	Snídáš ráno?	ano (1) ne (2)	
29	Svačíš ve škole?	ano (1) ne (2)	
30	Obědváš ve škole teplé jídlo?	ano (1) ne (2)	
31	Svačíš odpoledne?	ano (1) ne (2)	
32	Jíš něco mimo snídání, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři?	ano (1) ne (2)	
33	Piješ ve škole? (pokud nepiješ nic, nevyplňuj)	mléko (1)	
		jiné nápoje (2)	
		vodu (3)	
33	Sleduješ svoji váhu?	ano (1) ne (2)	
34	Držíš dietu na zhubnutí?	ano (1) ne (2)	
35	Jíš pravidelně ovoce a zeleninu?	ano (1) ne (2)	

Pokud neznáš odpověď, porad se s učitelem nebo na otázku neodpovídej.

Datum vyplnění dotazníku:

Den: __ Měsíc: __ Rok: ____

Hlavní cíle:

- **Aktualizace růstových grafů (růstových referencí)**
- **Zjištění výskytu nadváhy, obezity, nízké hmotnosti v dětské populaci (prevalence)**
- **Zachycení dlouhodobých změn růstu a vývoje populace (např. posun doby dospívání)**

2) DLOUHODOBÉ ZMĚNY V ČESKÉ DĚTSKÉ POPULACI (1951 – 2001)



v souladu s měnícími se socio-ekonomickými podmínkami

- a) zvyšování průměrné tělesné výšky**
- b) zrychlování pubertálního růstového spurtu**
- c) dřívější doba dospívání**
- d) dřívější doba AR, tj. období nabývání tukové složky**
- e) trend debrachycefalizace**
- f) zvyšující se výskyt podílu dětí s nadváhou, obezitou a nízkou hmotností (nevíme, zda stále trvá)**

SEKULÁRNÍ TREND TĚLESNÉ VÝŠKY


- Tělesný růst *chlapců* byl před sto lety ukončen ve 21 až 22 letech, v současné době je to v necelých 18 letech.
- U *dívek* je růst ukončen vždy dříve než u chlapců, v současnosti okolo 17. roku.
- Osmnáctiletí chlapci dosahují nyní průměrné tělesné výšky 180,1 cm, což znamená **zvýšení dospělé tělesné výšky oproti roku 1895 o 12 cm**. Průměrná výška současných osmnáctiletých dívek je 167,2 cm, což je **o 10 cm více než v roce 1895**.

Průměrné hodnoty podle Celostátních antropologických výzkumů (od roku 1951 do roku 2001 každých 10 let)



STŘEDNÍ VĚK NÁSTUPU MENARCHE A MUTACE

1991, 2001



Logistická regrese

Počet:

Dívky: 12 837

Chlapci: 9 645

Střední věk **menarche**:
(50 % ANO, 50 % NE)

1895: 15.1 roku

1991: 13.01 let

0.01 r.

2001: 13.00 let

Střední věk nástupu
mutace:


1991: 14.50 let

0.66 r.

2001: 13.84 let

3) SLEDOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO RŮSTU

- Porovnání naměřených hodnot základních tělesných rozměrů s hodnotami běžnými v celé dětské populaci umožňují růstové grafy
- „sex and age specific“




JMÉNO
PACIENTA

DATUM
NAROZENÍ



PERCENTILOVÝ GRAF TĚLESNÉ VÝŠKY

HOŠI







CECLOR® - ŘEŠENÍ BAKTERIÁLNÍCH INFEKČÍ

HODNOCENÍ RŮSTU dítěte podle percentilového grafu tělesné výšky:


Percentilové pásmo	Hodnocení
97 <	velmi vysoké
90 - 97	vysoké
75 - 90	vyšší
25 - 75	střední
10 - 25	menší
3 - 10	malé
< 3	velmi malé

MOŽNÝ PRŮBĚH RŮSTU VZHLEDEM K PERCENTILOVÝM KŘIVKÁM




- Rovnoměrný růst
- Zastavení růstu
- Zrychlení růstu

**Růstové grafy umožňují zachytit vážná
onemocnění ještě před jejich klinickým
propuknutím**



Při sledování růstu dítěte lékařem (případně rodiči):

1. Růst sledovat průběžně (0-18 let)
2. Průběh růstu vyhodnotit



Tělesné rozměry, které ukládá sledovat a hodnotit podle růstových grafů vyhláška o preventivních prohlídkách MZ ČR novela ze dne 29. února 2012:

- **Tělesná výška (do 2 let věku dítěte tělesná délka)**
- **Hmotnost, resp. hmotnost k tělesné výšce a BMI**
- **Obvod hlavy do 3 let věku**

Výsledky měření se zaznamenává lékař do Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého (software, v papírové podobě....)

Věk povinných preventivních prohlídek: po propuštění z porodnice, 14 dnů, 6 týdnů, 3, 4-5, 6, 8, 10-11, 12, 18 měsíců, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, (19)

Ročník 2012
SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
Částka 27 Rozeslána dne 7. března 2012
70. Vyhláška o preventivních prohlídkách

Obsah a časové rozmezí

všeobecné preventivní prohlídky dětí

§ 3

(1) Obsahem všeobecných preventivních prohlídek dětí od narození do 18 měsíců věku je

a) založení zdravotnické dokumentace při přijetí dítěte

do péče,

b) anamnéza a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími očkování proti infekčním nemocem¹⁾,

c) fyzikální vyšetření, jehož součástí je

1. zjištění hmotnosti, délky dítěte a obvodu jeho hlavy, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů,

2. interní vyšetření,

3. vyšetření psychomotorického vývoje,

4. cílené vyšetření specifické pro daný věk a zjištění zdravotního rizika včetně rizika týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte,

d) diagnostická rozvaha,


e) závěr.....

Hodnocení vztahu tělesné výšky a hmotnosti :


- od 80. let minulého století pomocí BMI i u dětí
- do té doby používán pouhý vztah hmotnosti k výšce
- dnes tento vztah používáme u nejmenších dětí do 2, max. do 5 let (podle hmotnosti)
- **BMI u dětí závislé na věku a pohlaví.** (Podle pouhé změny hodnoty BMI u dítěte nemůžeme nijak hodnotit, zda došlo k redukci hmotnosti nebo naopak k jejímu neúměrnému zvýšení. Dokonce nejsme bez správných referenčních údajů schopni hodnotit, zda dítě trpí nízkou hmotností, nadváhou či obezitou).
- u obézních jedinců grafy dalších rozměrů (obvod paže, břicha boků, kožních řas)

HODNOCENÍ TĚLESNÝCH POPORCÍ

Hmotnost k tělesné výšce




BMI



Hodnocení hmotnosti podle percentilového grafu hmotnosti k tělesné výšce nebo BMI:



Percentilové pásmo	Hodnocení
97 <	obézní
90 – 97	nadměrná hmotnost
75 – 90	robustní
25 – 75	proporční
10 – 25	štíhlé
3 – 10	nízká hmotnost
< 3	hubené

DÍVKY Body Mass Index (0-18 let)



VĚK ADIPOSITY REBOUND

- Posun AR do nižšího věku




Věk adiposity rebound
(roky) – 50. percentil:

	Chlapci	Dívky
1951	6.2	6.4
2001	4.9	5.2
Posun	-1,3 roku	-1,2 roku


- Výsledky platí pro 50. percentil. Na vyšším percentilu nastává AR dříve, na nižším později.

Doplnění antropometrických vyšetření: obvody paže, břicha, boků, kožní řasy

Obvod levé paže (0 - 18 roků)
Chlapci



KOŽNÍ ŘASA NAD BICEPSEM - Chlapci 3-16 let
Měřeno kaliperem typu Harpenden





Vignerová J., Bláha P. (eds): Sladování růstu českých dětí a dospívajících (Norma, vyhublost, obezita). SZÚ a PFF UK v Praze, 2001. ISBN 80-7071-173-6.

Využití růstových grafů :

- Hodnocení přiměřeného růstu od narození až do dospělosti
- Hodnocení úrovně výživy nejmenších dětí
- Sledování účinnosti léčby při poruchách růstu i jiných vážných onemocněních
- **Diagnóza nadváhy a obezity**
- **Diagnóza nízké a velmi nízké hmotnosti**
- **Sledování redukčního procesu nebo poruch příjmu potravy**

Důležité zejména okrajové percentily



© 2004 WHO / IOM a s. 200, 2001, 2006
Příloha 10 - Zdravotní

4) PREVALENCE NADVÁHY, OBEZITY A NÍZKÉ HMOTNOSTI

- Prevalence je % výskytu jedinců s nadváhou, obezitou, nízkou hmotností (interval spolehlivosti)
- Zařazení každého jedince do pásma podle růstového grafu BMI (hmotn/TV)
- Problém nejednotnosti kritérií (cut-off) pro nadváhu, obezitu a nízkou hmotnost
- Problém v kvalitě porovnávaných dat, která jsou k dispozici
- Publikované výsledky z různých zemí proto velmi těžko srovnatelné (podle českých růstových referencí 10% s nadváhou a obezitou je v rámci normy)



eISBN: 978-1-60805-946-1
ISBN: 978-1-60805-947-8

PHYSICAL ACTIVITY, FITNESS, NUTRITION AND OBESITY DURING GROWTH



Jana Pařízková

Bentham  Books

- **Obecně lze říci, že trend zvyšování výskytu nadváhy a obezity v některých zemích pokračuje**
- **Vybrané studie z vyspělých zemí naznačují, že se tento trend zastavil**
- **Latentní obezita**

Nízká hmotnost, podvýživa

WHO: V roce 2012, v rozvojových zemích 1 ze 6 dětí podvyživené, z toho 53 milionů jich žije v jižní Asii.

Ayodele A Ogunleye, University of Alberta, GB:


- Ve Velké Británii je každé dvanácté dítě (8,3 %) podvyživené. Tyto děti jsou však ignorovány díky krizi obezity. **Nikdo si nepřipouští, že relativně bohatá země může mít vysoký podíl podvyživených dětí.**
- Podvýživou častěji trpí děvčata než chlapci.
- Zvyšující se ceny potravin zvyšují riziko podvýživy u dětí.

PODÍL DĚTÍ S NADVÁHOU A OBEZITOU

podle BMI rodičů (CAV 2001)




věk 6.00 – 10.99 roků

Chlapci, n = 3991



Podíl dětí s nadváhou a obezitou stoupá

- se zvyšujícím se BMI rodičů
- s kratší délkou kojení
- s nižším vzděláním rodičů

 < 10. p.  10.-90. p.  90. p. <

1. Oba rodiče BMI < 25 (oba v normě)
2. Jeden z rodičů v normě, druhý nadváha
3. Oba rodiče BMI > 25 (oba nadváha)

PREVALENCE NÍZKÉ I VYSOKÉ HMOTNOSTI U SEDMILETÝCH DĚTÍ


CAV 2001 (1135 chlapců, 1103 dívek)

Childhood Obesity Surveillance Initiative in the Czech Republic (WHO)


2008: 773 chlapců, 753 dívek,

2010: 1226 chlapců, 1262 dívek

Chlapci




Dívky



Podle českých referencí CAV 1991

Podíl dětí s nadváhou a obezitou (podle IOTF referencí) 24 – 59 měsíců CHLAPCI



Podíl dětí s nadváhou a obezitou (podle IOTF referencí) 24 – 59 měsíců DÍVKY






Fig 1: Comparisons of measured and self-reported estimates of overweight and obesity in selected countries Overweight defined by IOTF criteria (includes obese).



Prevalence nadváhy a obezity podle mezinárodně doporučovaných norem (IOTF)



5) POUŽÍVANÉ RŮSTOVÉ REFERENCE


- **1998 – 2000 šetření Světové zdravotnické organizace (WHO), aby zjistila, zda a ve kterých zemích jsou pro hodnocení růstu dětí používány růstové grafy.**
- **Z oslovených 202 zemí, odpověděla ministerstva zdravotnictví 154 zemí kladně.**
- **Dvě třetiny používaných grafů pokrývají předškolní věk.**
- **Všechny země používaly graf hmotnosti k věku (grafy ostatních základních tělesných rozměrů využívány jen v některých z oslovených zemí).**
- **Nejpoužívanější růstové grafy (68 %) byly WHO/NCHS reference z roku 1977 s regionálními variacemi.**
- **Většina evropských zemí používá své vlastní růstové normy**

[De Onis M., Wijnhoven T. M. A., Onyango A. W.: Worldwide Practices in Child Growth Monitoring, The Journal of Pediatrics. 2004; April:461-465].

PODKLADY PRO JEDNOTLIVÉ REFERENČNÍ ÚDAJE BMI

- **ČR:** 5. a 6. Celostátní antropologický výzkum 1991 a 2001, Česká republika, vyhlazené empirické percentily
- **IOTF (COLE 2000):** 6 národně reprezentativních studií Brazílie, Velká Británie, Hong Kong, Nizozemí, Singapur, USA (nadváha v 18ti letech BMI = 25, obezita BMI = 30)
- **WHO: 0 až 5 let – růstové standardy 2006 (MGRS)**
5 až 19 let – modifikace referencí z roku 1977 (nadváha v 19ti letech BMI = 25, obezita BMI = 30)
- **CDC 2000:** 5 výzkumů v USA z let 1963 až 1994

Sedmiletí chlapci 2008
Studie COSI




- **Typ používaných referenčních růstových grafů používaných pediatrem má zásadní vliv na posuzování růstu dítěte v pediatrické praxi.**
- **Proto si pediatři musí uvědomovat možné důsledky použití nesprávných růstových referencí pro hodnocení růstu dítěte.**
- **Důsledky se projeví v možné nesprávné diagnóze a nesprávných výživových doporučeních.**


[13 - Rolland-Cachera MF, Peneau S. Assessment of growth: variations according to references and growth parameters used. Am J Clin Nutr 2011;94:1794S-8S].

BMI CHLAPCI – CAV 2001

Věk



Podle českých referenčních dat




Podle WHO referenčních dat

%

6) HODNOCENÍ PŘIMĚŘENOSTI VÝŽIVY DĚTÍ VÝLUČNĚ A DLOUHODOBĚ KOJENÝCH

- **Kojené děti a děti živené umělou výživou rostou rozdílně**

**Průměrná z-skóre
zdravých kojených dětí
v porovnání s NCHS/WHO
1977 referencemi (USA)**




(An Evaluation of Infant Growth, WHO, 1994)

Růstové standards WHO pro děti 0 – 5 let

- Studie růstu dlouhodobě a výhradně nebo převážně kojených dětí (MGRS)
- 8 400 dětí (USA, Brazílie, Norsko, Ghana, Oman, Indie)
 - *Kojení považuje za biologickou normu*
 - *Jako normativní růstový model stanovuje růst kojeného dítěte*
 - *Nepopisuje růst populace, ale na vybrané subpopulaci ukazuje, jak by dítě růst mělo*

Vyrůstají-li děti nejmladších věkových skupin za stejných socioekonomických podmínek, pro jejich růst a vývoj není rozhodující jejich etnikum a národnost.



2007 - Italské Brindisi
„Workshop on new WHO child growth standards“

- **Doporučení Světové zdravotnické organizace: implementovat nové růstové standardy ve všech zemích.**
- **Provedli jsme studii růstu dětí převážně nebo výlučně kojených nejméně 6 měsíců**


Cíl studie

1. Porovnání růstu českých výlučně kojených dětí se stávajícími růstovými grafy pro českou dětskou populaci.
2. Posoudit vhodnost použití českých růstových grafů pro kojené děti.
3. Cílem nebylo konstruovat nové růstové grafy, ale na základě výsledků studie **vypracovat doporučení pro hodnocení růstu kojeného dítěte** (ve spolupráci s odbornými společnostmi).

Průběh studie

- **Sběr materiálu:**
43 pediatriů od března 2009 do května 2010
celkem **1775 dotazníků**
- **Výběr dětí ve shodě s WHO studií:** matka
nekuřačka minimálně s maturitou, porod jediného
dítěte, **kojení minimálně 4 měsíce (výlučné nebo
převážné)**, porodní hmotnost > 2500 g
- **⇒ 960 dětí**, 471 chlapců a 489 dívek (od každého
dítěte bylo průměrně 11 měření, celkem 10 727
měření)
- Ze souboru vybraných dětí byly spočteny
percentilové křivky jednotlivých rozměrů


Podíl kojených dětí v jednotlivých měsících života



Tělesná délka



- je u českých kojených dětí větší již od narození než dětí WHO a odpovídají českým referenčním grafům

České referenční grafy (CAV) se pro české kojené děti jeví vhodnější.




Hmotnost

- Po 3. měsíci nastává relativní zpomalení přírůstků hmotnosti. To je třeba mít na paměti, abychom zabránili předčasnému zavedení dokrmu.



- **Růst kojeného dítěte je specifický.**
- **Není možné ho bezvýhradně posuzovat ani podle českých referenčních dat (CAV) ani podle standardů WHO.**
- **Zavedení grafů WHO do pediatrické praxe by bylo **finančně a organizačně velmi náročné.****
- **Nebyla by zajištěna **návaznost růstových křivek v 5 letech.****
- **Se znalostí specifického růstu kojeného dítěte (zejména v posuzování vývoje hmotnosti) lze používat stávající česká referenční data.**

Tělesná délka, chlapi



Vybrané dítě
Aubrecht Max

Výška do 18 let

Délka do 2 let

Hmotnost do 18 let

Hmotnost do 2 let

BMI

Hm/TV do 100 cm

Hm/TV nad 100 cm

Obv. Hlav do 3 let

Obv. Hlav do 18 let

Obvod paže


Obvod břicha

Obvod boků

Tabulka dat

Tisk grafu

Hmotnost, chlapi



Vybrané dítě
Aubrecht Max

Výška do 18 let

Délka do 2 let

Hmotnost do 18 let

Hmotnost do 2 let

BMI

Hm/TV do 100 cm

Hm/TV nad 100 cm

Obv. Hlav do 3 let

Obv. Hlav do 18 let



Obvod paže

Obvod břicha

Obvod boků


Tabulka dat

Tisk grafu




Leták určený laktačním poradkyním

HMOTNOST – schematický graf



HMOTNOST K DÉLCE – schematický graf



JAK HODNOTIT RŮST KOJENÉHO DÍTĚTE

- Kojení je pro vývoj dítěte nenahraditelné, podporuje jeho správný fyzický i psychický vývoj. Přínosné je i pro kojící matku.
- Pro hodnocení růstu všech dětí používáme jako důležitou podpůrnou diagnostickou pomůcku růstové grafy.

- U kojených dětí je v prvních měsících života průběh růstu odlišný od dětí nekojených, zejména u hmotnosti. Proto k zachování výlučného kojení do věku 6 měsíců a kojení i po 12. měsíci věku přispívá správné pochopení a použití růstových grafů.
- Růstové grafy jsou k dispozici v příloze pro rodiče Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého nebo na www.szu.cz/data/rustove-grafy, kde je možné stáhnout i software RustCZ s těmito grafy.
- Jsou-li grafy použity k hodnocení kojeného dítěte, je třeba mít na paměti několik zvláštností růstu kojených dětí, hlavně při hodnocení vývoje hmotnosti. To zabrání předčasnému zavedení dokrmu nejčastěji kolem 2. – 3. měsíce věku kojeného dítěte a zbytečnému překrmování v druhém půlroce jeho života.

CO JSOU RŮSTOVÉ GRAFY

Růst je ukazatelem zdravotního stavu jedince. Výrazné, neobvyklé nebo přetrvávající změny růstu mohou včas upozornit na mnoho onemocnění, a to nejen na onemocnění růstového charakteru, často ještě před jejich klinickými projevy.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví MZ ČR č. 3/2010 Sb. ukládá dětským lékařům povinnost sledovat a hodnotit růst dítěte při pravidelných preventivních prohlídkách. Jako hlavní ukazatele tělesného růstu bývají posuzovány tělesná výška (do 2 let měřena vleže a nazývaná tělesná délka) a hmotnost dítěte. U nejmenších dětí je nezbytným údajem i obvod hlavy.

Růst je možné sledovat a posuzovat pomocí růstových grafů, které umožňují porovnat růst dítěte s hodnotami běžnými v celé populaci (tzv. referenčními daty). Křivky v grafu znázorňují tzv. percentily. Hodnota 50. percentilu ukazuje přibližně průměrnou hodnotu. Stejnou nebo nižší hodnotu má polovina dětí konkrétního věku. Obdobně hodnota např. na 75. percentilu znamená, že stejnou nebo nižší hodnotu sledovaného rozměru má 75 % chlapců (nebo dívek) stejného věku v celé populaci.

Hodnota konkrétního rozměru zjištěná při jednom měření a zanesená do růstového grafu zprostředkuje rodičům informaci o tom, jak si jeho potomek „vede“ ve srovnání se svými vrstevníky. Pouze opakovaná měření a pravidelné sledování růstu však umožňují zodpovědně hodnotit přiměřenost růstu.

Nemusi být problém, pokud se např. tělesná výška dítěte pohybuje stále třeba kolem 10. percentilu, je-li tato jeho tělesná konstituce ve shodě s údaji rodičů a celkovým stavem dítěte. Důležité je, aby dítě rostlo rovnoměrně, přiměřeně a jeho individuální růstová křivka (= pomyslná spojnice hodnot rozměru dítěte, vynesných do grafu) sledovala průběh percentilových křivek v grafu. O něco méně pravidelný růst může být zaznamenán u dětí do 2 let věku, které si ještě „hledají své místo“ v percentilové síti.

S růstovými grafy mohou bez problémů pracovat i rodiče. Vzhledem k tomu, že kromě výsledků plynoucích z růstového grafu je vždy nutné zohlednit celkový zdravotní a výživový stav dítěte i další okolnosti růst ovlivňující, náleží konečné zhodnocení lékaři dítěte.

Růstové grafy je třeba považovat za pomůcku, není možné je používat mechanicky, bez znalosti specifik růstu, např. u dlouhodobě kojenech dětí.

RŮST KOJENÉHO DÍTĚTE

Kojení má nezastupitelný význam pro zdravý vývoj dítěte. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje výlučné kojení po dobu 6 měsíců a dále v kojení pokračovat s postupně zaváděným přímkem do 2 let věku dítěte, případně i déle. S tímto doporučením se ztotožňuje i Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Růst výlučně kojeneho dítěte se liší od růstu dítěte, které kojeno není. Pokud tuto odlišnost nebereme v úvahu při hodnocení růstu, může dojít k předčasnému dokrmování nebo úplně náhradě kojení umělou výživou, a nebo k nežádoucím přetkrmování dětí po prvním půlroce života.

V roce 2006 publikovala WHO nové růstové standardy vycházející ze sledování růstu dětí kojenech minimálně 4 měsíce. Vzhledem k mnoha výhodám, které kojení dítěti přináší, WHO přímo definovala kojení jako biologickou normu a růst kojeneho dítěte jako normativní.

Přestože cílem WHO byla propagace dlouhodobého kojení a její nová růstová norma má neoddiskutovatelný význam pro mezinárodní srovnání, při použití standardů WHO pro hodnocení růstu českých dětí by mohlo paradoxně docházet k předčasnému zavedení dokrmu. Studie růstu českých kojenech dětí provedená v roce 2010 ukázala, že nové standardy WHO nejsou pro posuzování růstu českých kojenech dětí zcela vhodné.

Pro posuzování růstu českých kojenech dětí lze využívat referenční data (růstové grafy) používané pro celou českou dětskou populaci. Je však třeba mít na paměti několik specifik růstu kojenech.

- České referenční grafy tělesné délky i obvodu hlavy dobře odpovídají růstu kojenech.
- U hmotnosti se nejvýrazněji projevuje specifický rys růstu kojeneho dítěte, které v prvních měsících po porodu může vykazovat ve srovnání s českými referenčními grafy větší hmotnostní přírůstky – jeho individuální růstová křivka stoupá strměji než křivky v percentilovém grafu. Ve věku přibližně mezi 2. a 3. měsícem se tento trend zpomaluje. Přírůstky se relativně snižují, individuální křivka už nestoupá tak strmě, ale naopak se začíná přibližovat ke křivkám percentilového grafu. Tento jev je fyziologický a neměl by být automaticky důvodem k zavedení dokrmu.
- Po prvním půlroce se křivka hmotnosti kojeneho dítěte často kříží s křivkami percentilového grafu a dostává se pod ně. To ukazuje na fakt, že kojene

děti se kolem tohoto věku stávají štíhlejšími ve srovnání s většinou populací a kojení působí jako preventivní faktor vzniku obezity. Není proto potřeba neúměrně zvyšovat energetický příjem dlouhodobě kojenech dětí v druhém půlroce jejich života ve snaze dosáhnout hodnot daných percentilovými křivkami.

- Hodnocení prospívání podle grafu hmotnosti k tělesné délce je celkově objektivnější než hodnocení pouze podle hmotnosti samotné. Přibližně do tělesné délky 65 cm (tj. v době, kdy jsou děti ve věku, který je pro zachování dlouhodobého kojení rozhodující) růstový trend kojenech dětí odpovídá křivkám v růstovém grafu pro celou populaci. Pak se projeví nižší hmotnost kojenech dětí, a proto jsou i hodnoty hmotnosti k délce u kojeneho dítěte nižší a křivka kojeneho dítěte se dostává pod křivku percentilového grafu. I to ukazuje, že kojení je preventivním faktorem vzniku obezity.

Pomoc s kojením:

Laktační Liga:

Fakultní Thomayerova nemocnice Krč, Praha, laktacniliga@seznam.cz

Národní linka kojení:

tel. 261 082 424, ve všední dny od 9.00 – 13.00 hod.

www.kojeni.cz

Doporučeno Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP, Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost a Českou neonatologickou společností
Zpracovali: Mgr. Markéta Paulová, Ph.D., RNDr. Jiřka Biedlová, Ing. Jana Vignarová, CSc., MUDr. Dagmar Schneiderová, CSc.
Grafická úprava: Daniela Stadík, ARGI, spol. s r.o.
Recenze: MUDr. Magdaléna Paulová, CSc.

Státní zdravotní ústav
(Dobruška 48, Praha 10)



Vydal:

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
(Ruska 87, Praha 10)

Titk: Matvix Media s.r.o.
1. vydání, Praha 2011




© Státní zdravotní ústav, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta
NEPRODEJNÉ
Výtiskem podpořeno grantem IGA MZ ČR č. NS 9574-4/2008

Informace pro pediatry formou článků v odborných časopisech.

Program RůstCZ a leták ke stažení:

<http://www.szu.cz/publikace/data/rust-kojenych-deti>



Rozhodnutí v jiných zemích, např.

- **Anglie:** WHO standardy použitelné pro věk 2 týdny až 24 měsíců. Jinak ponechat Anglické reference.
- **Belgie, Norsko:** WHO standardy nepřijala, růst kojených dětí se blíží více národním referencím.
- **USA:** WHO standardy přijaty pro děti 0-24 měsíců.

7) METODIKA MĚŘENÍ TĚLESNÝCH CHARAKTERISTIK


- **nutná přesnost měření**
- **kalibrovaná měřidla**
- **metodika měření založená na znalosti anatomie a antropometrických bodů**

TĚLESNÁ DÉLKA

U dětí do 24 měsíců se měří vleže. K měření délky těla vleže používáme korýtko nebo na přebalovacím stole upevněný dolní díl pásového měřidla či krejčovské míry. U kojenců je třeba k měření dvou osob – jedna drží dítěti hlavičku tak, aby se temeno dotýkalo svislé plochy u nulového bodu měřidla, osa ramen a osa kyčlí jsou v kolmé poloze k dlouhé ose těla. Druhá osoba drží natažené dolní končetiny dítěte u kotníků a přisune posuvnou kolmou plochu (např. dřevěný blok) k patičkám dítěte a odečte délku na stupnici. Podmínkou správného měření je, aby byly dolní končetiny dítěte natažené v kolenou, a aby se obě paty dotýkaly posuvné svislé plochy současně.



TĚLESNÁ VÝŠKA



U dětí starších dvou let měříme výšku těla vstoje antropometrem nebo stadiometrem. Pokud není k dispozici ani jedno z uvedených měřidel, měříme tělesnou výšku u svislé stěny (bez lištového obložení na podlaze), na které je upevněný papírový měřicí pás tak, aby nulová hodnota škály odpovídala úrovni podlož-

TĚLESNÁ VÝŠKA



Výšku těla odečítáme na škále pomocí pravoúhlého trojúhelníku, jehož vodorovné rameno se dotýká nejvyššího bodu na temeni hlavy (vertex), svislé rameno je přiloženo k pásovému měřidlu.

Před měřením je nutno odstranit případnou úpravu účesu na temeni hlavy. Měříme s přesností na 0,5 cm.

Poznámka: Měření tělesné výšky na osobní váze opatřené výsuvnou tyčí pro zjišťování tělesné výšky není vhodné pro nepřesnost měření, zejména v souvislosti s odlišným postojem měřeného jedince.


HMOTNOST TĚLA



U dětí do 18 měsíců zjišťujeme hmotnost na kojenecké váze s přesností na 0,1 kg, u dětí schopných samostatného stání buď na pákové lékařské váze s přesností na 0,1 kg nebo na osobní nášlapné váze, která byla předem vyzkoušena a je položena na pevném rovném podkladu, s přesností na 0,5 kg. Kojenci se váží pouze s plenou, jejíž hmotnost se odečítá (u látkové pleny odečítáme 10 dkg), ostatní ve spodním prádle (cvičebním úboru), vždy bez obuvi.




OBVOD HLAVY



Měříme jako tzv. maximální obvod hlavy pásovou mírou vedenou vpředu těsně nad obočím, tj. v místě největšího vyklenutí čela, vzadu přes největší vyklenutí týlu. Při zjišťování obvodu větší děti (měřený jedinec) stojí nebo sedí k vyšetřujícímu levým bokem, hlava je držena v poloze jako při měření tělesné výšky. Míru rozvineme a obtočíme kolem hlavy zleva doprava, takže se fixovaný začátek a konec protnou na levé straně hlavy. Je třeba sledovat, aby byla míra vedena po obou stranách hlavy stejně vysoko, a aby se pod ní nedostal horní okraj ušního boltce. Někdy je nutno odstranit úpravu účesu (rozpustit vlasy, sundat sponky, čelenky), je rovněž třeba přesvědčit se, že míra probíhá vzadu skutečně přes největší vyklenutí týlu např. tak, že mírou, kterou jsme uchopili mezi palec a ukazovák zkusíme posunovat nahoru a dolů. Pásovou míru při měření pevně utáhneme, hodnotu odečítáme s přesností na 0,1 cm.


OBVOD LEVÉ PAŽE



Měříme pásovou mírou vedenou kolmo na podélnou osu levé paže v poloviční vzdálenosti mezi ramenním a loketním kloubem (mezi nadpažkem lopatky – akromion a hrotem lokte – olecranon). Pro stanovení místa měření je horní končetina ohnuta v lokti v pravém úhlu, při vlastním měření paže visí volně podél těla. Pásová míra nesmí stlačovat kůži ani být volná. Hodnotu obvodu odečítáme s přesností na 0,1 cm.

Poznámka: Při měření obvodových rozměrů se dobře osvědčuje samonavíjecí textilní míra šířky 1 cm s milimetrovou stupnicí s posunutým začátkem, event. opatřená na začátku prodlužujícím „očkem“ z tenkého provázku.

OBVOD BŘICHA




Měříme pásovou mírou ve vodorovné rovině vpředu přes pupek. Pásová míra je vedena vodorovně i na zádech měřeného, přiléhá ke kůži, ale nesmí ji stlačovat ani být volná. Měříme zřepředu přímo na těle a ne přes sportovní oděv s přesností na 0,5 cm. Měříme vodorovně přes pasu!

Měříme vždy v horizontální rovině

OBVOD BOKŮ

OBVOD PASU - polovina vzdálenosti mezi spodním okrajem hrudníku, respektive žebra, (může to být 11. žebro, ale i 12. nebo 10., záleží na konkrétním utváření hrudníku a délce volných žebířek), a horním okrajem pánevních kostí, konkrétně kosti kyčelní (os ilium), její horní okraj je crista iliaca. Bere se vzdálenost v místě, kde jsou tyto útvary k sobě nejbliže, takže přibližně na boku těla (někdy maličko víc dopředu).



Měříme pásovou mírou ve vodorovné rovině přes největší vyklenutí hýždí kolmo na osu těla. Pásová míra je vedena vodorovně i na zadní straně těla měřeného, přiléhá k tělu, ale nesmí kůži pod sebou stlačovat ani být volná. Měříme ve stojícím spojném (paty a špičky u sebe), přes spodní prádlo, případně přes tenký sportovní oděv, s přesností na 0,5 cm.

Růstové grafy ke stažení:

<http://www.szu.cz/publikace/data/seznam-rustovych-grafu-ke-stazeni>

Podle Úmluvy o právech dítěte:

**Každé dítě má právo
na nejvyšší možný
dosažitelný standard
zdraví...**

(Úmluva o právech dítěte, článek 24)

