


# Neuron

## Nervová soustava

- Centrální nervový systém (CNS)
  - mozek
  - mícha
- Periferní nervový systém (nervy)

## Základní stavební jednotky

- Neuron – přenos a zpracování informací
- Glové buňky – péče o neurony, metabolická, ochranná, imunitní, homeostatická a oporná funkce (CNS nemá pojivové tkáně)




Převzato z: Atlas fyziologie člověka, S. Silbernagl


# Hematoencefalická bariéra

Bariéra mezi kapilárou a mozkem – velice těsné spojení mezi buňkami  
Brání průchodu většině látek – ochrana mozku


- Pouze  $O_2$ ,  $CO_2$ ,  $H_2O$  můžou procházet volně
- Glukóza a aminokyseliny jsou převáděny speciálními přenašeči
- Většina ostatních látek neprochází
- Spojení mezi kapilárou a neuronem je zprostředkováno gliovými buňkami (astrocyty – typ gliové buňky)




# Stavba neuronu (nemyelinizovaný)




# Stavba neuronu (myelinizovaný)




# Různé typy neuronů



# Různé typy neuronů




# Klidové napětí a akční potenciál



## Klidové napětí:

- na membráně buňky za klidových podmínek
- uvnitř buňky je záporný náboj, na povrchu buňky je kladný náboj
- buňka je nepropustná pro  $\text{Na}^+$
- uvnitř buňky je větší koncentrace  $\text{K}^+$ , mimo buňku je větší koncentrace  $\text{Na}^+$
- koncentrace  $\text{K}^+$  uvnitř je menší než koncentrace  $\text{Na}^+$  vně  
→ záporný náboj uvnitř buňky


# Klidové napětí a akční potenciál




## Akční potenciál (AP)


- Pokud je překročena prahová hodnota napětí (-55 mV), vzniká na membráně akční potenciál
- Fáze depolarizace**
  - otevírají se kanály pro  $\text{Na}^+$
  - $\text{Na}^+$  vstupuje do buňky
- Zákon vše nebo nic – nepřekročí-li se práh, žádný AP, překročí-li se práh – vzniká AP
- Fáze repolarizace**
  - kanály pro  $\text{Na}^+$  jsou znovu zavřeny
  - $\text{K}^+$  vstupuje do buňky
  - $\text{Na}^+$  je pumpován ven
  - Napětí se dostává zpět ke klidovým hodnotám


# Šíření akčního potenciálu (nemyelinizované vlákno)







# Šíření akčního potenciálu (nemyelinizované vlákno) - detail













## Šíření akčního potenciálu (nemyelinizované vlákno) - detail





## Šíření akčního potenciálu (nemyelinizované vlákno) - detail







AP se šíří bez dekrementu (bez úbytku), tzn. AP je stále stejně velký

Protože je AP stále stejně velký, přenášená informace se kóduje do frekvence AP


# Šíření akčního potenciálu (myelinizované vlákno) - detail




# Šíření akčního potenciálu (myelinizované vlákno) - detail




# Šíření akčního potenciálu (myelinizované vlákno) - detail




# Šíření akčního potenciálu (myelinizované vlákno) - detail




# Šíření akčního potenciálu (myelinizované vlákno) - detail




# Šíření akčního potenciálu (myelinizované vlákno) - detail




# Synaptická zakončení




# Synapse obecně




# Synapse obecně




# Synapse obecně



# Synapse obecně



# Příklad: Nervo-svalová ploténka kosterního svalu




# Postsynaptický potenciál (PSP)

Neurotransmitery navázané na určité typy receptorů postsynaptické membrány způsobí k otevření iontových kanálů a přesun iontů z/do buňky

- změna potenciálů na postsynaptické membráně
- vzniká **postsynaptický potenciál**

## Postsynaptický potenciál



- je slabý (mnohokrát slabší než AP)
- šíří se od synapse s dekrementem (úbytkem) – zmenšuje se, když se vzdaluje od synapse (postupně zaniká)



Jeden typ neurotransmiteru se váže na jeden typ receptoru a otvírá jeden typ iontových kanálů

# Excitační postsynaptický potenciál (EPSP)

Postsynaptický potenciál vyvolávající depolarizaci buňky (ale mnohem slabší než je AP)  
Vstup kationtů do buňky (např.  $\text{Ca}^{2+}$  nebo  $\text{Na}^+$ )





Jeden typ neurotransmiteru se váže na jeden typ receptoru a otvírá jeden typ iontových kanálů  
Např. acetylcholin navázaný na nikotinový receptor způsobí otevření kanálu pro  $\text{Na}^+$  a vstup  $\text{Na}^+$  do buňky

# Inhibiční postsynaptický potenciál (IPSP)

Postsynaptický potenciál vyvolávající hyperpolarizaci buňky

Vstup aniontů do buňky (např. Cl<sup>-</sup>) nebo výstup kationtů z buňky (K<sup>+</sup>)




Jeden typ neurotransmiteru se váže na jeden typ receptoru a otvírá jeden typ iontových kanálů  
Např. GABA navázaná na GABA<sub>A</sub> způsobí otevření kanálu pro Cl<sup>-</sup> a vstup Cl<sup>-</sup> do buňky

# Šíření excitačního postsynaptického potenciálu

Postsynaptický potenciál


- je slabý (mnohokrát slabší než AP)
- šíří se od synapse s dekrementem (úbytkem) – zmenšuje se, když se vzdaluje od synapse (postupně zaniká)



# Šíření inhibičního postsynaptického potenciálu

Postsynaptický potenciál

- je slabý
- šíří se od synapse s dekrementem (úbytkem) – zmenšuje se, když se vzdaluje od synapse (postupně zaniká)





# Sčítání postsynaptických potenciálů

Na těle neuronu můžou být zároveň excitační i inhibiční synapse

## EPSP a IPSP se sčítají – souhrnné PSP



- Převaha IPSP – hyperpolarizace membrány
- Převaha EPSP – depolarizace membrány



Tělo neuronu

# Sčítání postsynaptických potenciálů

Na těle neuronu můžou být zároveň  
excitační i inhibiční synapse  
**EPSP a IPSP se sčítají**



Dva EPSP, které vznikly na  
dendritu ve stejný čas



Souhrnný PSP



# Sčítání postsynaptických potenciálů

Všechny EPSP a IPSP, které ve stejný čas přišly na neuron se sčítají

Pokud součet všech PSP překročí prahovou hodnotu (kolem  $-55\text{mV}$ ), vzniká akční potenciál





**EPSP** – má různou amplitudu, která je ale menší než amplituda akčního potenciálu, šíří se s dekrementem  
**Akční potenciál** – vzniká jen po překročení prahu, má konstantní amplitudu, šíří se bez dekrementu



Depolarizace membrány nemusí vést k AP  
Pokud depolarizace nepřekročí prah, AP nevzniká

# Prostorová sumace

Čím více je na neuronu excitačních synapsí, na které ve stejný čas přišel AP, tím více vzniklo EPSP a tím snadněji je dosaženo prahu pro vznik AP na postsynaptickém neuronu




# Konvergence




# Divergence

Jeden neuron může  
inervovat několik neuronů




# Inhibice

Inhibice – dopředná blokáda




Inhibice – zpětná blokáda




# Časová sumace

Čím vyšší je frekvence AP přicházejících na synapsi, tím větší je souhrnný PSP a tím dříve je dosaženo prahové hodnoty pro vznik AP na postsynaptickém neuronu



# Kódování informace

- Kódování - intenzita podnětu zaznamenaná receptorem je překódována do frekvence AP
- Dekódování - na synapsi je frekvence AP převedena do PSP
- Rekódování - pokud součet všech PSP překročí práh, vzniká AP




Převzato z: Atlas fyziologie člověka, S. Silbernagl

# Podnět a intenzita

Podnět (sluchový, zrakový, hmatový,...) je kódován receptorem do frekvence AP

Čím déle trvá podnět, tím menší intenzita podnětu stačí pro vznik AP

Čím větší je intenzita podnětu, tím kratší podnět stačí pro vznik AP



**Reobáze:** nejmenší podnět, při kterém ještě dojde ke vzniku AP

**Chronaxie:** délka podnětu, která je nezbytná pro vznik AP, je-li intenzita podnětu o velikosti dvou reobází