



Gram pozitivní aerobní a fakultativně anaerobní bakterie

Ivana Vítková
OKM, FN Brno

Gram pozitivní koky - charakteristika

- **Koky:** kulovitý tvar, velikost v průměru 1μ
- **Uspořádání:** dvojice (diplokoky), řetízky, tetrády, shluky





Grampozitivní koky - charakteristika

- Barvitelnost dle Gramma: dělení bakterií podle schopnosti podržet si barvivo v přítomnosti alkoholu, dáno složením bakteriální stěny

■ Bakterie: Gram pozitivní

Gram negativní




Gram pozitivní koky - rozdělení

- Katalasapozitivní: *Staphylococcus*
Micrococcus
- Katalasanegativní: *Streptococcus*
Enterococcus
Lactococcus
Abiotrophia
Granulicatella


Staphylococcus

- Grampozitivní koky uspořádané nejčastěji ve shlucích
- Nepohyblivé
- Netvoří spory
- Většinou fakultativně anaerobní
- Katalasapozitivní



Staphylococcus

- Celkem 50 různých stafylokoků
- Dělení: podle schopnosti koagulovat plazmu
- Koagulasapozitivní: *S. aureus* (STAU)
S. intermedius
- Koagulasanegativní (KNS)



Staphylococcus aureus

- Nejdůležitější lidský patogen
- Vůdčí původce nozokomiálních infekcí
- Vysoká schopnost vyvolávat infekce
- Vysoká schopnost kolonizovat (30% populace jsou perzistentní nosiči)
- Aerobní i anaerobní růst, teplota 7-46 °C, běžně kolem 36 °C

Staphylococcus aureus – faktory virulence

- Umožňující adherenci k buňkám hostitele

plazmakoaguláza – volná koaguláza

shlukovací faktor (clumping faktor)-vázaná koaguláza

kapsulární polysacharidové adheziny

polysacharidové intracelulární adheziny

sliz

Staphylococcus aureus – faktory virulence

- Umožňující pronikání do buněk nebo tkání hostitele
 - α -hemolyzin
 - β -hemolyzin (fosfolipáza c)
 - γ -hemolyzin
 - δ -hemolyzin
 - nukleázy, fosfatáza
 - hyaluronidáza, elastáza
 - Pantonův-Valentinův leukocidin (PVL)

Staphylococcus aureus – faktory virulence

- Umožňující protiútok bakterií proti obranným mechanismům hostitele
 - enterotoxiny
 - toxin syndromu toxického šoku 1 (TSST-1)
 - exfoliantiny
 - protein A, stafylokináza (fibrinolyzin)
 - lipáza, leukocidiny, proteázy
 - β -laktamáza, lysostafin, kataláza

Staphylococcus aureus - patogenita

■ 1. Pyogenní infekce kůže a jejích adnex

impetigo, folliculitis, sycosis barbae,
hordeolum, conjunctivitis, furunculus,
carbunculus, mastitis, hidradenitis



impetigo


Staphylococcus aureus - patogenita

■ 2. Infekce krevního řečiště

bakteriemie, sepse

infekční endokarditida

tromboflebitida (např. po zavedení i.v.katetru)





■ 3. Respirační infekce

pneumonie v komunitě (např. po chřipkách)

nozokomiální pneumonie (často u pacientů
na ventilátorech)



Staphylococcus aureus - patogenita

■ 4. Infekce pohybového aparátu osteomyelitis, arthritis



Staphylococcus aureus - patogenita

■ 5. Infekce centrálního nervového systému purulentní meningitida mozkový absces



Staphylococcus aureus - patogenita

■ 6. Onemocnění vzniklá účinkem toxinů

Syndrom toxického šoku

Stafylokokové enterotoxikózy

Lyellův syndrom

Pemphigus neonatorum




Staphylococcus aureus - laboratorní průkaz

- Materiály k vyšetření: hemokultura, hnis, sputum, punktaty, moč,..
- Mikroskopie: Gram pozitivní koky ve shlucích
- Kultivace: půdy obohacené krví -např. krevní agar, BHI (mozkosrdcový) bujón, selektivní půda – krevní agar s 10% NaCl)
kolonie bílé až žluté se zónou hemolýzy
- Průkaz vázané plasmakoagulázy

Staphylococcus aureus

- **Morfologie:** pigmentované hladké kolonie, nejčastěji smetanové či žluté barvy, velikosti 1 až 3mm za 24 hodin kultivace, zóna beta-hemolýzy



Staphylococcus aureus – laboratorní průkaz

- Průkaz volné koagulázy
- Průkaz hyaluronidázy : dekapsulace mukózního kmene *Streptococcus equi*
- Latexová aglutinace: detekce proteinu A i kapsulárních polysacharidů
- Biochemie
- Průkaz nukleových kyselin – přímo z materiálu
- MALDI TOF
- Průkaz toxinů: aglutinace, PCR


Staphylococcus aureus methicilin rezistentní (MRSA)

- Závažný nozokomiální patogen
- Nutné dodržování speciálního hygienickoepidemiologického režimu
- V laboratoři je potřeba používat speciální selektivní půdy
- Rezistentní k oxacilinu, často i dalším antibiotikům
- Léčíme jen infekce, ne kolonizace
- Lék volby je vankomycin

Staphylococcus aureus - terapie

- Antibiotika: lék volby je oxacilin
- MRSA: vankomycin
- *Staphylococcus intermedius*

Hostitel pes, u člověka v ranách po
pokousání psem




Stafylokoky koagulasanegativní (SKN)

- **Význam:** součást běžné flóry kůže a sliznic
oportunní patogen (ohrožení:
imunokompromitovaní pacienti, pacienti se zavedenými
pomůckami- např. katetry, cévní protézy, i.v. narkomani)
- Schopnost tvorby biofilmu, malá virulence, často stačí pouhé
vyjmutí katetru

Streptococcus

- Gram pozitivní koky
- Uspořádané nejčastěji ve dvojicích,
v řetízcích
- Fakultativně anaerobní
- Katalasa negativní
- Nepohyblivé
- Druhy obligátně patogenní, jiné součástí běžné
flóry



Streptococcus - rozdělení

- **Beta-hemolytické - nejvýznamnější:**

Streptococcus pyogenes (skupina A podle Lancefieldové)

Streptococcus agalactiae (skupina B)

- **Non-beta hemolytické - nejvýznamnější:**

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus bovis,

Streptococcus suis

Nutriční varianty streptokoků

Orální (ústní) streptokoky

Streptococcus pyogenes

- **Význam:** hnisavé infekce faryngu a kůže
 - těžká celková onemocnění
 - možný vznik pozdních následků
- **Morfologie:** kulaté koky ve dvojicích a řetízcích
 - velikost 0,6 až 1 μ m
- **Kultivace :** půdy obohacené krví či sérem – krevní agar, BHI bujón, zvýšená tenze CO₂, 36-37 C, 18-24 hod.

Streptococcus pyogenes

- Kolonie drobné, lesklé, kolem zóna beta-hemolýzy, opouzdřené kmeny- růst ve větších mukózních koloniích




Streptococcus pyogenes – faktory virulence

- Povrchové: protein M, proteiny blízké proteinu M
pouzdro z kyseliny hyaluronové
- Extracelulární enzymy: streptolysin O, S
streptokinasa, hyaluronidasa
enolasa, C5 peptidasa
- Toxiny: streptokokové pyrogenní toxiny (Spe)

Streptococcus pyogenes - patogenita

- 1. Lokalizované pyogenní infekce
tonsillitis (angína), scarlatina (spála)



Streptococcus pyogenes - patogenita

- Lokalizované infekce –pyodermie

impetigo, erysipelas (růže), cellulitis (zánět podkoží),
hnisání ran



Streptococcus pyogenes - patogenita

- 2. Invazivní onemocnění a onemocnění způsobená toxiny
 - phlegmona, myositis,
 - myonecrosis
 - nekrotizující fasciitis
 - pneumonie, meningitis
 - poporodní sepse (horečka omladnic)
 - syndrom streptokokového toxickeho šoku



These large, dark, boil-like blisters are a diagnostic symptom of necrotizing fasciitis (also known as flesh-eating disease).
(Source: EMBBS, 1996 <http://mdchoice.com/>)

Streptococcus pyogenes - patogenita

- 3. Pozdní následky streptokokových onemocnění

febris rheumatica (revmatická horečka)


glomerulonephritis acuta

neurologické – chorea minor



Streptococcus pyogenes – laboratorní průkaz

- **Materiály k vyšetření:** výtěr z mandlí, rány, hemokultura, hnis, sputum, punktaty, likvor,..
- **Mikroskopie:** Gram pozitivní koky ve dvojicích, řetízcích
- **Kultivace:** krevní agar, BHI (mozkosrdcový) bujón, 18-24 hod., CO₂ termostat
drobné kolonie se zónou beta-hemolýzy
- Latexová aglutinace , MALDI TOF
- ASLO (antistreptolysin O)- pozdní následky



Streptococcus pyogenes - terapie

- Lék volby: penicilin
 - makrolidy (u alergických na PEN)
 - cefalosporiny I. a II. Generace
- Příčiny „selhání léčby“: nejčastěji **nedodržení intervalu podávání antibiotika**,

Streptococcus agalactiae

- **Význam:** nejdůležitější původce novorozeneckých meningitid a sepsí



POZOR na kolonizaci pochvy
těhotných žen!

- **Morfologie:** G+ koky v řetízcích
- **Kultivace:** krevní agar, BHI bujón, teplota 36-37 °C, zvýšená tenze CO₂, 18-24 hod.



Streptococcus agalactiae

- Kolonie na krevním agaru: obklopené úzkou zónou beta-hemolýzy, zesílení hemolýzy v sousedství *Staphylococcus aureus* díky CAMP-faktoru



Streptococcus agalactiae - patogenita

- 1. Novorozenecké meningitidy a sepse
 - časné infekce: vznik během průchodu porodním kanálem, projeví se během několika dní po narození
 - pozdní infekce: dítě se nakazí až po porodu, projeví se koncem 1. měsíce života
- 2. Komplikace v šestinedělích: endometritidy, infekce močových cest,..

Streptococcus agalactiae – patogenita a terapie


- 3. Onemocnění imunokompromitovaných pacientů
 - pneumonie
 - meningitidy
 - osteomyelitidy
 - infekce ran
- Terapie: ampicilin, penicilin

Streptococcus agalactiae – laboratorní průkaz

- **Materiály k vyšetření:** krev, likvor, hnis, punktány, moč,..výtěr z vagíny –screening u těhotných
- **Mikroskopie:** G+ koky v řetízcích
- **Kultivace:** Krevní agar, zvýšená tenze CO₂, 36-37 °C, 18-24 ho
- Pozitivní CAMP test, MALDI TOF
- Latexová aglutinace - z narostlé kultury
- Průkaz nukleových kyselin - PCR

Streptococcus pneumoniae

- Význam: nejčastější bakteriální původce závažných komunitních pneumonií
- Morfologie: G+ koky ve dvojcích s nebarvícím se pouzdrem



Streptococcus pneumoniae

- Kultivace: půdy obohacené krví či sérem, teplota 36-37 °C, zvýšená tenze CO₂
 - Morfologie kolonií na krevním agaru:
 - hlenovité kolonie (mukózní -M fáze)
 - miskovité kolonie
 - suché kolonie (při snížené tvorbě pouzderného polysacharidu)
- kolonie obklopené zónou alfa-hemolýzy

Streptococcus pneumoniae mukózní kolonie na krevním agaru




Streptococcus pneumoniae – faktory virulence

- Polysacharidové pouzdro (ochrana před fagocytózou)
- Adheziny: povrchový adhezin A
povrchový protein C
- Invaziny: hyaluronidasa
neuraminidasa
- Pneumolyzin
- Autolyzin, polysacharid C


Streptococcus pneumoniae - patogenita

- 1. Komunitní pneumonie (ohrožení zvláště kojenci a starší dospělí)



Streptococcus pneumoniae - patogenita

- 2. Rhinitis purulenta (zánět nosní sliznice)
Otitis media (zánět středního ucha)
Mastoiditis (zánět bradavčitého výběžku)
Sinusitis (zánět vedlejších nosních dutin)
- 3. Purulentní meningitis (starší dospělí, malé děti)




Streptococcus pneumoniae – patogenita a terapie

- 4. Akutní endokarditida (zánět nitroblány srdeční)
- 5. Peritonitida
- 6. Sepse u asplenie (pacienti bez sleziny)
- 7. Arthritida (zánět kloubů)

- Terapie: lék volby penicilin
ampicilin, cefotaxim, chloramfenikol
- Prevence: vakcinace (malé děti, oslabení dospělých)

Streptococcus pneumoniae – laboratorní průkaz

- Materiál k vyšetření: sputum, krev, punktáty, likvor, moč k průkazu antigenu,...
- Mikroskopie: G+ koky ve dvojicích, pouzdro, lancetovitý tvar koků
- Kultivace: krevní agar, zvýšená tenze CO₂, 18-24 hod., typická morfologie kolonií
- Optochinový test: kolem disku s optochinem vzniká zóna inhibice růstu




Streptococcus pneumoniae – laboratorní průkaz

- Průkaz antigenů: latexová aglutinace
 - z narostlé kultury
 - přímo z materiálu – likvor, moč
- Biochemie
- Test rozpustnosti ve žluči
- Průkaz nukleových kyselin - PCR


Enterococcus

- **Význam:** součást normální mikroflóry střeva
závažný podmíněný nemocniční patogen
- **Morfologie:** G+ koky ve dvojicích či krátkých řetízcích
- **Více klinicky významných druhů:** nejčastější
Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium



Enterococcus

- **Kultivace:** kultivačně nenáročné, krevní agar, selektivní půdy (např. Slanetz-Bartleyho půda), 36-37 °C, 18-24 hod.
- **Patogenita:** infekce močových cest
infekce nitrobřišní
sepse u oslabených pacientů
endokarditida



Enterococcus – laboratorní diagnostika


- Materiály k vyšetření: moč, krev, hnis, punktány,..
- Mikroskopie: G+koky ve dvojicích
- Kultivace: viz výše, selektivní půdy na vankomycin rezistentní enterokoky, žluč-eskulínové půdy
- PYR test: průkaz pyrolidonylaminopeptidasy
- Biochemické testy ,MALDI TOF, PCR

Enterococcus - terapie

- Přirozená rezistence enterokoků závislá na druhu
- Používaná antibiotika: ampicilin
 - furantoin (moč. infekce)
 - vankomycin, ...
- Pozor na nemocniční kmeny rezistentní na vankomycin (**VRE**)


Gram pozitivní sporující aerobní tyčinky – rod *Bacillus*

- V přírodě běžně rozšířené
- Ke sporulaci dochází pouze za přítomnost kyslíku
- Patří sem více druhů, některé z nich jsou obligátní lidské patogeny (*Bacillus anthracis*,
Bacillus cereus)




Bacillus anthracis

- **Význam:** původce sněti slezinné (antraxu), možné zneužití – bioterorismus
- Z nakažených zvířat - býložravci – snadný přenos na člověka, - možnost přenosu kontaktem -dobytcí kůže, štětiny,..
- Možnost nákazy vdechnutím spor (biologická válka, spory v dopisech, sekta Óm Šin Rikjo)
- **Morfologie:** velké nepohyblivé G+ tyčky s pozdrem, spory centrálně uložené
- **Kultivace:** běžné kultivační půdy, široké teplotní optimum, běžně 36-37 °C



Bacillus anthracis

- Vzhled kolonií: plstnaté ploché šedé kolonie s dlouhými výběžky (caput Medusae)




Bacillus anthracis - patogenita

- Kožní forma: zpočátku svědící papula, během několika dní se mění na nebolestivý vřed s hemoragickou nekrózou obklopený edémem (pustula maligna), rozvíjí se lymfadenitida, později sepse



Bacillus anthracis - patogenita

- **Plicní forma:** spory jsou vdechnuty, dostávají se do uzlin v mezihrudí, vzniká zde nekrotický zánět, sepse, nemocný umírá během několika hodin až dnů
- **Střevní forma:** po požití kontaminované potravy, zvracení, silné bolesti břicha, sepse, smrt
- **Orofaryngeální forma:** primární léze je na mandlích, nebo v ústní dutině



Bacillus anthracis – laboratorní vyšetření

- Běžné diagnostické laboratoře (BL2) neprovádějí diagnostiku, při podezření na *Bacillus anthracis* je materiál transportován ve trojitém obalu do NRL pro anthrax Státního veterinárního ústavu
- Podezření na anthrax: podle klinických příznaků, v laboratoři – typická mikroskopie z klinického materiálu, kultivace – typický vzhled kolonií, dále již v laboratoři BL2 nedourčujeme
- Terapie: penicilin, ciprofloxacin
- Prevence: vakcinace dobytka, ohrožených obyvatel

Bacillus cereus

- **Význam:** původce závažných infekcí oka a enterotoxikóz, nachází se běžně v zevním prostředí, je součástí střevní mikroflóry
- **Morfologie:** G+ neopouzdřená tyčka, spóra centrálně
- **Kultivace:** kultivačně nenáročná, běžné kultivační půdy i teploty, kolonie velké, plstnaté, se zónou beta-hemolýzy, lze používat i selektivně diagnostické půdy



Bacillus cereus - patogenita

- Producenč řady toxinů: enterotoxiny (emetický a průjmový), hemolyziny, fosfolipasa C
- Enterotoxikóza: po požití kontaminované potravy, podle typu toxinu:
1. vodnatý průjem a kolika po 6-16 hod. po požití (masné výrobky a omáčky, např. ohřívaný guláš)
2. nausea a zvracení vznikající do 5 hod. po požití potravy (těstoviny a rýže)



Bacillus cereus - patogenita

- Endoftalmitida: fulminantně probíhající zánět oka
- Infekce ran, sepse, meningitis, endokarditis u imunokomprpmítovaných pacientů



Bacillus cereus – laboratorní diagnostika a terapie

- Průkaz toxinů přímo z klinického materiálu či z narostlého kmene: latexová aglutinace, ELISA
- Mikroskopie: G+ tyčky s centrálně uloženou spórou
- Kultivace: viz výše, typický vzhled kolonií
- Biochemické testy, MALDI TOF
- Terapie: enterotoxikózy- jen rehydratace
invazivní onemocnění: linkosamidy, aminoglykosidy,
vankomycin

Listeria

- **Význam:** pro člověka patogenní především *Listeria monocytogenes*, nejčastěji **alimentární nákazy**, ale i závažná **onemocnění imunokompromitovaných pacientů, těhotných žen a novorozenců**


běžně se nachází v zevním prostředí

vektor nákazy: sýry, ..



Listeria

- **Morfologie:** rovná G+ tyčka, pohyblivá při teplotě do 25 °C
- **Kultivace:** kultivačně nenáročná, běžné kultivační půdy i teploty, růst i při chladničkové teplotě a vysoké koncentraci NaCl
- **Faktory virulence:** listeriolyzin O, fosfolipazy, internaliny (intracelulární růst)




Listeria - patogenita

- **Zdraví lidé** - bezpríznakové onemocnění, **imunokompromitovaní** (novorozenci, HIV+, onkologicky nemocní,...) – meningitidy, sepse, ..
- **Novorozenci:** infekce získané již v prenatálním období, či po porodu – nejčastěji sepse a meningitidy
Pozor na stravování během těhotenství
zrající nepasterizované sýry,....



Listeria – laboratorní diagnostika

- **Materiál k vyšetření:** krev, likvor, sekrety, biopsie, podezřelé potraviny
- **Mikroskopie:** rovné G+ tyčky
- **Kultivace:** viz výše, na krevním agaru lehce beta-hemolytické kolonie
- Katalasa pozitivní
- Pozitivní CAMP test, asi 80% listerií
- MALDI TOF, Biochemie
- PCR



Listeria - terapie

- Lék volby: ampicilin v kombinaci s gentamicinem




Erysipelothrix rhusiopathiae

- **Význam:** původce červenky prasat, možný přenos na člověka, ohrožení především řezníci, kuchaři
- **Morfologie:** G+ štíhlé tyčinky, nepohyblivé
- **Kultivace:** půdy obohacené krví či sérem, zvýšená tenze CO_2 , široké rozmezí teplot, snáší i chladničkové teploty a vyšší koncentrace NaCl
- **Laboratorní průkaz:**
 - Materiál k vyšetření: stěry z ran, sekrety, krev,..
 - Mikroskopie, kultivace: viz výše, MALDI TOF, PCR



Erysipelothrix rusiopathiae - patogenita

- Zoonóza, přenos na člověka nejčastěji poraněnou kůží



Erysipelothrix rusiopathiae – patogenita a terapie

- Erysipeloid: nejčastější, lokální kožní léze, bolestivé zarudnutí kůže, bez hnisání, často s artritidou přilehlého kloubu
- Endokarditida, sepse: oslabení jedinci (alkoholici)
- Terapie: lék volby **penicilin**



Arcanobacterium

- **Význam:** pro člověka patogenní druh ***Arcanobacterium haemolyticum***, původce tonsilitid dospívajících, infekcí ran
- **Morfologie:** G + tyčka
- **Kultivace:** obohacené půdy, nutná čára *Staphylococcus aureus*, 48 hod, teplota 36-37 C

Arcanobacterium

- Laboratorní diagnostika:
- Mikroskopie: G+ tyčky.
- Katalasa negativní
- Typický reverzní CAMP test za 48 hodin kultivace



Arcanobacterium



- Patogenita:
- Tonsilitida s vyrážkou, typické pro dospívající a mladé dospělé
- Infekce ran
- Terapie: makrolidy





© Williams/Karofsky




Nocardia

- **Význam:** běžně se nalézají v půdě, infekce plic, mozku, kůže, oka,... zvláště u imunokompromitovaných pacientů
- **Morfologie:** G+ větvící se tyčinky až vlákna




Nocardia


- **Kultivace:** na běžných kultivačních půdách,
- teplota 36-37 °C, 2-5 (14) dní
- **Laboratorní diagnostika:**
- Mikroskopie – z materiálu, z kultury
- Kultivace – viz výše, kolonie jsou bílé až oranžové, suché
- MALDI TOF, PCR




Nocardia – patogenita a terapie

- Ohroženy imunokompromitované osoby
- Abscesy plic, mozku., oka, orgány, kůže
- Terapie: lék volby **kotrimoxazol**





Corynebacterium



- **Význam:** Některé druhy jsou součástí běžné kožní fauny, *Corynebacterium diphtheriae* je původcem záškrtu
- **Morfologie:** G+ tyčky kyjovitého tvaru
- **Kultivace:** půdy obohacené krví, 36-37 °C, 18-24 hod., pro *C. diphtheriae*, nutné selektivní půdy (např. Clauerova půda s teluričitanem draselným)
- **Laboratorní průkaz:**
- **Materiál k vyšetření:** výtěr z krku, nasofaryngu- záškrt, krev, výtěry z ran,..-ostatní korynebakteria.
- **Mikroskopie, kultivace:** viz výše, MALDI TOF, PCR, biochemie

Corynebacterium - patogenita

- ***Corynebacterium diphtheriae***: původce záškrtu – projevuje se jako difterická angína, nebo croup (otok laryngu s pevnělnoucími pablánami) – může vést až k udušení, jako komplikace může vzniknout myokarditida, neuropatie
- ***Corynebacterium ulcerans***: infekce ran
- **Ostatní korynebakteria**: součást kožní flóry
- ***Corynebacterium jejkeum***: nosokomiální patogen
infekce ran



Fig. 2: Nekrotizující úlcer na koleni u pacientky s corynebakteriální infekcí. (Zdroj: C. ulcerans, Český svaz mikrobiologů)



Corynebacterium

- Terapie: lék volby **penicilin**, alternativa makrolidy
- Prevence: součástí povinného očkování



Děkuji Vám za pozornost

