


Buňka

CELL STRUCTURES




Neuron

Nervová soustava

- Centrální nervový systém (CNS)
 - mozek
 - mícha
- Periferní nervový systém (nervy)

Základní stavební jednotky

- Neuron – přenos a zpracování informací
- Glové buňky – péče o neurony, metabolická, ochranná, imunitní, homeostatická a oporná funkce (CNS nemá pojivové tkáně)




Převzato z: Atlas fyziologie člověka, S. Silbernagl


Hematoencefalická bariéra

Bariéra mezi kapilárou a mozkem – velice těsné spojení mezi buňkami
Brání průchodu většině látek – ochrana mozku


- Pouze O_2 , CO_2 , H_2O můžou procházet volně
- Glukóza a aminokyseliny jsou převáděny speciálními přenášeči
- Většina ostatních látek neprochází
- Spojení mezi kapilárou a neuronem je zprostředkováno gliovými buňkami (astrocyty – typ gliové buňky)




Stavba neuronu (nemyelinizovaný)




Stavba neuronu (myelinizovaný)




Různé typy neuronů



Různé typy neuronů




Klidové napětí a akční potenciál



Klidové napětí:



- na membráně buňky za klidových podmínek
- uvnitř buňky je záporný náboj, na povrchu buňky je kladný náboj
- buňka je nepropustná pro Na^+
- uvnitř buňky je větší koncentrace K^+ , mimo buňku je větší koncentrace Na^+
- koncentrace K^+ uvnitř je menší než koncentrace Na^+ vně
→ záporný náboj uvnitř buňky

Klidové napětí a akční potenciál





Akční potenciál (AP)


- Pokud je překročena prahová hodnota napětí (-55 mV), vzniká na membráně akční potenciál
- Fáze depolarizace**
 - otevírají se kanály pro Na^+
 - Na^+ vstupuje do buňky
- Zákon vše nebo nic – nepřekročí-li se práh, žádný AP, překročí-li se práh – vzniká AP
- Fáze repolarizace**
 - kanály pro Na^+ jsou znovu zavřeny
 - K^+ vstupuje do buňky
 - Na^+ je pumpován ven
 - Napětí se dostává zpět ke klidovým hodnotám





Šíření akčního potenciálu (nemyelinizované vlákno)















Šíření akčního potenciálu (nemyelinizované vlákno) - detail





Šíření akčního potenciálu (nemyelinizované vlákno) - detail







AP se šíří bez dekrementu (bez úbytku), tzn. AP je stále stejně velký

Protože je AP stále stejně velký, přenášená informace se kóduje do frekvence AP


Šíření akčního potenciálu (myelinizované vlákno) - detail



Šíření akčního potenciálu (myelinizované vlákno) - detail




Šíření akčního potenciálu (myelinizované vlákno) - detail




Šíření akčního potenciálu


(myelinizované vlákno) - detail




Šíření akčního potenciálu (myelinizované vlákno) - detail




Šíření akčního potenciálu (myelinizované vlákno) - detail




Synaptická zakončení




Synapse obecně




Synapse obecně




Synapse obecně



Synapse obecně



Příklad: Nervo-svalová ploténka kosterního svalu



Postsynaptický potenciál (PSP)


Neurotransmitery navázané na určité typy receptorů postsynaptické membrány způsobí k otevření iontových kanálů a přesun iontů z/do buňky

→ změna potenciálů na postsynaptické membráně

→ vzniká **postsynaptický potenciál**

Postsynaptický potenciál



- je slabý (mnohokrát slabší než AP)
- šíří se od synapse s dekrementem (úbytkem) – zmenšuje se, když se vzdaluje od synapse (postupně zaniká)



Jeden typ neurotransmiteru se váže na jeden typ receptoru a otvírá jeden typ iontových kanálů

Excitační postsynaptický potenciál (EPSP)

Postsynaptický potenciál vyvolávající depolarizaci buňky (ale mnohem slabší než je AP)
Vstup kationtů do buňky (např. Ca²⁺ nebo Na⁺)





Jeden typ neurotransmiteru se váže na jeden typ receptoru a otvírá jeden typ iontových kanálů
Např. acetylcholin navázaný na nikotinový receptor způsobí otevření kanálu pro Na⁺ a vstup Na⁺ do buňky

Inhibiční postsynaptický potenciál (IPSP)

Postsynaptický potenciál vyvolávající hyperpolarizaci buňky

Vstup aniontů do buňky (např. Cl⁻) nebo výstup kationtů z buňky (K⁺)




Jeden typ neurotransmiteru se váže na jeden typ receptoru a otvírá jeden typ iontových kanálů
Např. GABA navázaná na GABA_A způsobí otevření kanálu pro Cl⁻ a vstup Cl⁻ do buňky

Šíření excitačního postsynaptického potenciálu

Postsynaptický potenciál


- je slabý (mnohokrát slabší než AP)
- šíří se od synapse s dekrementem (úbytkem) – zmenšuje se, když se vzdaluje od synapse (postupně zaniká)



Šíření inhibičního postsynaptického potenciálu

Postsynaptický potenciál

- je slabý
- šíří se od synapse s dekrementem (úbytkem) – zmenšuje se, když se vzdaluje od synapse (postupně zaniká)





Sčítání postsynaptických potenciálů


Na těle neuronu můžou být zároveň excitační i inhibiční synapse

EPSP a IPSP se sčítají – souhrnné PSP

- Převaha IPSP – hyperpolarizace membrány
- Převaha EPSP – depolarizace membrány





Tělo neuronu




Sčítání postsynaptických potenciálů

Na těle neuronu můžou být zároveň
excitační i inhibiční synapse
EPSP a IPSP se sčítají





Tělo neuronu



Sčítání postsynaptických potenciálů

Všechny EPSP a IPSP, které ve stejný čas přišly na neuron se sčítají

Pokud součet všech PSP překročí prahovou hodnotu (kolem -55mV), vzniká akční potenciál





EPSP – má různou amplitudu, která je ale menší než amplituda akčního potenciálu, šíří se s dekrementem
Akční potenciál – vzniká jen po překročení prahu, má konstantní amplitudu, šíří se bez dekrementu



Depolarizace membrány nemusí vést k AP
Pokud depolarizace nepřekročí práh, AP nevzniká

Prostorová sumace

Čím více je na neuronu excitačních synapsí, na které ve stejný čas přišel AP, tím více vzniklo EPSP a tím snadněji je dosaženo prahu pro vznik AP na postsynaptickém neuronu




Konvergence




Divergence

Jeden neuron může
inervovat několik neuronů




Inhibice

Inhibice – dopředná blokáda




Inhibice – zpětná blokáda




Časová sumace

Čím vyšší je frekvence AP přicházejících na synapsi, tím větší je souhrnný PSP a tím dříve je dosaženo prahové hodnoty pro vznik AP na postsynaptickém neuronu



Kódování informace

- Kódování - intenzita podnětu zaznamenaná receptorem je překódována do frekvence AP
- Dekódování - na synapsi je frekvence AP převedena do PSP
- Rekódování - pokud součet všech PSP překročí práh, vzniká AP




Převzato z: Atlas fyziologie člověka, S. Silbernagl

Podnět a intenzita

Podnět (sluchový, zrakový, hmatový,...) je kódován receptorem do frekvence AP

Čím déle trvá podnět, tím menší intenzita podnětu stačí pro vznik AP

Čím větší je intenzita podnětu, tím kratší podnět stačí pro vznik AP



Reobáze: nejmenší podnět, při kterém ještě dojde ke vzniku AP

Chronaxie: délka podnětu, která je nezbytná pro vznik AP, je-li intenzita podnětu o velikosti dvou reobází