

Anatomie GIT

Úvodní přednáška

Doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.

Ústav ochrany a podpory zdraví

27. září 2018

- ▶ Rozšířené znalosti stavby GIT
- ▶ Propojení informací o stavbě GIT s
 - ▶ funkcí
 - ▶ základy patologie
 - ▶ vazby na další předměty oboru

Základní prameny ke kolokviu

1. Učební text **Anatomie trávicího ústrojí** dostanete po revizi do studijních materiálů
2. Učební text **Mikroflóra lidského organismu** budete mít ve studijních materiálech (po revizi)
3. Přednášky (pdf) – budete dostávat průběžně prostřednictvím IS
4. Obrázky z Grayova anatomického atlasu na <http://www.bartleby.com/107/indexillus.html>
součást prvního učebního textu je oboustranný převod zde užívaného názvosloví na současný stav
5. Odkazy na další web(y)
budou součástí přednášek

Testy

Součástí přednášek druhou počínaje budou *krátké testy*, jejichž výsledky budou použity v rámci hodnocení celkového výkonu studenta u kolokvia.

Povšechný popis trávicího ústrojí

Začátek GIT

Začátek je dutina ústní CAVUM ORIS, dělící se na VESTIBULUM ORIS a CAVUM ORIS PROPRIUM, jejíž podstatnou část vyplňuje LINGUA. Odděleny jsou čelistními oblouky se zuby DENTES. Zvenčí je ohrazena tvářemi BUCCAE, její spodinu tvoří jazyk a svaly, které ho ovládají, nacházejí se v ní GLANDULAE SALIVARIAE SUBLINGUALIS ET SUBMANDIBULARIS. Shora je vymezena patrem PALATUM, vpředu jede o PALATUM DURUM, jehož podkladem jsou MAXILLA a OS PALATINUM (OS INCISIVUM), vzadu navazuje PALATUM MOLLE, VELLUM PALATINUM, jehož podkladem je APONEUROSIS PALATINA a svaly. Dozadu je otevřena.

Funkce: žvýkání, sání, míchání sousta se slinami a polykání, též hmat a chuť.

Trávicí trubice

Na dutinu ústní navazuje trávicí trubice, začínající hltanem PHARYNX, pokračující jícnem OESOPHAGUS, žaludkem VENTRICULUS nebo z řečtiny GASTER, střevem INTESTINUM a končící konečníkem INTESTINUM RECTUM.

Funkce: Trávení a vstřebávání potravy (včetně vody), přepracování nestravitelných zbytků na stolici.

CANALIS ANALIS

Poslední úsek GIT navazující na konečník, čistě průchod stolice mimo tělo.

Embryonální vývoj GIT

Extramurální žlázy


Mimo trávicí trubici se nacházejí:

1. Tři páry slinných žláz GLANDULA PAROTIS, GLANDULA SUBMANDIBULARIS a GLANDULA SUBLINGUALIS
2. Slinivka břišní PANCREAS
3. Játra HEPAR

Mikroflóra


Mikroflóra je důležitou funkční součástí GIT, u masožravců a všežravců její eliminace vede k poruchám funkce GIT, u býložravců se jedná o fatální záležitost.

Střevo je propojeno se žloutkovým váčkem a sahá od hlavy k ocasu. Následně zaniká komunikace s ž.v. a ocasní partie střeva, dále se otevírá CANALIS ANALIS a ISTHMUS FAUCIUM. Játra a pankreas derivují ze stěny střeva.




<http://www.dailysciencedose.com/sweetest-eel-eats-yumums/embryo-18-21/>

Dutina ústní 1



G1014

Dutina ústní 2



G994


- VESTIBULUM ORIS
- CAVUM ORIS PROPRIUM
- LABIUM SUPERIOR ET INFERIOR
- PHLITRUM
- SULCUS MENTOLABIALIS
- ANGULI ORIS
- RIMA ORIS

Svaly vymezující dutinu ústní

Žvýkací svaly


- MUSCULUS MASSETER
- MUSCULUS TEMPORALIS
- MUSCULI PTERYGOIDEI

MUSCULUS MASSETER




G1024

MUSCULUS TEMPORALIS



G382

MUSCULI PTERYGOIDEI




G383

Kožní (mimické) svaly ve stěnách dutiny ústní


Svaly štěrbiny dutiny ústní

Rty a okolí: MUSCULUS ORBICULARIS ORIS, MUSCULUS LEVATOR LABII SUPERIORIS ALEQUE NASI, MUSCULUS LEVATOR ANGULI ORIS, MUSCULI ZYGOMATICI MAIOR ET MINOR a MUSCULUS RISORIUS. Speciálně dolní ret: MUSCULUS DEPRESSOR ANGULI ORIS, MUSCULUS DEPRESSOR LABII INFERIORIS a MUSCULUS MENTALIS



G381

Celkový přehled svalů obličeje




G378

Útvary v tváři

Sval: MUSCULUS BUCCINATOR
Další struktury: CORPUS ADIPOSUM BUCCAE, odpovídající tepny a žíly, nervy, GLANDULA PAROTIS včetně vývodu, spojovací vazivo.
Vzadu v ústech: Patrovými oblouky vymezený prostor, obsahující krční mandle.

Poloha patrových oblouků a krčních mandlí




G1014

Čelistní oblouky

Čelisti

Čelistní oblouky jsou součástí čelistí dolní MANDIBULA, horní MAXILLA a OS INCISIVUM. V nich vklíněné zuby DENTES tvoří ARCUS DENTALIS SUPERIOR ET INFERIOR



G996



G997

Zuby



G1002

Chrup


Rozeznáváme stálý chrup DENTES PERMANENTES a chrup mléčný DENTES DECIDUI, LACTEI. Mléčný chrup obsahuje (1/4) 2 řezáky D. INCISIVI, 1 špičák D. CANINI a dvě stoličky D. MOLARES. Značí se **i, c, m**. Stálý chrup obsahuje 2 řezáky, 1 špičák, 2 zuby třenové D. PREMOLARES a 3 stoličky, značí se **I, C, P, M**.

< □ > < ⌂ > < ⌃ > < ⌁ > < ⌂ > < ⌃ > < ⌁ >

Stavba zuba


Části zuba

Na zubu rozdělujeme korunku CORONA, krček COLLUM a kořen RADIX. Vnitřek zuba, pod tvrdými tkáněmi je vyplňen zubařským dřením PULPA DENTIS, ta využívá kořenů a komunikuje s přívodními kanálky cév a nervů v čelistech.



G1006

Složení zuba




G1007

Význam zuba pro preventologický výzkum

Zub v době svého prořezávání přijímá do dentinu těžké kovy, koncentrace těchto látok v dentinu (zuby fyziologicky vypadlé, vytržené, z mrtvol, vč. archeologických nálezů) odpovídá záteži těmito látkami v době, kdy se zub prořezával.

Připojení zuba k čelisti



< □ > < ⌂ > < ⌃ > < ⌁ > < ⌂ > < ⌃ > < ⌁ >

Spodina dutiny ústní

Celkový pohled

Spodina dutiny ústní obsahuje extraglosální svaly a některé svaly, sloužící k pohybu jazylků. Je v ní zavzata i samostatná kost jazylka OS HYOIDUM (nemající kloubní spojení s jinými kostmi v těle), která je klíčová pro pohyb jazyka i dýchání. Dále jsou zde slinné žlázy podčelistní a podjazyková GLANDULA SUBMANDIBULARIS a GLANDULA SUBLINGUALIS, cévy, nervy, vazivo.


Zub a čelist

Zub zapadá do alveolární jamky FOSSA ALVEOLARIS. Ta kopíruje tvar kořene tak, že mezi jejím vnitřním povrchem a povrchem zuba zůstává štěrbina. Ta je překlenuta svazky kolagenních vláken. Měkká tkáň – dásen PERIODONTIUM obklopuje krček zuba.

< □ > < ⌂ > < ⌃ > < ⌁ > < ⌂ > < ⌃ > < ⌁ >

Svaly pohybující jazylkou


Základ vytváří MUSCULUS MYLOYOIDEUS, jehož vlákna zčásti propojují levou a pravou větev dolní čelisti, zčásti se upínají na jazyklu. MUSCULUS GENIOHYOIDEUS spojuje zadní plochu střední části mandibuly se tělem jazylky. MUSCULUS STYLOHYOIDEUS spojuje PROCESSUS STYLOIDEUS OSSIS TEMPORALIS a horní část těla jazylky. MUSCULUS DIGASTRICUS začíná na INCISURA MASTOIDEA na spodině lební a vede k zadní části jazylky. Zevně je odpovídající oblast krku kryta MUSCULUS PLATYSMA



G385

Extraglosální svaly

MUSCULUS GENIGLOSSUS spojuje střed dolní čelisti se svalstvem jazyka. MUSCULUS HYOGLOSSUS velké rohy jazylkys jazykem. MUSCULUS STYLOGLOSSUS spojuje PROCESSUS STYLOIDEUS s okrajem jazyka až po špičku. MUSCULUS PALATOGLOSSUS je podkladem patrového oblouku před krční mandlí.



G1019


Jazyk LINGUA

Celkový popis


Svalnatý orgán, složený z těla CORPUS LINGuae a kořene RADIX LINGuae, oddělených na horním povrchu SULCUS TERMINALIS. Tělo má hřbet DORSUM LINGuae, spodinu FACIES INFERIOR LINGuae a okraje MARGINES LINGuae.

Papily

Papily se nacházejí na hřbetě jazyka. Rozlišujeme PAPILLAE FILIFORMES, FUNGIFORMES, FOLIATE ET VALLATEAE. Kromě P. FILIFORMES mají na povrchu CALICULI GUSTATORII




G1018, G1015



G1014


Spodina jazyka

Ve střední čáře uzdička FRENULUM, po jejích stranách plicae fimbriatae. Vzadu a po stranách je připojení na EPIGLOTIS (příkopka hrtanová) řásami PLICA GLOSSOPIGLOTTICA MEDIANA a PLICAE GLOSSOPIGLOTTICAE LATERALES.



G1013

< □ > < ⌂ > < ⌃ > < ⌁ > < ⌂ > < ⌁ >



G1020

< □ > < ⌂ > < ⌃ > < ⌁ > < ⌂ > < ⌁ >

Patro PALATUM a krční mandle

Tvrde patro PALATUM DURUM

Má kostěný podklad, vpředu OS INCISIVUM, za ní MAXILA a za horní čelistí OS PALATUM.


Měkké patro PALATUM MOLLE

Skládá se ze slizniční duplikatury, obklopující vazivovou ploténku APONEUROYSIS PALATINA a svaly MUSCULUS PALATOGLOSSUS, MUSCULUS PALATOPHARYNGEUS, MUSCULUS TENSOR VELI PALATINI, MUSCULUS LEVATOR VELI PALATINI a MUSCULUS UVULAE

Krční mandle TONSILLA PALATINA

Nachází se v trojúhelníku mezi ARCUS PALATOGLOSSUS a ARCUS PALATOPHARYNGEUS. Na povrchu jsou FOSSULAE TONSILLARES

< □ > < ⌂ > < ⌃ > < ⌁ > < ⌂ > < ⌁ >



G1014

< □ > < ⌂ > < ⌃ > < ⌁ > < ⌂ > < ⌁ >

Slinné žlázy GLANDULAE SALIVARIAE


Malé slinné žlázy

Nacházejí se ve stěnách dutiny ústní a ve spodině jazyka.

Velké slinné žlázy

- ▶ GLANDULA PAROTIS se nachází před ušním boltcem, částečně se podílí na tváři (zejm. G. P. ACCESSORIA a vývod). Je čistě serózní.
- ▶ GLANDULA SUBMANDIBULARIS se nachází na vnitřní straně a mírně dole u RAMUS MANDIBULAE, je serózně – mucinózní
- ▶ GLANDULA SUBLINGUALIS se nachází ve spodině dutiny ústní, má několik vývodů a je mucinózně – serózní.

< □ > < ⌂ > < ⌃ > < ⌁ > < ⌂ > < ⌁ >



G1024


< □ > < ⌂ > < ⌃ > < ⌁ > < ⌂ > < ⌁ >

Kloub čelistní ARTICULATIO TEMPOROMANDIBULARIS

Popis

- ▶ Unikátní systém dvou spřažených kloubů s oddělenými dutinami
- ▶ Neobvyklá kombinace posunu a otáčení
- ▶ Kloubní plochy: CAPIUTULUM MANDIBULARE a FOSSA MANDIBULARIS + TUBERCULUM ARTICULARE, mezi nimi je disk DISCUS ARTICULARIS
- ▶ Zpevnění kloubního pouzdra: LIGAMENTUM LATERALE z vnější strany a LIGAMENTUM SPHENOMANDIBULARE ze strany vnitřní.
- ▶ Mimo kloubní pouzdro: LIGAMENTUM STYLOMANDIBULARE


< □ > < ⌂ > < ⌃ > < ⌁ > < ⌂ > < ⌁ >



G309

G310

< □ > < ⌂ > < ⌃ > < ⌁ > < ⌂ > < ⌁ >



Děkuji za pozornost

G311