



Mykózy

M. Nečas

I. dermatovenerologická klinika
LF MU ve FN u sv. Anny v Brně



houby-fungi-mycetes

> 100 tis druhů, výskyt ubikvitární

třídy: Zygomycetes (pravé plísně)

Ascomycetes (vřeckovýtrusné)

Basidiomycetes (stopkovýtrusné)

Deuteromycetes (fungi imperfecti)

(patogenní pro člověka)



Fungi imperfecti

- ◆ Dermatofyty (vláknité houby)
- ◆ Kvasinky (rody kvasinka, kryptokok)
- ◆ Dimorfní houby (hluboké mykózy)
- ◆ Oportunní houby (aspergillus aj.)



názvosloví

- ◆ Mykóza = jakákoli plísňová infekce,
vč. kvasinkové, hlubokých mykóz

>

- ◆ Tinea = dermatofytóza

>

- ◆ Trichofycie, epidermofycie, mikrosporie



I. Dermatofytózy

- ◆ Antropofilní: *T.rubrum*, *T. interdigitale*, *T. violaceum*
T.tonsurans, *T. schoenleinii*
Microsporum audouinii
Epidermophyton floccosum
- ◆ Zoofilní : *T. verrucosum*, *mentagrophytes*, *equinum*
Microsporum canis, *persicolor*, *nanum*
- ◆ Geofilní: *T. ajelloi*, *terrestre*
Microsporum gypseum



Tinea pedis

- ◆ etiol: nejč. *Trichophyton rubrum*
T. interdigitale
- ◆ klinické formy: interdigitální
hyperkeratotická
dyshidrotická



forma interdigitální





forma hyperkeratotická a dyshidrotická





Tinea unguium-onychomycosis

◆ etiol.:

T.rubrum

T.interdigitale

*Epidermophyton
floccosum*





Tinea unguium-onychomycosis





Tinea unguium-onychomycosis





Tinea unguium-onychomycosis





Tinea unguium-onychomycosis





Tinea inguinalis

- ◆ Etiol: E. floccosum, T.rubrum, T.interdig.





Tinea inguinalis





Tinea manum

- ◆ etiol: T. rubrum
T.interdigitale
E.floccosum

T.verrucosum

- ◆ formy: hyperkeratotická
dyshidrotická
erythemoskvamozní



Tinea manum-dyshidrotická forma





Tinea manum erythemoskвamozní forma





Tinea corporis

- ◆ *T. verrucosum*
- ◆ *T. mentagrophytes*
- ◆ *M. canis*

- ◆ *T. rubrum*
- ◆ *E. floccosum*





Tinea corporis -superficialis





Tinea corporis - erythemoskvalozní





Tinea corporis erythremovesikulozní





Tinea corporis - profunda


- ◆ *T. verucosum*
- ◆ *T. mentagrophytes*






Tinea faciei

- ◆ M. canis
- ◆ T. verrucosum
- ◆ T. mentagrophytes



Ddg: atop. ekzém
sebor. dermatitida
CDE





Tinea capititis

- ◆ etiol: rody Trichophyton (ecto/endothrix)
Microsporum (ectothrix)
- ◆ klinické formy: superficiální
(nezánětlivá)
profunda (zánětlivá) -
Kerion Celsi
favus




Tinea capitis - superficialis





Tinea capitis - profunda





Tinea capitis - profunda






Tinea capitis - favus

- ◆ etiol: Trichophyton Schoenleinii

- ◆ nejčastější u dětí
- ◆ u nás ojediněle, hl. Středomoří, bl. Východ
- ◆ scutulum-žlutavý miskovitý útvar
- ◆ splet' vláken a spór, páchné myšinou
- ◆ vzácně i na volné kůži či na nehtech



Tinea capitis - favus





Tinea barbae (syccosis barbae parasitaria)

- ◆ Etiol.: T.verrucosum
M.canis
- ◆ Klin: folikulitida
infiltráty, noduly
- ◆ Ddg: syccosis barbae
nonparasitaria
(staphylogenes)






II. Dimorfní plísně

Malassezia furfur: --> pityriasis versicolor

- ◆ dimorfismus malassezií: vytváří hyfy i okrouhlé/oválné kvasinkové formy
- ◆ Lipofilní kvasinky, součást normální rezidentní kožní flóry zejm. v seboroické predilekci
- ◆ Vzhledem k defektu syntézy lipidů jsou odkázány na jejich přísun zvenčí





Malassezie

- ◆ 13 druhů v rámci rodu Malassezia:

M. furfur (dříve *Pityrosporum ovale*, *orbiculare*) - *pityriasis versicolor*

M. pachydermalis, *M. sympodialis* - S.D.

M. sympodialis, *M. obtusa* - A.D.

M. globosa, *restricta*, *sloofiae*....



Pityriasis versicolor





Pityriasis versicolor





III. Kvasinkové infekce

- ◆ kvasinky: množí se pučením
- ◆ Kandidoza: *Candida albicans*
 - C. non albicans:* *glabrata*
 - krusei*
 - kefyr*
 - parapsilosis*
 - tropicalis*
- ◆ Jiné kvasinky: *Cryptococcus neoformans*



1) orální kandidóza - soor





2) intertriginózní







Candidosis interdigitalis erosiva





3) vulvovaginální (MOP VI)

4) balanitis





5) paronychium, onychomykóza





IV. Hluboké mykózy

- ◆ Blastomykóza: *blastomyces dermatitidis*
forma kožní, plicní, disseminovaná
- ◆ Histoplasmóza: *H. capsulatum* (americká f.)
H.duboisii (afričká forma)
osteoartikulární, lymfadenopatie, GIT,
noduly, absecesy, ulcerace
- ◆ Lobomykóza: *Loboa Lobi*
tumoriformní uzly





Hluboké mykózy


- ◆ Kokcidiomykóza
- ◆ Parakokcidiomykóza
- ◆ Aspergilóza
- ◆ Sporotrichóza
- ◆ Chromomykóza
- ◆ Geotrichóza
- ◆ Maduramykóza





Vyšetřování kožních mykóz


- 1) odběr materiálu - po očištění povrchu 70% ethanolem
šupiny z okraje, drť zpod nehtu, vlasy celé
- 2) mikroskopické vyšetření
 - louhový preparát
(10-30% KOH, 30min.-3h)
 - možno obarvit
Parkerovým inkoustem





Vyšetřování kožních mykóz

3) fluorescenční mikroskopie
s blankoforem, váže se na chitin





Vyšetřování kožních mykóz

4) Woodova lampa (vysokotlaká rtuťová výbojka s filtrem z oxidu niklu, který propouští UV A o 320-400 nm)

vyšetření v UV světle → fluorescence

Pityriasis versicolor: zlatožlutě

Mikrosporie: zeleně

Favus: šedobíle



Vyšetřování kožních mykóz

5) kultivace – naočkovat na Sabouraudův agar

odečty: 3-5 dní kvasinky (při 37 st C)
2t rychle rostoucí - *E. floccosum*
3t *T.rubrum*
4t pomalu rostoucí - *T.verucosum*

teprve po 6t lze uzavřít jako negativní



Vyšetřování kožních mykóz

- ◆ hodnocení kolonií podle makromorfologie
- ◆ zhotovení mikrokultury
- ◆ fyziologické testy
 - ureázový test aj.
 - zymogramy,
 - auxanogramy...






T.rubrum






T. mentagrophytes





T.tonsurans





Epidermophyton floccosum






M. audouinii





Microsporum canis






Microsporum Gypseum





Vyšetřování kožních mykóz

- ◆ 5) histologické vyšetření s barvením na plísně PAS (periodic acid Schiff)





Antimykotická terapie

◆ Antimykotika

- 1) polyenová - nejstarší, toxická, fungicidní,
vazba na ergosterol /bb membrány/ -
tvorba pórů, únik K, poškození
- 2) azolová - fungistatické, inhibice cytochromu P450
/blokáda tvorby ergosterolu/ - změna
propustnosti membrány a inhibice replikace
- 3) alylaminová - fungicidní, inhibice skvalenepoxidázy
vede k deficitu ergosterolu a akumulaci
skvalenu
- 4) ostatní - cyklopirox - inhibice transportu klíčových
látek uvnitř plísni



Antimykotická terapie

celková th - indikace

- ◆ systémové mykózy
- ◆ kožní hluboké mykózy
- ◆ chronické rezistentní povrchové m.
- ◆ rozsáhlá onychomykóza
- ◆ hluboká forma tinea capitis



Antimykotická terapie

parenterální:

- 1) Amphotericin B (Amphocil)
systémové a hluboké mykózy
intravenozní apl., závažné NÚ
- 2) Vorikonazol (VFEND)
- 3) Posakonazol (Nofaxil, Posatex)
- 4) Kaspofungin (Candidas)



Antimykotická terapie

perorální:

5) fluconazol vag. kandidózy

6) ketokonazol kandidy, dermatofyta,
malassezie - pityrospora

7) itrakonazol kandidy, dermatofyta.,
malassezie- pityrospora

onychomykoza: pulzní th 3m/5m

8) terbinafin

onychomykoza: 6t/3m



Antimykotická terapie

lokální terapie

ekonazol - Pevaryl crm

ketokonazol - Nizoral crm

clotrimazol - Canesten crm

oxikonazol – Myfungar crm.

terbinafin - Lamisil crm

cyklopiroxolamin – Batrafen crm, sol.