

PF oběhového systému I:

Srdce jako pumpa


Metabolismus myokardu

Koronární řečiště


Ateroskleróza (AS) - rizikové faktory

Etiopatogeneze AS

Ischemie myokardu



Srdce vyžaduje hodně energie (= ATP) k tomu, aby pracovalo jako efektivní pumpa (~7,500 L/den, ~ 40 mil tepů/rok)



$$CO = SV \times f$$

CO – cardiac output


SV – stroke volume

- **kvantitativně**

- srdeční frekvence ~70/min
- SV ~70ml
- $CO = 70 \times 70 = 4,900 \text{ ml/min} \sim 5 \text{ L/min v klidu}$
- $CO \sim 20 - 25 \text{ L/min při zátěži !!!!}$



- **ovlivněno**

- autonomním nervovým systémem
- hormony
- věkem
- pohlavím
- geneticky
- léky
- fitness
- anatomie/velikost srdce




METABOLISMUS MYOKARDU

Metabolizmus myokardu




- srdce je pumpa, která musí kontinuálně zajišťovat 2 procesy:
 - **automacie** (tvorba akčního potenciálu)
 - **kontrakce**
- myokard má tudíž velmi vysoké nároky na dodávku ATP
 - pro kontrakci
 - aktin/myosin – ATP
 - manipulace s Ca^{2+} (Ca^{2+} ATPáza)
 - pro repolarizaci
 - Na⁺/K⁺ ATPáza



- ATP je produkováno oxidací substrátů
 - FFA
 - glukóza (glykogen)
 - ketolátky, AK, laktát
- **myokard tedy vyžaduje značné množství O_2** a musí být tudíž dobře perfundován !!!

Excitation-contraction coupling in a ventricular cardiomyocyte



- Illustrated are the protein complexes, cardiomyocyte architecture and intracellular organelles involved in cardiac excitation-contraction coupling. The initial event in the cardiac cycle is membrane depolarization, which occurs with ion entry through connexin channels from a neighbouring cardiomyocyte (right) followed by opening of voltage-gated Na⁺ channels and Na⁺ entry (top). The resultant rapid depolarization of the membrane inactivates Na⁺ channels and opens both K⁺ channels and Ca²⁺ channels. Entry of Ca²⁺ into the cell triggers the release of Ca²⁺ from the sarcoplasmic reticulum through the ryanodine channel. Ca²⁺ then binds to the troponin complex and activates the contractile apparatus (the sarcomere, bottom). Cellular relaxation occurs on removal of Ca²⁺ from the cytosol by the Ca²⁺-uptake pumps of the sarcoplasmic reticulum and by Na⁺/Ca²⁺ exchange with the extracellular fluid. Intracellular Na⁺ homeostasis is achieved by the Na⁺/K⁺ pump. The molecular components that are required for normal electrophysiological activity, contractile function and cell-cell adhesion (the latter mediated by desmosomes) all need to be positioned correctly within the cell and anchored to each other and the cytoskeleton. Some cardiomyocyte components are not shown (for example, stretch-activated channels, and ankyrins that target channels and other proteins to their correct locations within the cell). Red stars indicate proteins encoded by genes that are mutated in primary arrhythmia syndromes; many of these proteins form part of macromolecular complexes, so mutations in several genes could be responsible for these syndromes. Green stars indicate protein complexes in which mutations in multiple genes cause cardiomyopathies often associated with arrhythmias; these complexes include the sarcomere (in hypertrophic cardiomyopathy), the desmosome (in arrhythmic right ventricular cardiomyopathy), and the cytoskeleton, sarcoglycan complex and mitochondrion (in dilated cardiomyopathy).


Extrakce O₂ různými tkáněmi /orgány

Tkáň / orgán	CaO ₂ - CvO ₂ (vol %)	% extrakce
srdce	10 – 12	65 – 70
kosterní sval (v klidu)	2 – 5	13 – 30
ledvina	2 – 3	13 – 20
střevo	4 – 6	25 – 40
kůže	1 – 2	7 – 13
celý organismus		20 – 30 %


- teoreticky maximální množství kyslíku, které může být v dané tkáni extrahováno (CaO₂ - CvO₂) je asi 20 vol % (při CaO₂ = 200 ml O₂/l)
- ve skutečnosti je však maximální extrakce kyslíků asi 15 - 16 vol % vzhledem ke povaze disociační křivky hemoglobinu
- z tohoto pohledu již zdravé srdce extrahuje už v klidu dvě třetiny veškerého fyziologicky dostupného kyslíku (10 - 12%)
- při zátěži je nutno zvýšit průtok krve myokardem (**koronární rezerva**), zvýšení extrakce již není možné

Koronární průtok – kvantitativní aspekty


- množství kyslíku přiváděné koronární krví (VO_2):
 - ~45 ml O_2/min
 - $\text{VO}_2 = \text{Qm} \times \text{CaO}_2$
 - průtok myokardem (Qm) = 210 – 240 ml/min v klidu
 - ale 1000 – 1200 ml/min během zátěže
 - koncentrace kyslíku v arteriální krvi (CaO_2) = 200 ml O_2/l
 - pro $\text{PaO}_2 = 13.3 \text{ kPa}$ a $\text{c[Hb]} = 150 \text{ g/l}$
- **spotřeba v klidovém stavu:** ~30 ml O_2/min , tj. **~65 - 70% dostupného O_2**
 - velmi vysoká extrakce O_2 ($\text{A} - \text{VO}_2$ differenze) ve srovnání s jinými orgány
- při takovéto extrakci je jediným mechanizmem, který dovede zvýšit přívod kyslíku do myokardu **zvýšení krevního přítoku**
 - zvýšení extrakce z hemoglobinu acidózou, teplotou aj. (tj. posun doprav v disociační křivce) zde již není účinné
 - vzhledem k tomu, že aorta má konstantní tlak, tohoto lze docílit jedině vazodilatací v koronárním řečišti = **koronární rezerva**



Krevní zásobení srdce




- dodávka O₂ je zajišťována cévním zásobením – **koronárni (věnčité) arterie** – větve vzestupné aorty
 - (1) levá koronárni arterie
 - (a) levá přední sestupná větev
 - přední část LK a PK a přední část septa
 - (b) ramus circumflexus
 - levá a zadní část LK
 - (2) pravá koronárni arterie
 - zásobuje PK




Koronární průtok – časová a prostorová dynamika

- průtok je **omezen během systoly** protože:
 - (1) problematický odstup koronárních tepen těsně za chlopní
 - dochází k dočasně blokádě ústí koronárních tepen otevřenou aortální chlopní
 - (2) rychlý průtok během systoly
 - "vysává" krev do hl. toku (tzv. "Venturiho efekt")
 - (3) komprese cév během systolické kontrakce
- většina průtoku se tudíž realizuje během **diastoly**
 - **tachykardie** zkracuje diastolu a tím průtok
- navíc, **subendokard** je mnohem více **náchylnější k ischemii než epikard** protože:
 - koronární arterie procházejí myokardem ve směru od povrchu (epikardu) do nitra (k endokardu)
 - pokles diametru a tenze kyslíku
 - ↓ perfuzního tlaku patologicky (např. AS stenóza epikardiální arterie aterosklerózou)
 - systolická komprese rovněž není univerzálně distribuována
 - větší v subendokardu
 - ↑ intrakardiální tlak patologicky např. při kongesci či regurgitaci (např. srdeční selhání)
 - nižší denzita kapilární sítě v subendokardu ve srovnání s epikardem





Autoregulace koronárního průtoku – reflektuje nároky na O₂


- autoregulace mezi 60 - 200 mmHg perfuzního tlaku (tj. systémového arteriálního tlaku) pomáhá udržet normální koronární průtok nezávisle na změnách aortálního tlaku
 - rezistenční koronární arterie** (100-400 µm diametr) – **hemodynamická regulace**
 - shear-stress (flow-induced) zprostředkovaná intraluminální kontrola – dilatace pomocí endoteliálního NO
 - myogenní regulace jako odpověď na transmurální tlak v cévách pomocí stretch-activated L-type Ca channels (Ca²⁺ influx)
 - arterioly - metabolická regulace**
 - adenosin** jako nejdůležitější mediátor aktivní hyperemie
 - metabolický „coupler“ spotřeby kyslíku a koronárního průtoku = tvořen z AMP pomocí 5'-nukleotidasy
 - AMP je tvořen hydrolýzou intracelulárního ATP a ADP




- nervová regulace** – zanedbatelná v klidu
 - během sympatické aktivace (zejm. **β-adrenergní**) dochází k vazodilataci
 - a dalším efektům (inotropie, chronotropie apod.)
 - α-1 vazokonstriční efekt na koronární arterie je nevýznamný resp. překonán
 - + Ach indukovaná vazodilatace (ačkoliv role parasympatiku je obecně méně jasná)



Control of Coronary Microvascular Tone





Shrnutí kontrolních mechanismů koronární rezistence



Faktory ovlivňující spotřebu O₂ myokardem


- (1) srdeční frekvence
 - více srdečních cyklů = více energie (ATP)
 - opět sympathicus, zvláště dlouhodobá aktivace
- (2) kontraktilita
 - efekt sympatiku mění (1) i (2) - pozitivně chrono- a inotropní - a tím zvyšuje spotřebu O₂ (MVO₂)
 - nevýhodné zejména u dlouhodobé hyperaktivity
- (3) napětí ve stěně →
 - to je důvodem MVO₂ roste při tlakovém nebo objemovém přetížení
 - ale rozdílně !! (LaPlaceův zák.)
- (4) objem svaloviny myokardu
 - proto MVO₂ roste u srdeční hypertrofie, zvláště maladaptivní (= bez adekvátní angiogeneze)
- hrubým odhadem energetických nároků srdce je **tension - time index (TTI)**
 - STK x frekvence






ENDOTELIÁLNÍ DYSFUNKCE JAKO INICIÁLNÍ STADIUM AS

Morfologie cév vzhledem k funkci




Funkce endotelových bb.

- Endotel je vystaven 2 typům mechanického zatížení (deformaci)
 - cirkumferenční stress (rozpínání) – generuje napětí ve stěně (La Place)
 - frikční – shear stress – mění transkripcí genů a garantuje fyziologické vlastnosti endotelu
- (1) **vazodilatace**
 - hl. sval. bb. (SMC) medie cév – zvláště arteriol – pracují v těsném spojení s endoteliem
 - účinkem hormonů, neurotransmitterů (**ACh**) a shear stresu dochází k reakcím ovlivňujícím SMC prostřednictvím druhých poslů
 - fosfolipázy A2 (**PLA2**), která aktivuje cyklooxygenázu (**COX**) a prostacyclin syntázu (PCS) k produkci prostaglandinů (**PGI₂**). Ty snadno difundují k SMC
 - syntáza oxidu dusnatého (L-argináza, **NOS**) produkuje vysoko difuzibilní plynný "neurotransmitter" **NO**, který účinkuje na SMC skrze G-proteinovou signalizaci a přímo přes iontové kanály
- (2) **antiadhezivní / protizánětlivý** účinek fyziologický endotel netvoří VCAM, ICAM, selektiny, ...
- (3) **antitrombotický, antiagregační a fibrinolytický** účinek
 - heparansulfát
 - thrombomodulin
 - tPA




NO zprostředkovaná vazodilatace

- Biosynthesis of the key endogenous vasodilator NO is principally performed by the calcium-dependent endothelial isoform of eNOS. This is triggered by the binding of agonists or by shear stress (1) and facilitated by a variety of cofactors and the molecular chaperone HSP90. The amino acid L-Arg is converted by eNOS into NO (2), with L-Cit as a byproduct. NO diffuses into adjacent smooth muscle cells (3) where it activates its effector enzyme, GC. GC (4) converts GTP into the second messenger cGMP, which activates PKG (5), leading to modulation of myosin light chain kinase and smooth muscle relaxation. PKG also modulates the activity of potassium channels (IK; 6), thereby increasing cell membrane hyperpolarization and causing relaxation. As shown, NO can also modulate potassium channels in a direct, cGMP-independent manner (Bolotina et al., 1994). NO, nitric oxide; eNOS, nitric oxide synthase; HSP90, heat-shock protein 90; L-Arg, L-arginine; L-Cit, L-citrulline; GC, guanylate cyclase; GTP, guanosine triphosphate; cGMP, cyclic guanosine monophosphate; PKG, protein kinase G.




Endotelová (dys)funkce

- endotel má zásadní regulační vliv na funkci a morfologii cévy
- může být porušen mnoha různými mechanickými, chemickými i biologickými inzulty, zejm. v důsledku:
 - zvýšeného tlaku na cévní stěnu (hypertenze)
 - nepřiměřený mechanický shear stress (turbulentní proudění - bifurkace)
 - biochemických abnormalit
 - oxidativně a glukózou modifikované proteiny
 - např. LDL
 - zvýš. homocystein
 - oxidačního stresu
 - volné kyslíkové radikály tvořené při kouření či zánětu
 - zánětových markerů
 - např. CRP
 - některých infekcí
 - Chlamydia pneumoniae
 - Helicobactor pylori
- endotelová dysfunkce je významný a iniciální pro-aterogenní faktor zvyšující
 - konstrikční potenciál
 - adhezivitu a permeabilitu
 - protrombotický potenciál




Endotel - shrnutí

Funkční	Dysfunkční
konstantní vazodilatace v důsledku mechanických stimulů (shear stress) a mediátorů (Ach, bradykinin) zprostředkovaná NO, PGI ₂ (popř. adenosinem)	větší citlivost k syst. a parakrinním vazokonstričním mediátorům (adrenalin, noradrenalin, AT II, serotonin) a aktivní tvorba vazokonstriktorů (ET-1)
antiadhezivní / protizánětlivý stav (NO, PGI ₂), inhibice exprese adhezivních proteinů	exprese adhezivních molekul (ICAM, VCAM, selektiny), produkce cytokinů (např. MCP-1) vedoucí k atrakci a migraci prozánětlivých buněk do subendoteliálního prostoru
stálý místní antikoagulační, (heparansulfát, trombomodulin) antiagregační resp. trombolytický stav (tPA)	protrombotický fenotyp (vWf, TF, PAI-1)





KORONÁRNÍ ATEROSKLERÓZA

Tepny postižené aterosklerózou (AS)



AS – základní fakta

- AS je nejčastějším typem arteriosklerózy
 - tj. jakékoliv snížení elasticity cévy, např. AS, kalcifikace medie aj.
- AS představuje degenerativní proces ve stěně cév (na začátku zejm. intima) **na podkladě chronického zánětu**
- je důsledkem **multifaktoriálního** působení endogenních faktorů (velmi často s určitou genetickou komponentou) a faktorů zevního prostředí
- teoreticky může postihnout jakoukoliv cévu, prakticky hlavně **arterie** (= arterioskleróza)
 - což podtrhuje velkou roli **krevního tlaku**
 - z arterií ale zase ne všechny, ale zejména ty **v predilekčních lokalizacích** (tj. bifurkace a nelaminární proudění)
 - např. koronární řečiště, bifurkace karotid, mozková cirkulace, odstup a. renalis, bifurkace tepen DKK
- v patogenezi se uplatňují zejm.
 - (1) modifikované lipoproteiny (LDL)
 - (2) makrofágy odvozené z monocytů
 - (3) normální bb. stěny cév
- morfologicky se rozlišuje několik **stádií** (resp. mikroskopických nálezů při rozvoji AS procesu):
 - (1) tukový proužek
 - (2) fibrózní plát
 - (3) komplikovaný plát



Rizikové faktory AS

- identifikace rizikových faktorů AS pomocí **prospektivních** studií


- Framinghamská studie** – identifikace hl. KV rizikových faktorů: ↑ TK, ↑ cholesterol, ↑ triglyceridy, ↓ HDL, kouření, obezita, diabetes, fyzická inaktivita, ↑ věk, pohlaví (mužské) a psychosociální faktory

- originální cohorta (od r. 1948)
 - » 5,209 osob (32 – 60 let) z Framingham, Massachusetts, USA
 - » detailní vyšetření každé 2 roky
- II. cohorta (od r. 1971)
 - » 5,124 dospělých potomků
- III. cohorta
 - » 3,500 dětí (vnuků původních participantů)

- pozdní klin. manifestace dlouhodobě nekompenzované hypertenze
 - IM, mozková mrtvice (→ ateroskleróza)
 - srdeční selhání (→ levostranná srd. hypertrofie)
 - selhání ledvin (→ hyperfiltrace, nefroskleróza)
 - retinopatie


Rizika AS	
Různě významný genetický efekt	ne-genetické
Hlavní	
dyslipidemie (↑ LDL a VLDL, ↓ HDL)	metabolický syndrom potencovaný obezitou
hypertenze	
diabetes mellitus	
mužské pohlaví	
Vedlejší (cca 20% KV stavů u lidé bez hlavních rizikových faktorů)	
↑ plasma homocystein	
↑ hemostatické faktory (fibrinogen, PAI, ..)	
↑ Lipoprotein (a) – Lp(a)	
chronický zánět (hsCRP jako surogátní marker)	
Environmentální	
kouření (major risk!)	
fyzická inaktivita	
dieta	
infekce ?	

Metabolismus lipoproteinů / transport lipidů





(1) iniciace AS - tvorba tuk. proužku

- LDL je oxidativně (a jinak) **modifikován** (v cirkulaci i v subendoteliálním prostoru) na zpočátku minimálně modifikované LDL (mmLDL) a poté extenzivně oxidované LDL (oxLDL)
- mmLDL a oxLDL působí cytotoxicky a prozánětlivě a zvyšují expresi adhezivních molekul na endotelu
 - VCAM, ICAM, selektiny
 - omezené spektrum cytokinů? – MCP-1 (monocyte chemotactic protein) – exprimované endotelovými bb.
- **monocyty** (a T lymf) adherují k endotel. bb. a migrují do subendoteliálního prostoru, monocyty zde **diferencují na makrofágy**
 - neutrofily, které jsou normálně hlavním typem bb. v zánětl. lézích, zde chybí, což není doposud úplně vysvětleno
- makrofágy pohlcují oxLDL prostřednictvím tzv. scavengerových receptorů (SR-A a CD36) a vytváří tak **"pěnové" bb.**
 - makroskopicky patrné jako ploché žlutavé tečky či proužky v subendoteliu, odtud **"tukové proužky"**
- volný cholesterol z oxLDL v makrofázích je znova esterifikován prostřednictvím ACAT-1 (acyl-CoA cholesterol acyltransferázy) a skladován spolu s lipidy, naopak, může být rovněž znova převeden do solubilní formy pomocí hormon senzitivní lipázy, zabudován do membrány a exportován z buňky (pomocí **transportéru ABCA1** a HDL)
 - reverzní transport CH prostřednictvím HDL je důležitý anti-aterogenní mechanizmus
 - podrobněji viz Poruchy metabolizmu lipidů !!!




Role makrofágů v iniciaci AS

- scavengerové receptory makrofágů pro modifikované makromolekuly hrají fyziologicky důležitou roli při obraně buněk proti jejich cytotoxickému působení, ale zároveň to může být patogenní mechanizmus za podmínek:
 - vysoké hladiny CH
 - vysoké intenzity jeho modifikace
 - oxidace, glykace
 - poruše reverzního transportu CH
 - např. Tangierská choroba (mutace ABCA1)
 - abnormální stimulace monocytů
- scavengerové receptory jsou součástí mechanizmů nespecifické imunity - přirozené protilátky a některé receptory – které se vyselektovaly v průběhu evoluce na základě četnosti výskytu antigenů
 - (1) přirozené protilátky (nejč. IgM) proti některým epitopům
 - nejč. bakteriálních, tzv. pathogen- associated molecular patterns [PAMPs]
 - (2) receptory, které se podle své funkce nazývají pattern-recognition receptors (PPRs)
 - např. SR-A, CD36, TLR (Toll-like receptor) aj.
- oxidované molekuly (t.j. konkrétní epitopy) mají velmi často charakter PAMP**




(2) progrese AS – tvorba plátu

- imunologická interakce mezi makrofágy a T lymf. (Th1 a Th2 subpopulace) udržuje lokálně chron. zánět
 - produkce jak proaterogenních Th1 cytokinů (MCP-1, IL-6, TNF- α , ...)
 - ale i antiaterogenních Th2 (IL-4)
 - na konkrétním posunu rovnováhy se podílí mnohé faktory
- makrofágy jako antigen prezentující bb. rovněž napomáhají aktivaci B lymf. a produkci autoprotilátek např. proti oxLDL → imunokomplexy → zánět
- cytokiny stimulují další bb., zejm. **hladké svalové buňky medie k migraci do intimy**, proliferaci (ztluštění stěny) a sekreci proteinů extracelulární matrix (kolagen) → vytvoření **fibrózního plátu**
- patologická kalcifikace ateroskleroticky změněné stěny cév není pasivní důsledek ukládání kalcia, ale je důsledkem změny genové exprese makrofágů (osteopontin)




Makrofágy u pokročilé AS – role při její progresi

- M v časné lézi
 - většina Ch ve formě **esterů** (enzym ACAT)
 - netrombogenní
 - HDL reverzní transport funguje
- M v pokročilé lézi
 - kumulace **volného Ch** (FCH)
 - vysoko trombogenní
 - FCH v membráně endoplasmatického retikula mění jeho permeabilitu a konc. Ca uvnitř → stres ER → **apoptóza makrofágů** → více volného extracelulárního Ch → zvýšení trombogenicity a prozánětlivosti atheromu
 - produkce MMPs



(3) pokročilý plát a komplikace


- plak může růst pozvolna a postupně obturovat lumen a nebo se stane ak. nestabilní trombotizací a ak. obstrukcí (tzv. **"komplikovaný plát"**)
- zánikem makrofágů a hlad. sval. bb. (nekróza a cytokiny indukovaná apoptóza) se vytváří nekrotické jádro plaku s akumulovaným cholesterolom
- stimulované a hypoxické makrofágy produkují proteolytické enzymy degradující složky extracelulární matrix (MMPs, matrix metaloproteinázy,), které zodpovídají za oslabování fibrózního plaku
- **ruptura plaku** (nejč. excentrického a bohatého na cholesterol, ke které dojde v místě přechodu v normální stěny cévy), exponuje akumulované lipidy a tkáňový faktor destičkám a koagulačním faktorům a vede k **trombóze**
- velmi často se výše uvedené děje délečoběji, opakují se cykly ruptury, mikrotrombotizace, násl. fibrinolýzy a hojení → **"nestabilní plát"**




Osud pokročilého AS plátu a přísl. klinický korelát

- Možné patofyziologické scénáře

- (1) progresivní růst plátu – viz následující obrázek
 - např. **stabilní angina pectoris**
- (2) povrchová eroze/exulcerace plátu
 - v důsledku povrchové **denudace nebo poškození (apoptóza) endotelu** překrývajícího plát je odkryto subendotelové pojivo, dochází k adhezi destiček a vzniku nástenného trombu
 - nástenný trombus se buď hojí a integruje se do plátu – další redukce lumen a progrese – např. **nestabilní angina pectoris** – anebo dojde k progresi trombotizace, okluzi cévy a následné nekróze – **infarkt myokardu**
 - ukazuje se (studie), že eroze u plátů jsou asi běžné při pokročilé AS a většina se hojí a resorbuje
- (3) ruptura plátu, trombotizace a okluze cévy
 - pokud dojde k natřzení či prasknutí plátu, krev se dostane do kontaktu s trombogenním volným cholesterolom a tkáňovým faktorem
 - trombus vznikající v ruptuře plátu zvětšuje jeho volum a uzavírá lumen cévy
 - klinicky může vést k **akutnímu koronárnímu syndromu** nebo **náhlé smrti**
 - nemusí se jednat o hemodynamicky významnou stenózu
 - zásadní je složení plátu ne jeho velikost!
 - k ruptuře může dojít na vrcholu plaku nebo v „rameni“
 - nerovnováha mechanických sil
 - nicméně i zde je asi častější situace, že dojde k hojení a resorpci bez klinické symptomatologie





(ad 1) Vztah mezi velikostí stenózy a hemodynamickou významností



- asymptomatické pokud ne
 $>50\%$ redukce průměru (=
 $>75\%$ redukce příčně
měřené plochy)
- teprve $>50\%$ a větší
redukce průměru lumen
způsobuje klinické obtíže,
typicky námahovou angínu
– **stabilní a. pectoris**


(ad 2) Mechanisms of AS plaque healing




pro zájemce: N Engl J Med 2020; 383:846-857

(ad 3) Vulnerabilní/nestabilní plát („thin cap fibroatheroma“)

- typické znaky
 - tenká fibrózní vrstva
 - značná zánětová infiltrace (makrofágy a T lymfocyty)
 - velké lipidové jádro (aterom)
 - malé množství SMCs
 - hemoragie do plátu (z lumen nebo z vasa vasorum)
- zánět je nejdůležitějším lokálním faktorem destabilizace plátu a okluze cévy
 - tvorba pro-zánětových cytokinů a matrix metalloproteináz přispívá k degradaci kolagenu a dalších ECM proteinů
 - apoptóza a kolagen syntetizujících SMCs
 - produkce tkáňového faktoru zánětovými bb. v plátu
- ale zásadní z hlediska rizika rozvoje akutních koronárních syndromů a mortality se zdá být ne jednotlivý plát, ale celkový rozsah CHD (počet stenóz a jejich metabolická a imunitní aktivita) a systémové parametry (zánět, prokoagulační aktivita, stres, spánek, pohyb, dieta, léky, akutní infekce, ...)




Shift from „vulnerable plaque“ to „vulnerable patient concept“





ISCHEMIE MYOKARDU JAKO DŮSLEDEK KORONÁRNÍ AS



Reakce buněk na hypoxii – HIF-1 koordinovaný program



- hypoxie je běžný fyziologický a patofyziologický fenomén/situace
 - prenatálně ovlivňuje morfogenezi a vývoj
 - postnatálně důležitá v tkáňové homeostáze, růstu a diferenciaci, hojení ran
 - v patologických situacích při omezení průtoku, dodávky kyslíku či expanzi tkáně
 - např. ischemie, anemie, růst nádoru,
 - odpověď tkáně/buňky na hypoxii je řízena HIF-1 transkripčním programem


Koronární kolaterály & angiogeneze

- kolaterály = interarteriální anastomózy
- výšení krevního zásobení ischemického myokardu může být dosaženo
 - (1) využitím a remodelace stávajících kolaterál (= **arteriogeneze**)
 - (2) de novo **angiogenezí**
 - angiogeneze = pučení kapilár, které vede k vytvoření nových cév, tj. odboček stávající vaskulatury
 - v důsledku hypoxie
 - cesta HIF-1/VEGF
- kolaterální řečiště vykazuje značnou interindividuální variabilitu
 - zodpovídá za rozdílnou citlivost ke snížení koronární rezervy různá denzita preexistujících kolaterál u jednotl. jedinců v populaci ?
 - resp. rozdílná citlivost a odpověď na hypoxii?
- doprovodná angiogeneze bohužel selhává při patol. hypertrofii myokardu
 - resp. není úměrná nárůstu objemu kardiomyocytů a dalších struktur



rozdílná velikost infarktového ložiska při stejném stupni okluze


Nitráty napravují vaskulární „steal“ dialatací kolaterál



© Elsevier Ltd. Rang et al: Pharmacology 5E www.studentconsult.com

Metabolické a funkční konsekvence myokard. ischemie

- metabolické změny
 - \downarrow perfuze $\rightarrow O_2 \rightarrow \downarrow$ aerobní metabolismus \rightarrow ATP deplete $\rightarrow \downarrow$ kreatinfosfát \rightarrow akumulace laktátu a dalších katabolitů \rightarrow metabolická acidóza \rightarrow eflux draslíku z bb. \rightarrow ztráta membránové integrity \rightarrow zánik kardiomyocytů (nekroza a apoptóza)
 - akumulace K⁺, laktátu, serotoninu a ADP způsobuje **ischemickou bolest** (angina)
- funkční změny
 - systolická dysfunkce** = \downarrow kontraktility
 - \downarrow EF (ejekční frakce), \downarrow SV (stroke volume, tepový objem)
 - diastolická dysfunkce** = \downarrow diastolické relaxace
 - \uparrow EDP (end-diastolic pressure)
 - v obou případech je důsledkem srdeční selhání, definované jako \downarrow CO (cardiac output, **srdeční výdej**)
 - v nejtěžší možné formě = kardiogenní šok
- srdce musí zapojit kompenzační mechanizmy, které vždy znamenají zvýšení nároků na dostupnost kyslíku
 - nutno zapojit mediátory zvyšující koronární průtok
- ale pozor! při autoregulačních a systémových reakcích vedoucích k vazodilataci je odezva vždy vydatnější ve zdravé/intaktní části koronárního řečiště - **vaskulární "steal"**
 - stenotické arterie nereagují na stimulaci a zdravé/reactivní tedy "kradou" průtok již tak ischemickým oblastem



Zvířecí modely AS

- ve zvířecí říši téměř neexistuje ekvivalent humánní AS
 - hlodavci sice nejvíce studovaný model ale ne úplně podobný člověku
 - u větších zvířat (králík, prase) je vyvolání AS snazší
- exp. model AS
 - indukovaná
 - dietně + denudace endotelu + hypertenze
 - spontánní (knock-out)
 - ApoE -/- myš
 - LDL-R -/- myš
 - restenóza po angioplastice
- exp. model spontánního IM
 - indukovaný
 - ligace koronární tepny
 - spontánní
 - komb. apoE/LDL-R -/-
+ mentální stres + hypoxie

