



N. MEDIANUS C₆-Th₁ (C₅)

- porucha při lézi n. medianus může být z části kompenzována svalstvem inervovaným n. radialis a n. ulnaris.



N. medianus.

- 1 - m. pronator teres,
- 2 - m. flexor digitorum superficialis,
- 3 - m. flexor pollicis longus,
- 4 - m. flexor digitorum profundus,
- 5 - m. pronator quadratus,
- 6 - m. abductor pollicis brevis,
- 7 - m. opponens pollicis,
- 8 - m. flexor pollicis brevis,
- 9 - 1. a 2. m. lumbricalis,
- 10 - m. flexor carpi radialis,
- 11 - m. palmaris longus,
- 12 - m. flexor digitorum profundus



Kožní distribuce n. medianus.

Klinické příznaky a zkoušky při lézi n. medianus:

1. Postavení ruky:
Palec je přitahován neporušeným dlouhým extenzorem a adduktorem do jedné řady s ostatními prsty. Mluvíme pak o opičí ruce.
2. Zkouška izolované flexe posledního článku ukazováku
3. Zkouška mlýnku palců
4. Zkouška kružítko
5. Zkouška sepětí rukou s flektovanými prsty
6. Zkouška opozice a abdukce palce
7. Zkouška uchopení láhve
8. Zkouška pěsti
9. Při postižení n. medianus nad loktem nesvede nemocný navíc ještě pronaci.

Citlivost je postižena v oblasti thenaru, střední části dlaně, 2., 3. a částečně 4. prstu, a na distální polovině dorza 2. a 3. prstu.