



Klidové napětí a akční potenciál



Klidové napětí:

- na membráně buňky za klidových podmínek
- uvnitř buňky je záporný náboj, na povrchu buňky je kladný náboj
- buňka je nepropustná pro Na^+
- uvnitř buňky je větší koncentrace K^+ , mimo buňku je větší koncentrace Na^+
- koncentrace K^+ uvnitř je menší než koncentrace Na^+ vně
 - záporný náboj uvnitř buňky

Klidové napětí a akční potenciál



Akční potenciál (AP)

- Pokud je překročena prahová hodnota napětí (-55 mV), vzniká na membráně akční potenciál
- **Fáze depolarizace**
 - otevírají se kanály pro Na^+
 - Na^+ vstupuje do buňky
- Zákon vše nebo nic – nepřekročí-li se práh, žádný AP, překročí-li se práh – vzniká AP
- **Fáze repolarizace**
 - kanály pro Na^+ jsou znovu zavřeny
 - K^+ vstupuje do buňky
 - Na^+ je pumpován ven
 - Napětí se dostává zpět ke klidovým hodnotám

Nervový systém - hlavní funkce

- Přijímání, zpracování a ukládání informací, které přicházejí z vnitřního, ale i vnějšího prostředí
- Tyto informace využije pro řízení (regulaci) a vzájemnou koordinaci činnosti jednotlivých orgánových systémů
- Takto jsou zabezpečeny:
 - funkční jednota živého organismu jako celku
 - schopnost přizpůsobovat se změnám vnějšího prostředí

Stavba nervové soustavy

•Neurony

–Příjem, integrace a šíření informace

•Neuroglie (astrocyty, oligodendrocyty, mikroglie, ependymální buňky)


–Podpůrná činnost

•Počet neuronů cca. 100 miliard


•Poměr neuron/glie

–1/10 - 50 (Principles of Neural Science, 4th ed., 2012)



–1/1 (Nolte s Human Brain, 7th ed., 2015)



Části neuronu







Dendritické trny




Strukturální klasifikace neuronů:

- A. multipolární neurony
- B. bipolární neurony
- C. pseudounipolární neurony
- D. unipolární neurony





Neuron



Cytoskelet

- dynamický systém proteinových vláken a tubulů, jejichž hlavní funkcí je transport látek a buněčných komponent a opora buňky.

1. neurotubuly - průměr cca 20-25 nm
2. neurofilamenta - 10 nm
3. aktinová mikrofilamenta - 7 nm

Axoplazmatický transport

- distribuce látek a organel
axoplazmou od a k tělu neuronu

axoplazma = cytoplazma axonu

Axoplazmatický transport

- materiál pro růst a obnovu struktur
- molekuly pro tvorbu a udržení synapsí
- informace o extraneuronálním mikroprostředí
- nemění se při vedení impulzů

Axoplazmatický transport

- Podle rychlosti
 - rychlý >100 mm/den
 - pomalý < 10 mm/den

- Podle směru
 - anterográdní pohyb od perikarya k terminálám
rychlý i pomalý
 - retrográdní pohyb směrem k perikaryu
rychlý


Anterográdní transport

- **Rychlý** (300-400 mm/den)
 - Synaptické váčky, transmitery, mitochondrie, lipidy a proteiny plazmatické membrány
- **Pomalý** (5-10 mm/den)
 - elementy cytoskeletu, proteiny a jiné látky k obnově a udržení axoplazmy, enzymy


Retrográdní transport

- Rychlý (150-200 mm/den)
 - transport poškozených a použitých organel a membránových struktur při jejich recyklaci (receptory ...)
 - transport trofických a jiných signálních molekul
 - částice některých virů (poliomyelitis, herpes, rabies) a neurotoxiny (tetanus) vstupují do terminál endocytózou a transneuronálně dosahují CNS

Rychlý axonální transport



Pomalý axonální transport




dynamine

Gliové bb. PNS

➤ Schwannovy bb.

- izolují axony od mimobuněčné tekutiny
- zrychlují vedení nervových impulzů
- účastní se vývoje a regenerace nervu
- poskytují metabolickou podporu axonům
- podílí se na tvorbě ECM
- modulují aktivitu nervosvalové ploténky
- jsou schopny fagocytózy a prezentace antigenů T-lymfocytům

Tvorba myelinu v PNS



mesaxon

Gliové bb. CNS

- tvoří mechanickou a metabolickou podporu neuronů
- jsou izolátory neuronů
- podílejí se na tvorbě hematoencefalické bariéry (HEB)
- fagocytují rozpadlé zbytky tkáně a antigeny
- přispívají k modulaci synaptického přenosu
- vytvářejí funkční synapse s neurony
- jsou zapojeny do sekrece cerebrospinální tekutiny (CST)


Gliové bb. CNS


- **Astrocyty** – podílejí se na HEB, modulují synaptickou aktivitu
- **Ependymocyty** – vystylají komorový systém CNS a podílejí se na sekreci CST
- **Oligodendrocyty** – myelinizující, perineurální
- **Microglie** – fagocytují rozpadlé zbytky tkání nebo cizorodé částice

Hematoencefalická bariéra

Bariéra mezi kapilárou a mozkem – velice těsné spojení mezi buňkami
Brání průchodu většině látek – ochrana mozku

- Pouze O_2 , CO_2 , H_2O můžou procházet volně
- Glukóza a aminokyseliny jsou převáděné speciálními přenašeči
- Většina ostatních látek neprochází
- Spojení mezi kapilárou a neuronem je zprostředkované gliovými buňkami (astrocyty – typ gliové buňky)





Díky hematoencefalické bariéře a podpůrné činnosti neuroglie je udržována homeostáza ve velmi úzkém rozmezí

Vysoký stupeň organizace CNS a regulace umožňuje žít neuronům po celý život jedince!


Regulační povaha nervového systému

Regulace - ve fyziologii rozeznáváme
základní 2 typy regulací

– *Nervová*


– *Humorální (hormonální)*

Centrální nervový systém je součástí nervové regulace
a významně ovlivňuje i regulaci hormonální



<http://biology.about.com/od/anatomy/p/Hypothalamus.htm>

Stavba nervové soustavy



AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM

Autonomní nervový systém je součástí periferního nervového systému, jehož úlohou je udržovat optimální vnitřní podmínky organismu (homeostázu).

- Sympatický
 - Parasympatický
 - Enterický
- } nervový systém

Efektory tohoto systému jsou hladké svaly, srdeční sval, žlázy

Eferentní část reflexního oblouky při vegetativních reflexech se rozděluje na část pregangliovou a postgangliovou

Autonomní NS versus SOMATICKÝ NS

SOMATIC MOTOR PATHWAY




AUTONOMIC PATHWAYS


(a) Parasympathetic Pathway



(b) Sympathetic Pathway




(c) Adrenal Sympathetic Pathway



AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

FIGHT OR FLIGHT

REST OR DIGEST



Sympathetic nervous system


Fight or flight response

Energy/store consumption

Preganglionic neuron
– Spinal cord
-Thoraco - lumbar system

Ganglia *Paravertebral*
-Truncus sympathicus
- Majority
Prevertebral
-Plexus aorticus

Mostly diffuse effect



Parasympathetic nervous system

Rest and digest response


Energy conservation/en. store production

Preganglionic neuron
– Brain stem and spinal cord
– cranio- sacral system

Ganglia
Close to target organs or intramurally

Mostly local effect


Sympathetic nervous system



Parasympathetic nervous system

	System/function	Parasympathetic	Sympathetic	
Fight or flight	Cardiovascular	Decreased cardiac output and heart rate	Increased contraction and heart rate; increased cardiac output	digestive
Energy consumption	Pulmonary	Bronchial constriction	Bronchial dilatation	energy
	Musculoskeletal	Muscular relaxation	Muscular contraction	relaxation
	Pupillary	Constriction	Dilatation	ion
Preganglionic neurons - Spinal	Urinary	Increased urinary output; sphincter relaxation	Decreased urinary output; sphincter contraction	ion
-Thoracic system	Gastrointestinal	Increased motility of stomach and gastrointestinal tract; increased secretions	Decreased motility of stomach and gastrointestinal tract; decreased secretions	and spinal
Ganglia	Glycogen to glucose conversion	No involvement	Increased	system
Paravertebral - Thoracic	Adrenal gland	No involvement	Release epinephrine and norepinephrine	target
Prevertebral - Thoracic				or
-Plexus aorticus				ally

Mostly diffuse effect



Mostly local effect

AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

Preganglionová vlákna



- Sympatikus, Parasympatikus

Nikotinový receptor

- Nervový (N_N) a svalový (N_M) typ


–

ACh



Autonomní NS versus SOMATICKÝ NS

SOMATIC MOTOR PATHWAY




AUTONOMIC PATHWAYS


(a) Parasympathetic Pathway




(b) Sympathetic Pathway




(c) Adrenal Sympathetic Pathway



AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM



ACh





Postgangliová vlákna

- Parasympatikus

Muskarinový receptor

- Spřažený s G-proteinem
- Excitační (M₁, M₃, M₅)
- Inhibiční (M₂, M₄)

AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM





Postgangliová vlákna sympatiku

Adrenergní receptor


- Spřažený s G-proteinem
- Typ α – obecně excitační
- Typ β – obecně inhibiční

AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM




Dřeň nadledvin

- Modifikované sympatické ganglion
- Stresové hormony vylučuje do krve




274 10 / Organization of the Nervous System

A AXES OF THE CNS



B MAJOR COMPONENTS OF THE CNS



C SURFACE ANATOMY OF THE CEREBRAL CORTEX

Frontal lobe Parietal lobe

Exportovat PDF
Vytvořit PDF
Prestol Scan Buttons
Zkombinovat soubory

Adobe Acrobat Pro DC
Sloučit dva nebo více souborů do jednoho PDF

[Další informace](#)




[Vyplnit a podepsat](#)

Ukládejte a sdílejte soubory ve službě Document Cloud
[Další informace](#)

Funkce míchy a Reflexy

Funkce páteřní míchy

- fylogeneticky nejstarší
- funkce
 - „koridor“ pro přenos informací mezi mozkem a orgány
 - Nervové centrum pro zpracování míšních reflexů
- Reflexy zprostředkované páteřní míchou jsou regulované/modifikované nadřazenými (fylogeneticky mladšími) nervovými centry, aby lépe sloužily funkci organismu jako celku (páteřní mícha je podřízena mozku)



Segmenty páteří míchy

Z každého segmentu páteře vycházejí míšní nervy, které inervují příslušnou oblast těla

C – krční (cervikální) segmenty

Th – hrudní (thorakální) segmenty


L – bederní (lumbální) segmenty

S – kostrční (sakrální) segmenty


Páteřní mícha zasahuje jen do L1, níže pokračují pouze míšní nervy

Přerušeni míchy – ztráta přenosu informace z mozku do příslušné části těla

- Paraplegie - přerušeni hrudní části míchy
- Kvadruplegie – přerušeni krční části míchy



Stavba segmentu páteřní míchy



Reflex

- Základní funkční jednotka činnosti CNS
- **Mimovolní, rychlá, stereotypní odpověď organismu na periferní podnět**
- **Reflexní oblouk** – soubor struktur zapojených do realizace reflexu
 - Receptor
 - Aferentní (dostředivá) nervová dráha
 - Reflexní centrum
 - Eferentní (odstředivá) nervová dráha
 - Efektor (výkonný orgán)
- **Reflexní centrum** – integrační centrum – interneurony a eferentní neuron přijímá informace nejen z receptoru, ale i z nadřazených center CNS
- Čím více interneuronů, tím má CNS větší možnosti modifikovat reflexní odpověď
- Reflexní oblouk je přesně anatomicky určený → diagnostika neurologických poranění


Účel reflexů

- Ochrana - snížení intenzity podnětu, který představuje hrozící poškození tkáně (Např. reflexní odtažení ruky od rozpálených kamen vede ke snížení intenzity tepelného podnětu)
 - Korekce na změnu (nechtěné protažení svalu vede k jeho zkrácení na žádanou délku)
- Zpětná vazba reflexního oblouku

Klasifikace reflexů

- **Podle receptorů**
 - Proprioreceptorový – receptor je součástí efektorového orgánu (proprioreceptor – šlachové tělísko, svalové vřetenko, receptory v kloubech)
 - Exteroreceptorový – efektorový orgán je jinde než receptor, může být více efektorových orgánů (exterorecepce tlaku, bolesti, tepla,...)
 - Interoreceptorový (viscerální)
- **Podle efektorů**
 - Somatické
 - Autonomní (vegetativní)
- **Podle získání reflexu**
 - Vrozené – nepodmíněné
 - Získané – podmíněné
- **Podle toho, kde je centrum reflexu**
 - Centrální – centrum v CNS (mozek, mícha)
 - Extracentrální – centrum mimo CNS (gangliový, axonový reflex)
- **Podle počtu neuronů (počtu synapsí mezi aferentním a eferentním neuronem)**
 - Monosynaptické
 - Polysynaptické – do reflexního oblouku je zařazen jeden a více interneuronů

Proprioreceptory - Svalové vřeténko a Golgiho tělísko




Napínací reflex

(monosynaptický, proprioreceptivní)

Regulace nechtěných změn délky svalu

Vyvolání reflexu:

Poklepem kladívka na šlachu dojde k pasivnímu (nechtěnému) natažení svalu. Podráždí se zakončení nervového vlákna I_a . Reakcí je reflexní zkrácení vlastního svalu.



Vyšetřovací kladívko


Hlavní funkce: korekce svalového tonu, udržení vzpřímeného postoje, odolávání gravitaci (např. udržení polohy brady)

Napínací reflex

Regulace nechtěných změn délky svalu

Vyvolání reflexu:


Poklepem kladívka na šlachu dojde k pasivnímu (nechtěnému) natažení svalu. Podráždí se zakončení nervového vlákna I_a . Reakcí je reflexní zkrácení vlastního svalu.



Napínací reflex – gama smyčka

γ -motoneurony


mění délku svalových vřetének – korekce citlivosti vřeténka na protažení (zkrácení kontraktálního konce vřeténka zvyšuje jeho citlivost)



Úmyslná kontrakce

Informace o kontrakci svalu z vyšších nervových center se dostává shodně k α -motoneuronům i γ -motoneuronům (α - γ -koaktivace) → kontrakce svalu i vřeténka, → citlivost svalového vřeténka zůstává konstantní

Inverzně napínací reflex - Golgiho (šlachové) tělísko



Funkce: regulace svalového napětí
(ochrana před odtržením šlachy)
Výrazně zvýšené svalové napětí vede k inhibici α -motoneuronu příslušných svalových vláken (zde extenzoru) a excitaci α -motoneuronu antagonistického svalu (zde flexoru) (bisynaptický, somatický)

Flexorový (únikový) reflex

(exteroceptorový, polysynaptický)

Funkce: ochrana před vnějším poškozením

Informace z exteroceptoru je v míše přepojena přes několik interneuronů k α -motoneuronu příslušného flexoru

→ omezení dalšího poškození tkáně

A δ a C-vlákna od nociceptoru

extero-receptor (nociceptor)

descendentní dráha interneuronu

flexor




ascendentní dráha interneuronu

excitační interneurony


vlákno α -motoneuronu

Informace je ascendentními a descendentními drahami vedena k sousedním segmentům míchy

Díky většímu počtu interneuronů lze reflex více modulovat vyššími nervovými centry



Zkřížený extenzorový reflex



Silný podnět vede nejen k flexorovému reflexu, ale způsobí také extenzi druhé končetiny, která tak může být oporou proti pádu

Zkřížený, protože dochází k flexi postižené končetiny a extenzi druhé končetiny

Pravá strana

Levá strana

Exteroreceptor (nociceptor)

Aδ a C-vlákna

ascendentní dráhy interneuronu

Zkřížený extenzorový reflex:

komplexnější, zahrnuje více sousedních míšních segmentů
Více interneuronů umožňuje větší regulaci síly odpovědi

descendentní dráhy interneuronu

Inhibice extenzoru

Aktivace flexoru

Aktivace extenzoru

Inhibice flexoru

inhibiční interneurony


Inhibice extenzoru

Aktivace flexoru

excitační interneurony

Aktivace extenzoru

Inhibice flexoru



Shrnutí zmíněných míšních reflexů

- **Napínací reflex** – korekce nechtěných změn délky svalu (slabší rychlé natažení svalu)
 - Proprioreflex – proprioreceptor (svalové vřeténko) je součástí efektoru (kontrakce vlastního svalu)
 - Monosynaptický
 - Unilaterální (jednostranný), dostředivá dráha Ia
- **Inverzní napínací reflex** – ochrana před natržením šlachy (silné natažení svalu)
 - Proprioreflex – proprioreceptor (šlachové Golgiho tělísko) je součástí efektoru (relaxace vlastního svalu)
 - Bisynaptický, unilaterální
 - Dostředivá dráha Ib a II
- **Flexorový reflex** – ochranný reflex proti poškození povrchových tkání (únikový reflex)
 - Exteroreflex – exteroceptor (nociceptor)
 - Polysynaptický, unilaterální
 - Flexe poškozené končetiny
 - Aktivace sousedních míšních segmentů
- **Zkřížený extenzorový reflex** – únikový reflex vznikající při silnějším podnětu
 - Exteroreflex – exteroceptor (nociceptor)
 - Polysynaptický, **bilaterální**
 - Flexe poškozené končetiny, extenze druhé končetiny
 - Aktivace sousedních míšních segmentů

Příklady reflexů

- **Proprioceptivní reflexy (míšní reflexy)**
 - Patelární, Achilovy šlachy, bicipitární, tricipitární,....
- **Exteroceptivní reflexy**
 - korneální (podráždění rohovky vyvolá mrknutí)
 - Epi-, mezo- a hypogastrický (stah břišního svalstva po podráždění hrotem vyšetřovacího kladívka)
 - Plantární – podráždění plosky nohy vyvolá plantární flexi a abdukci prstů (pozůstatek po chápavé noze)

Babinského fenomén – vyvolávání plantárního reflexu vede k opačné odpovědi – dorzální flexe a roztažení prstů nohy – při poškození pyramidových drah



http://www.123rf.com/photo_9045586_the-neurologist-testing-knee-reflex-on-a-female-patient-using-a-hammer.html

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Babinsk%C3%A9ho_reflex

Příklady reflexů

Některé smyslové reflexy

- Zornicové reakce
 - Reakce na světlo – zúžení (mióza) osvětlené zornice i zornice neosvětlené (symetricky)
 - Konvergence - přiblížení prstu k oku vede k zúžení zornice
 - Reakce na bolest – silná bolest vede k rozšíření zornice (mydriáza)
- Vestibulookulární reflex – při pohybu s hlavou dochází k rotaci očních bulbů v opačném směru

