





# Fyziologie smyslů



# Receptory





# Receptory




- membránové receptory (z vnějšího prostředí)
- cytosolové receptory (pronikne-li signál membránou)
- jaderné receptory (pronikne-li signál membránou)

# Receptory




*změna  
akčního  
potenciálu*

# Receptory



# Receptorové buňky

v membráně specializované bílkoviny → funkční jednotka = SENZOR



# Receptor

- FOTORECEPTORY  
– detekce světelného vlnění
- MECHANORECEPTORY  
– detekce zvukových vln a tlaku na kůži a vnitřním uchu
- CHEMORECEPTORY  
– detekce molekul v jídle, ve vnějším a vnitřním prostředí

# Přídavné struktury receptorů

= optický systém oka

= orgány středního a vnitřního ucha

= hlenová vrstva na povrchu čichového epitelu


## funkce

→ ochranná


→ transformace/koncentrace signálu

→ převod do/k/na citlivé části receptorových buněk

# Receptory




# Receptory



# Podnět

intenzita = **amplituda** akčního potenciálu



# Podnět

intenzita = **amplituda** akčního potenciálu

- relativně nižší při vyšší intenzitě podnětu

dlouhodobé působení = ADAPTACE

modalita podnětu = výběr specifických receptorů

+ specifické dostředivé neurony

# Akční potenciál podnětu


**receptorová buňka** (čichové buňky, taktilní buňky)

→ dosažení prahové hodnoty

→ synaptický přenos

→ mediátor

→ následný neuron



# Signál

*nervové dráhy*

zpracování informace  
+ přepojení do jiných systémů  
(oko a okohybné svaly)

**RECEPTOR**

*nespecifické senzorické dráhy*

mozková kůra

# Fotoreceptory

- buňky = tyčinky a čípky (3 části)



zvní segment

(vrstvy/disky plazmatické membrány se světlocitnou látkou)

vnitřní segment

(buněčné organely)

synaptické zakončení

(spojení s dalšími buňkami sítnice)

# Fotoreceptory - rodopsin

- světlocitná látka
- bílkovina OPSIN + izomer vit. A: 11-cis retinal
  - **tyčinky** – 1 druh opsinu = intenzita světla
  - **čípky** – 3 druhy opsinu – citlivost k různým vlnovým délkám (= vnímání barev)

# Fotoreceptory - rodopsin

- **TMA** – membrána v klidovém stavu
  - rodopsin (-cis forma)
    - světlo
    - -trans forma = uvolnění opsinu
    - aktivace cGMP-fosfodiesterázy (pomocí aktivované GTP podjednotky Transducinu) →

# Fotoreceptory - rodopsin

- štěpení cGMP na GMP
- HYPERpolarizace membrány
- změna membránového potenciálu další buňky zrakové dráhy
- -trans forma pomocí rodopsinkinasy
- konverze na -cis formu → vazba na opsin

# Mechanoreceptora

- převod mechanických podnětů na bioenergetický signál
  - nejčastější → kůže (tlak)
    - svaly, šlachy, klouby (hluboké čítí)
    - močový měchýř (tlak)
    - + receptory sluchu, polohy hlavy
- = mechanicky řízené iontové kanály
- záklopy připojeny vláknem k cytoskelety
  - deformace buňky → vlákno → otevření/uzavření iontového kanálu

# Mechanoreceptora

## Sluchové a vestibulární ústrojí

- buňky se STEREOCILIIEMI → napojeny na iontové kanály
- DEpolarizace - HYPERpolarizace membrány
- vypuštění transmitterů = přenos signálu

# Chemoreceptory

chuť, čich, složení vnitřního prostředí

odpověď na přítomnost látek v okolí (specifické receptory v membráně)

→ nervový signál – specializovaný senzorický receptor

chemická látka → senzor

→ změna prostupnosti iontových kanálů na membráně

→ receptorový potenciál (DEpolarizace - HYPERpolarizace) → presynaptický oddíl buňky → změna výdeje mediátoru

# Termoreceptory

pomalá adaptace → termocitlivé iontové kanály pro  $\text{Ca}^{2+}$  → vznik receptorového potenciálu

- lepší lokalizace při působení i tlakového podnětu

## Dva druhy

- chladové – aktivita při 23–28 °C
- tepelné – aktivita při 38–43 °C
  - rychlá změna – rozezná 0,1 °C
  - pomalá – větší rozdíl teplot a víc receptorů
- pod 10 °C = zástava tvorby a šíření vzruchů → znecitlivění

# Senzorické vjemy

# Senzorické vjemy

= vstup aferentní informace do vědomí

**Není odrazem podnětu ale  
je výsledkem procesu výběru informací!**

(Za všechno může mozek!)


# Chuť

- chemoreceptory
- jazyk, patro, hltan, horní část jícnu
- chuťové pohárky - buňky žijí jen cca 2 týdny (receptorové buňky, podpůrné buňky)
- pouze u látek rozpustných ve vodě
  - sladká – molekuly na bílkovinné senzory membrány
  - slaná – prostup  $\text{Na}^+$  do buněk
  - kyselá a hořká – prostup  $\text{H}^+$  iontů membránou
- dlouhodobé působení podnětu → adaptace

# Chuť

papila  
s chuťovými  
pohárky

jednotlivé  
receptorové  
pohárky





# Chuť

chuťový  
pohárek

chuťové  
(receptorové)  
buňky

podpůrné  
buňky



# Chuť

- aferentní vlákna chuťových pohárků = výběžky VII., IX. a X. hlavového nervu


→ VII. = *n. facialis* (lícní nerv)

→ IX. = *n. glossopharyngeus* (jazykohltanový nerv)

→ X. = *n. vagus* (bloudivý nerv)

→ chuťová centra **mozkového kmene** projekce i do **talamu** a **mozkové kůry** + **retikulární formace** mozkového kmene a **lymbický systém** (hypotalamus) = emoce


# Chuť



# Chut'

## GUSTATORY CORTEX

*structure responsible for  
the perception of taste*



# Čich

- nejvyšší senzorický vstup (potrava, rozmnožování)
  - čichový epitel – velmi malá plocha
- = receptorové buňky (bipolární neuron schopný regenerace)  
+ podpůrné buňky + hlenové buňky


čichové dráhy z *bulbus olfactorius*

→ různé oddíly mozku

- **korová** projekce + projekce do **lymbického systému**

= emoční zabarvení čichových vjemů

# Čich




# Čich

*bulbus olfactorius*

podpůrné a  
hlenové buňka

bipolární neuron



# Čich

OLFACTORY CORTEX  
OLFACTORY TRACT




# Čich

FRONTAL CORTEX



# Čich

LIMBIC SYSTEM




# Zrak

- vnímání
  - elektromagnetického záření 400-750 nm
  - jasů
  - kontrastu (rozdíl barevného odstínu sousedních ploch)
- vznik vjemu = podráždění receptorů sítnice
- obraz na sítnici – převrácený, zmenšený

# Zrak

- optický aparát oka
  - čočka
  - duhovka, zornice
- sítnice
- přídatné orgány oka
  - oční víčka
  - slzné žlázy
  - okohybné svaly, ochranný tukový polštář


# Zrak




# Zrak

PROTECTIVE FAT

EXTRINSIC EYE MUSCLES



# Zrak



# Zrak

## ČOČKA

- výživa difuzně z komorové tekutiny → centrální část stárne (ztráta pružnosti) → vznik PRESBYOPIE (brýle „na blízko“)
- schopnost akomodace (úprava lomivosti) - ciliární svaly (stah řízen parasymptikem)

## vady čočky

- myopie = obraz vzniká před sítnicí - brýle s rozptylkou (čočka)
- hypermetropie = obraz vzniká za sítnicí - brýle se spojkou
- katarakta = šedý zákal, ztráta průhlednosti čočky

# Zrak

## **DUHOVKA**

- pigment = neprostupná pro světlo

## **ZORNICE**

- paprsečtý a kruhovitý sval = změna velikosti
- spánek – zúžená, bezvědomí – rozšířená

# Zrak

## SÍTNICE

vnitřní vrstva

- čípky
- tyčinky
- bipolární neurony
- gangliové buňky

# Zrak

zraková dráha

tyčinky + čípky

→ bipolární neurony

→ gangliové neurony


→ zrakový nerv

→ **talamus**


→ týlní oblast **mozkové kůry** (+ vlákna do jader **mozkového kmene**, **mozečku**, **retikulární formace**)

- axony gangliových buněk – křížení = *chiasma opticum*
  - každá mozková hemisféra – informace ze **stejnolehlé** poloviny oka



# Zrak



# Zrak



# Zrak



# Zrak


## čípky

- v centrálních partiích sítnice
- přímé spojení do vyšších oddílů mozku
- 3 druhy – barevné vidění
- 1 čípek = 1 bipolární neuron

## tyčinky

- citlivější
- vidění v horších světelných podmínkách
- konvergence = neurony své dráhy sdílejí → sčítání signálu  
→ vyšší citlivost

# Zrak




bipolární neuron

gangliová buňka

čípek

# Zrak



gangliová buňka

bipolární neurony

tyčinky

# Šedý zákal - katarakta




# Zelený zákal - glaukom



# Krátkozrakost - myopie



# Dalekokožrakost - hyperopie



# Barvoslepost

achromatomalie a achromatopsie




# Barvoslepost

- anomální trichromazie
  - a) protanopie / -anomalie
  - b) deuteranopie / -anomalie
  - c) tritanopie / -anomalie




# Barvoslepost

pseudoizochromatické tabulky




# Barvoslepost

pseudoizochromatické  
tabulky



# Sluch

- nepřetržitě monitoruje okolí i vlastní zvukové projevy
- výška tónu dána frekvencí (jak rychle kmitá)
- síla zvuku dána amplitudou



# Sluch

## PINNA or AURICLE


*catches sound waves,  
and passes them along  
deeper into the ear*

ušní boltec

## EXTERNAL ACOUSTIC MEATUS


*auditory canal*

vnější zvukovod



# Sluch


EAR DRUM  
bubínek




# Sluch

TYMPANIC CAVITY


tympanická dutina




# Sluch



# Sluch



# Sluch



- 1 scala vestibuli
- 2 scala media
- 3 scala tympani

# Sluch

- tekutina ve *scala vestibularis*
- tekutina v *ductus cochlearis (scala media)*
  - rozkmitání bazilární membrány\*
- tekutina ve *scala tympani*
- okrouhlé okénko (= místo vyrovnávání tlakových změn)

# Sluch




## BASILAR MEMBRANE

*a stiff band of tissue that runs between the scala media and scala tympani*

# Sluch

ORGAN OF CORTI



# Sluch


\* vibrace bazilární membrány – posun receptorových vláskových buněk proti tektoriální membráně

→ pohyb mechanicky řízených iontových kanálů


→ změna prostupnosti membrány

→ bazální pól vláskové buňky → potenciál

→ vlákna *nervus cochlearis* → CNS



# Sluch



# Sluch

nervová vlákna zachovávají ve sluchové dráze prostorovou orientaci

→ projekce do **sluchové kůry** (komplexní podnět)

→ prostorová orientace zvuku

# Sluch

sluchový vjem → podráždění vláskových buněk **Cortiho orgánu**  
chvěním bazilární membrány (vnitřní vláskové buňky spojeny  
synapsí s axony prvního nervu sluchové dráhy)

→ stereocilie → ohyb → cytoskelet spojen s mechanicky  
řízenými iontovými kanály

→ změna permeability membrány

→ změna membránového potenciálu → ...

# Rovnováha

## VESTIBULÁRNÍ SYSTÉM


- mechanoreceptory
- vláskové buňky
  - v ampulách polokruhovitých kanálků
  - ve váčcích otolitového orgánu
- aktivovány
  - poloha hlavy
  - lineární a úhlové zrychlení

# Rovnováha

## Polokruhové kanálky

- 3 na sebe kolmé roviny
- rozšířeny v *ampulu* (vláskové receptorové buňky)
- vyplněny endolymfou
- propojeny společným prostorem *saculu* a *utriculu*


# Rovnováha



# Rovnováha

## Úhlové zrychlení

- otočení hlavy → pohyb stěn kanálku vůči endolymfě
  - na začátku opoždění endolymfy
  - na konci setrvačnost
- největší pohyb v kanálku s nejpodobnější rovinou pohybu



# Rovnováha

Lineární zrychlení a změna polohy vůči gravitaci

- otolitový orgán (*saculus, utriculus*)
  - *utriculus* – hrizontálně
  - *saculus* – vertikálně, sagitálně
- vláskové buňky
  - krystalky uhličitanu vápenatého (otolit)

# Rovnováha

buňky *utriculu*

- gravitační vlivy
- úklon hlavy dopředu, dozadu, ke stranám

buňky *saculu*

- gravitační vlivy
- pohyb nahoru, dolu

# Dotek a tlak

- Mechanoreceptory
  - rychle se adaptující (odpověď na začátek a konec podnětu) = fázické receptory
  - pomalu adaptující (odpovídá trvalou aktivitou) = tonické receptory
- různé typy – liší se stavbou přídatných struktur  
(Meissnerovo tělísko, Merkelův disk, Paciniho tělísko, receptor chlupového folikulu, Ruffiniho tělísko, volná nervová zakončení)

# Dotek a tlak

Ruffiniho  
tělísko



Meissnerovo  
tělísko



Krauseho  
tělísko



Paciniho  
tělísko



volné  
nervové  
zakončení



# Dotek a tlak

umožňuje vnímat

- jemné/silné tlakové změny
- rozlišit tvrdé/měkké
- určit tvar, vlastnosti povrchu

# Bolest

- reakce na podnět, který by mohl zničit tkáň = obranný reflex
- receptory ve všech tkáních (mozek výjimka)
  - = zakončení nemyelinizovaných (volná) nervových vláken ( $A\delta$  a C-vlákna)
  - citlivost 1000krát nižší jak u tlakových čidel

# Bolest

- informace z  $A\delta$  (delta) vláken  $\rightarrow$  specifickými drahami  $\rightarrow$  **thalamus** a somato-senzorická oblast **kůry** = ostrá, lokalizovaná, „rychlá bolest“
- informace z C-vláken – pomalejší  $\rightarrow$  nespecifické dráhy **retikulární formace** = tupá, hůře lokalizovatelná bolest  $\rightarrow$  emoční motiv k odstranění podnětu + **lymbický systém** (emoce)

# Bolest

- EMOCE
- silný pozitivně emoční náboj – snížení vnímání bolesti
- negativní emoční náboj – zvýšení vnímání bolesti

# Bolest

- z vnitřních orgánů
  - špatně lokalizovatelná
  - často projekce do kůže → nervová vlákna ze stejného nervového segmentu

# Zdroje

- LANGMEIER, Miloš. Zaklady lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2526-0.
- SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka: překlad 8. německého vydání. 4. české vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-4271-7.
- CrashCourse: Anatomy & Physiology [online]. [cit. 2021-09-20]. Dostupné z: <https://thecrashcourse.tumblr.com/downloads/anatomyphysiology> 
- Interactive Biology: 031 How Rods and Cones respond to Light. In: Youtube [online]. [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: [https://www.youtube.com/watch?v=Fm45A4yjmvo&list=PL25AE732D9E27096D&index=31&ab\\_channel=InteractiveBiology](https://www.youtube.com/watch?v=Fm45A4yjmvo&list=PL25AE732D9E27096D&index=31&ab_channel=InteractiveBiology)
- Paroc: Obecné informace o zvuku. In: Paroccz [online]. [cit. 2018-09-17]. Dostupné z: <https://www.paroc.cz/knowhow/zvuk/obecne-informace-o-zvuku>
- Obrázky zpracované v <https://BioRender.com/> 