

Benigní kožní nádory

MUDr. Anna Žáková

I.DVK FNUSA a LF MU

- Rostou expanzivně z místa vzniku – mohou stlačovat okolní tkáně, ale nevrůstají do nich a neničí je
- V různém stupni si zachovávají strukturální i funkční zralost
- Názvosloví:

Benigní žlázové nádory = adenoma

Benigní epitelové nádory = epitelioma


Rozdělení benigních nádorů

- Epitelové
- Verruca seborrhoica
- Adnexální
 - Syringom
 - Cylindrom
 - Pilomatricoma
 - Keratoakantom
- Mezenchymální
 - dermatofibrom
 - Keloid a hypertrofická jizva
 - Fibroma molle
 - Angiofibrom
 - Leiomyoma
 - Lipom
- Cévní
 - Haemangioma capillare
 - Haem. cavernosum
 - Haem. senile
 - Angiokeratoma
 - Lymphangioma circumscriptum

1) Epitelové nádory

- **Verruca seborrhoica (seborrhoická veruka, senilní veruka)**

- Nejčastější benigní nádor, téměř u každého člověka ve druhé polovině života
- Nejčastěji vzniká na: trupu (hlavně záda), hlavě
- **KO:** Zpočátku se vytvoří ostře ohrazené pravidelné žlutavé makuly a plošné papuly, postupně se zvětšují, vyvyšují, povrch se stává bradavičnatý, mění se barva od světle hnědé po černou
- **Léser –Trélatův příznak** – náhlý výsev velkého počtu malých, svědících seb. veruk může ohlašovat vznik maligního nádoru vnitřních orgánů – (GIT, hematopoetického syst.)
- **Léčba:**
 - není nutná, pac. touží odstranit z kosmetických důvodů
 - kyretáž (ostrou lžičkou), kryoterapie, excize





Veruca seborrhoica



2) Adnexální nádory

- Mohou vzniknout z každého přídatného kožního orgánu (z vlasového folikulu, z potní, apokrinní nebo mazové žlázy)
- Většina má málo vyhraněný klinický vzhled a proto se diagnostikují až podle histologického vyšetření
- **Terapie všech:** excize

- 2) Adnexální

- Syringom



- Cylindrom



- Pilomatrixoma

- Keratoakantom



- **Syringom**

- Vznik z vývodů potních žláz
- Převážně u žen
- 2 formy – periorbitální (častější), diseminované
- **KO:**
 - kolem očí, hlavně na dolním víčku, mnohočetné hladké tuhé papulky barvy kůže (1 – 5 mm)
 - U diseminované formy – vícečetný výsev na víčkách, přední ploše krku, hrudníku a nadbřišku
 - **Léčba** – excize solitárních syringomů, disemin. forma nemá účinnou léčbu



- **Cylindrom**

- Epiteliom s apokrinní diferenciací, familiární výskyt (AD), solitární nebo mnohočetný
- První projevy v časné dospělosti, postupně jich přibývá
- **KO:** ve kštici se tvoří polokulovité tuhé papuly a hrboly v barvě kůže nebo zarudlé, s hladkým bezvlasým povrchem, postupně se hrboly shlukují a mohou pokrýt celou kštici (tzv. turbanový tumor)
- **Léčba:** excize, někdy s plastickou úpravou





Turbanový
tumor

- **Pilomatrixoma (pilomatrixom)**
 - Epiteliom vlasového folikulu
 - Vznik nejčastěji do 20. roku
 - KO: solitární, v podkoží uložený, tvrdý, ohraničený hrbol (do 3cm), volně pohyblivý oproti spodině
 - Na horních končetinách a obličeji
 - **Léčba:** excize



- **Keratoakantom**

- vznik ze supraseboglandulární části vlasového folikulu
- Na slunci exponovaných částech těla (obličeji, krk, ruce) u osob okolo 60 let, u imunosuprimovaných osob, vystavených účinkům miner. olej. a dehtů
- **KO:** rychle rostoucí solitární polokulovitý hrbol dosahující během několika týdnů až 2 cm v průměru, navalité hladké okraje barvy kůže a centrálním kráterem vyplněným rohovinou, na okrajích četné teleangiektazie
- Může spontánně regredovat se zanecháním jizvy v průběhu dalších měsíců
- **Léčba:** excize, možná spontánní regrese



- 3) Mezenchymální
- dermatofibrom
- Keloid a hypertrofická jizva
- Fibroma molle
- Angiofibrom
- Leiomyoma
- Lipom





- **Histiocytoma fibrosum (dermatofibrom)**


- Jeden z nejčastějších kožních nádorů
- Reaktivní zánět po štípnutí hmyzem nebo po poranění
- Vzniká u mladších osob na končetinách, méně na trupu
- **KO:** solitární nebo vícečetný těsně pod epidermis uložený plochý nebo lehce vyvýšený hrbolek (mm až 2 cm), červenohnědý, hnědý
- může svědit
- **Léčba:** není nutná, možná excize

- **Keloid, hypertrofická jizva**
- Keloid – valovitě vyklenutá jizva přesahující hranici traumatu, vzniká nekontrolovanou produkcí kolagenních vláken
- Nejvíce náchylné oblasti – presternálně, ramena, šíje, genetika (rodinný výskyt)
- Nejčastěji u mladých osob, více u žen a u černé rasy
- **KO:** v místech kožního traumatu, zasahujícího do koria (očkování, operační rány, akné), se za 3-4 týdny tvoří tuhé, hladké papuly, hrboly, nepravidelně rozvětvené vyvýšené útvary, sytě červená barva se postupně mění na porcelánově bílou
- Spontánní keloid – bez předchozího traumatu

- Hypertrofická jizva – nepřesahuje hranici traumatu, může spontánně dojít k oploštění
- **Léčba:** obtížná, každá manipulace vede k horšímu keloidu
 - čerstvé keloidy (do 6 měsíců) – KS mast, nebo intralezionárně, lokální retinoidy, komprese, kryoterapie
 - staré léze – kombinace i s frakcionovanou RT

Keloid






- **Fibroma molle (fibroma pendulans)**
 - Stopkatý kožní výrůstek barvy kůže
 - 2 varianty: mnohočetné malé, filiformní a stopkaté výrůstky v axilách a po stranách krku, nebo solitární několik cm velké stopkaté váčkovité přívěsky
 - Nejčastěji u obézních osob
 - **Léčba:** menší léze odstranit kauterem, nebo nůžkami, větší chirurgicky



- **Angiofibrom**
 - Vzniká proliferací malých cév s perivaskulární fibrózou
 - Často vzniká z intradermálního névu po úplné regresi névových buněk
 - **KO:** solitární - tuhá papulka necharakteristického vzhledu, na obličeji, může být hladká s teleangiektaziemi na povrchu – fibrózní papula nosu (záměna za bazaliom)
 - **Léčba:** excize (solitárních lézí), laser (mnohočetné léze)

- **Lipom**
 - Ohraničená proliferace tukové podkožní tkáně
 - Výskyt izolovaně, nebo mnohočetně
 - **KO:** v podkoží se tvoří měkké, elastické, laločnaté, okrouhlé, nebo oválné, dobře ohraničené útvary volně pohyblivé proti spodině i kůži
 - Nečiní potíže, pouze angiolipom je silně cévnatý a bývá bolestivý
 - Nesouvisí s tělesnou hmotností
 - **Léčba:** vynětí nádoru po kožní incizi při kosmetických problémech, funkčních obtížích nebo bolestivosti



- 4) Cévní
- Haemangioma capillare
- Haem. Cavernosum
- Haem. Senile
- Granuloma pyogenicum
- Angiokeratoma
- lymfangioma



- **Haemangioma capillare**
- Nejčastější benigní cévní nádor
- již při narození nebo vzniká krátce po porodu, rizikový faktor – nízká porodní hmotnost
- **KO:** na hlavě, krku, z neostře ohraňičeného zarudlého ložiska vzniká měkký, 1-3 cm velký hrbol světle červené barvy, v dalších letech se na povrchu tvoří bělavé vkleslé pruhy a ložiska (fibrotické regresivní změny)
- U 90% dětí do 5 – 7 let úplná regrese
- Snadná zranitelnost nádoru s krvácením a možností sekundární infekce

- **Haemangioma capillare**

- komplikace:

- tvorba ulcerací

- jizvení

- periorbitální lokalizace – riziko amblyopie, periorální – problém občas s příjmem potravy a dýcháním

- ev. agresivní růst

- **Haemangioma capillare - Léčba**
 - Sledování low-risk lézí
 - Časná kryoterapie může indukovat regresi
 - Topické nebo intralezionální KS, excize nebo laser
 - High risk lesions s rozsáhlými projevy:
 - Systémové KS nebo interferon



Figure 1. Before topical treatment, a large capillary hemangioma involved



- **Haemangioma senile**

- Benigní kapilární hemangiom
- vznik v pozdějším věku na trupu
- KO: mnohočetné světle až tmavočervené papuly, ostře ohraničené (1-6 mm)
- Nedochází ke spontánní regresi
- Kosmetický problém
- **Léčba:**
 - Diatermokoagulace
 - laser and kryoterapie



Hemangioma



- **Granuloma pyogenicum (granuloma teleangiectaticum)**
 - Reaktivní cévní proliferace - za několik týdnů po traumatu
 - V akrální lokalizaci
 - KO: sytě červený, polokulovitý, přisedlý nebo stopkatý nádor velikosti hrachu, třešně, povrch může erodovat a pokrýt se hemoragickou krustou
 - **Léčba:**
 - excize



Děkuji za pozornost