



SVALOVÝ TEST - obličej

jméno pacienta : _____

rok narození : _____

Rozeznáváme 6° - hodnocení není založeno na síle, ale na rozsahu pohybu ve srovnání se zdravou stranou

stupeň	5	normální stah, není asymetrie proti zdravé straně
	4	téměř normální stah, asymetrie proti zdravé straně je nepatrná
	3	stah postižené svalové skupiny je asi v polovině rozsahu proti zdravé straně
	2	na nemocné straně se sval stahuje pouze asi ve čtvrtině rozsahu
	1	při pokusu o pohyb jeví sval zřetelný záskub
	0	při pokusu o pohyb nepostřehneme žádný stah

pro lepší relaxaci testujeme zvláště stupně 0 - 2 vleže na zádech

TESTOVANÝ SVAL

M. frontalis
M. corrugator supercilii
M. orbicularis oculi
M. nasalis
M. levator labii superioris
M. zygomaticus major
M. risorius
M. depressor labii inferioris
M. orbicularis oris
M. mentalis
M. buccinator
M. platysma

VYŠETŘOVANÝ POHYB

zvedání obočí
mračení, přitažení obočí ke střední rovině
zavření očí
sevěření nosních dírek (při prudkém vdechnutí nosem)
cenění zubů - zvedání horního rtu
úsměv - koutky úst šikmo vzhůru
rovný úsměv - koutky laterálně, důlek ve tváři
cenění zubů - stažení dolního rtu
špulení rtů
ohnutí dolního rtu - zdvihání kůže brady
nafouknutí tváři a přefukování -
vážně vtažení postižené a nafouknutí zdravé strany
napínání kůže na bradě a krku

pravá strana						svaly	levá strana					
datum	datum	datum	datum	datum	datum		datum	datum	datum	datum	datum	datum
						M. frontalis						
						M. corrugator supercilii						
						M. orbicularis oculi						
						M. nasalis						
						M. levator labii superioris						
						M. zygomaticus major						
						M. risorius						
						M. depressor labii inferioris						
						M. orbicularis oris						
						M. mentalis						
						M. buccinator						
						M. platysma						

