



1



2



A. Léčba
tupozrakosti
(pleoptická
léčba)

3




Korekce
refrakční vady

4

Brýlová korekce


- správná brýlová korekce je prvním krokem léčby
- u dětí vyšetřujeme refrakci v cykloplegii (velká akomodační šíře)
- význam
 - zlepšení zrakové ostrosti
 - zlepšení úchytky



5

Brýlová korekce

- při strabismu bývá předepisována plná korekce
- pouze pokud dítě nesnáší plnou korekci, je možné ji postupně zesilovat
- astigmatismus se koriguje vždy plně
- čím je dítě menší, snáší lépe změny korekce i rozdíl v anizometropické korekci
- rozdíl $0,25 D = \text{rozdíl } 0,5 \% \text{ ve velikosti obrazů}$
- aby mohl mozek spojit oba obrazy, neměl by rozdíl jejich velikostí přesahovat 5% , děti jsou ale oproti dospělým schopny překonat vyšší rozdíl
- při vysokém rozdílu refrakce je možné předepsat kontaktní čočku



6

Brýlová korekce vzhledem k úchylce

- plná korekce u myopie: nejslabší rozptylka, se kterou je dosaženo nejlepšího možného vizu
- plná korekce u hypermetropie: nejsilnější spojka, se kterou je dosaženo nejlepšího možného vizu
- hodnotu korekce vzhledem k úchylce lze upravovat

refrakční
vada

ESO

EXO

emetropie

operace

antikorekce
operace

hypermetropie

plná korekce

antikorekce

myopie

minimální
korekce

hyperkorekce

7



Brýlová korekce u akomodačního strabismu

- akomodační strabismus
 - refrakční – vyšší hypermetropie, jednoohniskové brýle upravují úchylku do dálky i blízka
 - nerefakční – nižší hypermetropie, do dálky není úchylka, objevuje se jen do blízka při zapojení akomodace – (Franklinův) bifokál, E-line
 - smíšený – úchylka do dálky i blízka, do blízka větší, korekcí se upravuje jen částečně, zbytek lze operovat



8

Zásady brýlové korekce u dětí

- správná centrace
- PD měřeno při zakrytí druhého oka (hlavně u strabismu)
- vhodná brýlová obruba
 - velikost (neměla by omezovat ZP)
 - musí sedět na nose, za ušima

9

Léčba kapkami

- pokud nemůžeme předepsat brýle (např. kvůli nízkému věku do 1 a ½ roku)
- použití cykloplegik
- vedoucí oko se znevýhodní atropinizací
- znevýhodnění spočívá v obmě akomodace, zvětšení zobrazovacích vad oka a oslnění
- kape se do doby než začne amblyopické oko přebírat fixaci



10




Okluze



- vyřazení jednoho oka z vidění
- dělení dle lepeného oka
 - přímá – okluze vedoucího oka
 - nepřímá – okluze amblyopického oka
- dělení dle typu okluze
 - totální - úplně vyřazení vidění
 - parciální – vidění vedoucího oka se pouze zhoršuje pod úroveň vidění oka amblyopického
 - sektorová – okluze některé části brýlového skla, po operaci u eso se zalepí nasální polovina skel, u exo temporální polovina skel pro posílení svalů v protisměru úchyly




11



Přímá okluze

- přímá okluze vedoucího oka je významným krokem v léčbě tupozrakosti již od roku 1743 – Buffon
- význam
 - zlepšení ZO nezakrytého oka
 - snížení útumu nezakrytého oka
 - prevence vzniku ARK
- dobu okluze určuje lékař dle závažnosti amblyopie

12



Nepřímá okluze

- okluze amblyopického oka
- používá se u amblyopií s excentrickou fixací
- rozvolňuje aktivní útlum amblyopického a může rozvolnit excentrickou fixaci
- sama o sobě nezlepšuje ZO amblyopického oka!
- na 4-6 týdnů zakryjeme amblyopické oko a poté navazuje okluze přímá a intenzivní pleoptická léčba

13

Optická penalizace

- 1958 Pfandl
- optické znevýhodnění vedoucího oka brýlovým sklem a cykloplegiky
- nehodí se u těžké amblyopie

Penalizace	Vedoucí oko	Amblyopické oko
Do blízka	Plná korekce + atropin	Hyperkorekce +3D
Do dálky	Atropin + hyperkorekce +3D	Plná korekce
Totální	Podkorekce -4D + atropin	Plná korekce

14



Pleoptická cvičení

- aktivní
 - tupozraké oko provádí aktivní úkoly
 - pomoc hmatu, sluchu, paměti
 - možno provádět doma nebo na ortoptické cvičebně za dohledu ortoptistky
 - Starkiewiczova lokalizační cvičení
 - oko-ruka: míčové hry, trefování se
 - oko-noha: kopaná, chůze po čáře
- pasivní
 - pasivní – dítě se pouze kouká
 - provádí se hlavně u amblyopie s excentrickou fixací
 - na přístrojích
 - s pomocí prizmat

15

Aktivní pleoptická cvičení

- v domácím prostředí: puzzle, stavebnice, obkreslování, vypichování, navlékání korálek, modelování podle předlohy, pexeso,...
- Lokalizátor
 - deska s otvory, které se postupně rozsvěčují
 - dítě je prstem nebo ukazovátkem zakrývá
 - velikost otvorů lze měnit
- Korektor
 - obrázky vyryté v kovové desce
 - dítě je obtahuje, pokud přetáhne, dostane zvukový a světelný signál – zpětná vazba
- Mnemoskop
 - kreslicí pult s promítanými obrázky, které dítě obkresluje



16

Pasivní pleoptická cvičení

- Pleoptofor
 - oslnění excentrického místa sítnice a dráždění fovey přerušovaným světlem
- Centrofor
 - upevňuje centrální fixaci vycvičenou na pleoptoforu
 - otáčející se spirála, která převádí pozornost na foveu, uprostřed fixuje E
- Euthyskop
 - oslní se makulární a paramakulární část sítnice, fovea je kryta
 - poté se vybaví papírový obraz, během jehož trvání si má dítě uvědomovat hlavní pohledový směr fovey – dívá se na plátno, na které se promítají E
- Cüppersův stolní koordinátor
 - upevňuje centrální fixaci dosaženou na euthyskopu
 - Haidingerův svazek – viděn pouze foveou jako vrtulka
- Léčba prizmaty podle Pigassou
 - vizuskopem se zjistí vzdálenost místa EF od fovey a na brýle je nalepí prizmatická folie odpovídající velikosti bází k místu EF
 - současně se provádí pleoptická léčba
- Červený filtr podle Brinkera-Katze
 - ve fovey je nejvíce čípků citlivých na červenou – proto se předřazuje červený filtr a provádí se pleoptická léčba
- CAM
 - dítě se dívá amblyopickým okem na otáčející se terč s černo-bílými kostkami nebo pruhy, které selektivně stimulují zrakovou kůru
 - 7 minut



17

B. Ortooptika

- k obnovení porušeného binokulárního vidění
- předpoklady pro cvičení
 - vyrovnaná zraková ostrost
 - centrální fixace obou očí
 - NRK
 - normální pohyblivost očí
 - malá úchylka do 5 st
 - ortoptický věk 4-8 let
 - normální inteligence a spolupráce
- s korekcí za dohledu ortoptistky
- základním principem je disociace obrazů obou očí



18



- postup ortoptického cvičení
 - odtlumování a nácvik superpozice
 - nácvik fúze
 - nácvik šířky fúze
 - cvičení stereopse
 - cvičení motility
 - cvičení konvergence
 - cvičení správného vztahu akomodace a konvergence

19



Troposkop

- základní diagnostický i terapeutický přístroj
- dva striktně oddělené tubusy
- před vyšetřením či cvičením nastavit PD, výšku přístroje i brady, vynulovat všechny stupnice – horizontální, vertikální i cyklo
- cvičení na troposkopu
 - odtlumování
 - nácvik superpozice
 - nácvik fúze
 - cvičení šířky fúze
 - nácvik superpozice

20

- odtlumování
 - v objektivní úchylce vložíme obrázky pro superpozici, před vedoucím okem snížíme světlo na minimum a obrázkem před utlumujícím okem oscilujeme nebo blikáme
- nácvik superpozice
 - v objektivní úchylce vložíme obrázky pro superpozici, snažíme se za oscilace obrázky překrýt
- nácvik fúze
 - vložíme obrázky pro fúzi, dítě má obrázky spojovat, provádíme oscilaci obrázkem, jehož detail se ztrácí, dokud nevidí celý obrázek
 - KRST: obrázky FI se zafixují v subjektivní úchylce, uvolní se středová šroub, rameny se pohybují do stran
- cvičení šířky fúze
 - nejčastěji na FI, pokud je bez suprese spojí, pohybuje se symetricky rameny ven nebo dovnitř dokud se nerozdvojí či se neztratí obraz jednoho oka
- cvičení stereopse
 - zasuneme obrázky pro stereopsi, dítě popisuje, co je blíže a co dále

21



Cheioskop


- odtlumování a nácvik superpozice
- očníky s +8D, jedním okem dítě vidí předlohu a druhým plochu pro kreslení
- disociace šikmým zrcadlem
- k obkreslení musí dítě zapojit obě oči
- je-li přítomna úchylka, je obrázek oproti předloze posunut ve směru úchylky
- možno provádět i lov místo kreslení (motýlek a síťka)



22

Zrcadlový stereoskop

- stejný princip jako u cheiroskopu
- dvoudílná podložka s přepážkou
- díly mohou být vodorovně nebo ve 135°
- odtlumování, nácvik superpozice, fúze, šířky fúze
- speciální obrázky či lov



23





Holmesův stereoskop

- cvičení fúze, šířky fúze a stereopse
- v okulárech čočky +5D, středy posunuty zevně – prizmatický efekt
- mechanická přepážka odděluje vjemy obou očí
- po liště se pohybují obrázky se středy 60 mm od sebe
- posunem k očím se cvičí záporná šířka fúze a akomodace,
- posunem od očí se cvičí kladná šířka fúze a desakomodace

24

Vergenční stereoskop

- stejný účel a princip jako Holmesův stereoskop
- navíc lze měnit vzdálenost středů obrázků




25



Rémy separátor

- nácvik správného vztahu akomodace a konvergence
- 30 cm lišta, na konci dva průhledné obrázky (kolo, křížek)
- dítě má při pohledu do dálky spojit obrázky
- pomocí tyčinek lze pak měnit vzdálenost mezi obrázky




26

Diploskop

- diagnostika poruch postavení očí při pohledu do blízka
- nácvik správného poměru akomodace a konvergence
- 15 cm lišta (předloha, clona)
- na předloze 3 písmena (LES)
- přes dírkky ve cloně každé oko vidí 2 písmena ze slova
- pokud je poloha orto – vidí celé slovo
- pokud eso – vidí ESLE
- pokud exo - LEES



27



Diploptika

- 1978 Avetisov
- vyvolá se diplopie
- poté se snaží překonat ji pomocí fúzního reflexu



28



Cvičení motility


- ručně s drobným poutačem
- ruský svalový trenažér
 - ručička s poutačem se pohybuje v nastaveném směru a rozsahu

29

Cvičení konvergence

- ručně s poutačem
- trenažér konvergence
 - po liště se posunuje světlo směrem k očím

30



C. Chirurgická léčba

- cílem je estetika a funkce (paralelní postavení do dálky i blízka, kdy je umožněno JBV)
- součást komplexní léčby strabismu
- operuje se cca více než 50 % konkomitantního šilhání
- před operací je třeba důkladně ortopticky vyšetřit
- u dětí v celkové anestezii (iv. nebo inhalační)
- atropin – předejít okulokardiálnímu reflexu

31

Časování

- pokud je jasné, že operace bude nutná, je třeba ji provést tím dříve, čím strabismus vzniknul (např. kongenitální eso)
- před operací by mělo dítě nosit minimálně půl roku brýle a neměla by být přítomna větší amblyopie
- po operaci následuje ortoptická léčba
- divergentní strabismy vznikají později a je možné je tak i operovat později
- neoperují se akomodativní strabismy (kromě částečně akomodativních), primární mikrostrabismy, fixované ARK




32

Typy zákroků

- na horizontálních svalech
 - sval ve směru úchytky oslabujeme
 - **retropozice**: posun úponu svalu směrem k ekvátoru
 - **elongace**: dva protisměrné nástřihy svalu, sval se prodlouží a oslabí
 - **tenotomie**: odstřížení svalu
 - **fáden – retroekvatoriální myopexie**: steh v oblasti ekvátoru
 - sval v protisměru úchytky posilujeme
 - **antepozice**: posunutá úponu svalu směrem k limbu
 - **resekce**: odstřížení části svalu a jeho opětovné sešití
 - **zřasení**: zkrácení nařasením svalu
- na dolním šikmém
 - **tenotomie/myotomie**: odstřížení svalu nebo úponu
 - **myektomie**: vystřížení části svalu
 - **retropozice podle Finka**: o 14 mm k temporálnímu okraji DP svalu

33



34